MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

BULLETIN

DU

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

BRUXELLES

TABLES GÉNÉRALES

DES

VOLUMES I - XXV

(1902 - 1955)

PAR

E. GOEMANS

Bibliothécaire

MINISTERIE VAN LANDBOUW

BULLETIN

VAN DE

RIJKSPLANTENTUIN

BRUSSEL

ALGEMENE INHOUDSTAFEL

VAN DE

DELEN I - XXV

(1902 - 1955)

DOOR

E. GOEMANS

Bibliothecaris

BRUXELLES
1956

BRUSSEL
1956

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

BULLETIN

DU

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

BRUXELLES

TABLES GÉNÉRALES

DES

VOLUMES I - XXV

(1902 - 1955)

PAR

E. GOEMANS

Bibliothécaire

MINISTERIE VAN LANDBOUW

BULLETIN

VAN DE

RIJKSPLANTENTUIN

BRUSSEL

ALGEMENE INHOUDSTAFEL

VAN DE

DELEN I - XXV

(1902 - 1955)

DOOR

E. GOEMANS

Bibliothecaris

BRUXELLES
1956

BRUSSEL
1956

COMMONWEALTH MYCOLOG
11 JUIN

Introduction

Le « Bulletin du Jardin Botanique de l'État » fut fondé en 1902, à l'initiative de É. De Wildeman, à cette époque conservateur au Jardin Botanique de l'État. Celui-ci désirait s'en servir pour y diffuser les nouvelles découvertes dans la flore congolaise dont les matériaux affluaient nombreux à Bruxelles.

Le 1er fascicule sortait en août 1902, le dernier des 6 fascicules formant le volume I paraissait en mai 1905. Il fut imprimé par P. Weissenbruch, imprimeur du Roi, 49, rue du Poinçon à Bruxelles. Ce volume était consacré spécialement à la physiologie, à la morphologie et à l'écologie botaniques, travaux de Jean Massart, alors conservateur au Jardin Botanique de l'État et professeur à l'Université de Bruxelles. Le volume II qui ne constituait en fait qu'une réédition du « Sylloge Florae Congolanae », parut en 1910, et fut imprimé par la maison d'édition A. Castaigne, A. de Boeck successeur, 265, rue Royale à Bruxelles. Ce n'est vraiment qu'à partir du volume III que le Bulletin du Jardin Botanique de l'État remplit le rôle auquel on le destinait. Ce volume comportait deux fascicules formant 294 pages et, comme le précédent, il fut imprimé par la maison d'édition Castaigne.

Malheureusement, É. de Wildeman était virtuellement seul pour diriger le Jardin Botanique de l'État, en assurer les nombreuses charges administratives et scientifiques, pour dépouiller les matériaux de la flore congolaise qui arrivaient en masse au Jardin Botanique de l'État à Bruxelles à la suite d'accords conclus, les déterminer et en publier les résultats. Cependant, c'est par ce véritable travail de pionnier que fut établie la base sur laquelle les chefs responsables s'appuieront quelques années plus tard, pour revendiquer la priorité du Jardin Botanique de l'État dans la recherche systématique botanique congolaise.

Mais la tâche était trop lourde et la conséquence en fut la parution irrégulière du Bulletin, alimenté quasi en entièreté par

É. De Wildeman; c'est le cas du volume IV, imprimé par A. Goemaere, imprimeur du Roi, 21, rue de la Limite, Bruxelles, qui imprima également tous les autres volumes.

Cette situation perdura quelques années. Une amélioration intervint par le renforcement des effectifs du personnel scientifique avec l'entrée des Drs W. Robyns et R. Mosseray, respectivement en 1923 et en 1931. W. Robyns se spécialisa dans la systématique tropicale et dans la phytogéographie, discipline naissante dans laquelle il s'affirma rapidement, tandis que R. Mosseray fut chargé de l'étude de la flore de la Belgique.

Le Bulletin continua à paraître à raison d'un volume par deux ans jusqu'en 1950. A partir de cette date, un volume de 550 pages parut chaque année, en 4 livraisons régulières : fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre. Cette nouvelle situation était due à l'augmentation des effectifs du service scientifique, à l'apport des botanistes étrangers ainsi qu'aux chercheurs de l'I. N. É. A. C., qui collabore avec le Jardin Botanique à la « Flore du Congo belge et du Ruanda-Urundi ».

Un bref aperçu historique était nécessaire pour situer l'importance acquise par le Bulletin du Jardin Botanique de l'État et, pour autant que les statistiques expriment des réalités, voici quelques chiffres assez éloquents :

Le total général des pages composant les 25 volumes s'élève à 10.770 comprenant 374 études différentes ; 91 auteurs ont collaboré au Bulletin au cours de ce demi-siècle. Remarquons à ce sujet que 78 auteurs différents ont prêté leur concours à la composition des volumes XII à XXV parus sous le directorat de W. Robyns. Plusieurs travaux importants furent publiés dans le Bulletin et notamment :

Tentamen Monographiae Vangueriae generumque affinium, par W. Robyns (vol. XI, 1928);

Les Roses d'Europe de l'Herbier Crépin, par G. A. Boulenger (vol. X, 1924; vol. XII, 1931-1932);

Revision des Roses d'Asie de la section Eglanteriae, par G. A. Boulenger (vol. XIII, fasc. 3, 1935).

2738 taxa nouveaux et combinaisons nouvelles ont été décrits dans ces 25 volumes dont la presque totalité se rapporte à la flore du Congo. Ce chiffre atteste à suffisance la part prépondérante que le Jardin Botanique a prise dans la systématique tropicale. La plupart des 25 volumes sont illustrés par des planches de

H. Durand, A. Cleuter, J. M. Lerinckx, E. Thuring et W. E. Trevithick, et par des photos réalisées au Jardin Botanique de l'État. Planches, photos et autres illustrations sont au nombre de 971.

Au terme d'un demi-siècle de recherches dans la botanique systématique principalement congolaise, il était intéressant de dresser le bilan de l'apport scientifique du Jardin Botanique de l'État et de fournir en même temps un outil de travail précieux à ceux qui s'occupent de l'étude de la flore congolaise.

Je suis reconnaissant au Directeur du Jardin de m'avoir chargé de ce travail bibliographique. J'exprime aux membres du personnel de la Bibliothèque mes remerciements pour leur dévouement dans l'exécution des milliers de fiches nécessitées par ce travail.

Je tiens, d'autre part, à remercier tout particulièrement M. R. Tournay, botaniste de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, qui, dans la supervision de ce travail, m'a apporté l'aide très appréciée du systématicien hautement spécialisé et introduit dans les innombrables arcanes du « International Code of Botanical Nomenclature ».

Bruxelles, novembre 1956.

Inleiding

Het « Bulletin van de Rijksplantentuin » werd in 1902 gesticht op initiatief van É. De Wildeman, toen conservator aan de Rijksplantentuin. Deze laatste verkoos er zich van te bedienen om de nieuwe ontdekkingen in 't licht te stellen van de kongolese flora, waarvan het materiaal in grote hoeveelheid te Brussel toestroomde.

De 1ste aflevering van het 1ste deel verscheen in augustus 1902, de laatste van de 6 afleveringen, die het 1ste deel vormen, verscheen in mei 1905. Het werd gedrukt door P. Weissenbruch, drukker des Konings, 49, Stempelstraat, te Brussel. Dit deel handelt hoofdzakelijk over physiologie, morphologie en ecologie, studies van J. Massart, conservator aan de Rijksplantentuin, en professor aan de Vrije Universiteit van Brussel. De inhoud van deel II, in feite een herdruk van de « Sylloge Florae Congolanae », verscheen in 1910 en werd gedrukt door de uitgeverij A. Castaigne, opvolger A. de Boeck, 265, Koninklijke straat, te Brussel. Het is slechts vanaf het 3de deel dat het « Bulletin » de rol vervulde waartoe het gesticht werd. Het bevatte 2 afleveringen, samen 294 bladzijden, en zoals vorige, gedrukt door de uitgeverij Castaigne.

Ongelukkiglijk, É. De Wildeman stond alleen ter vervulling van een te zware taak : de leiding van de Rijksplantentuin, er zowel op administratief als wetenschappelijk gebied de vele lasten van dragend. Hij hield zich bezig met het indelen van het materiaal der kongolese flora, dat uitsluitend aan de Rijksplantentuin gestuurd werd ingevolge overeengekomen akkoorden. Ook stond É. De Wildeman alleen om dit materiaal te determineren en er de uitslagen van te publiceren. Nochtans, dit echte pionnierswerk is de grondslag waarop enkele jaren later de verantwoordelijke leiders zich zullen steunen om de voorrang van de studie der kongolese plantensystematiek voor de Rijksplantentuin op te eisen.

Maar dit alles sleep met zich als gevolg een onregelmatig verschijnen van het « Bulletin », dat bijna gans werd afgewerkt door É. De Wildeman, zoals het bijvoorbeeld, het geval was, met het

4de deel, gedrukt door Goemaere, drukker des Konings, 21, Grensstraat, te Brussel, door wie ook, tot hedendaags, alle volgende delen gedrukt werden.

Een verbetering trad in door aanvulling der kaders van het wetenschappelijk personeel met het in dienst treden van Dr. W. Robyns en R. Mosseray, respectievelijk in 1923 en 1931. W. Robyns specialiseerde zich in de tropische plantensystematiek en de plantenaardrijkskunde, nieuwe opkomende leer, waarin hij weldra naam verwierf. R. Mosseray werd belast met de studie van de belgische Flora.

Het « Bulletin » verscheen verder met één deel om de twee jaar tot 1950. Vanaf dit ogenblik verscheen er jaarlijks één deel. Deze nieuwe situatie is te wijten aan de versteviging der kaders van de wetenschappelijke diensten, aan de bijdragen van de buitenlandse botanici en aan de opzoekers van het N. I. L. C. O. die met de Rijksplantentuin samen werken aan de « Flore du Congo belge et du Ruanda-Urundi ».

Een kort historisch overzicht bleek nodig om het belang van het « Bulletin van de Rijksplantentuin » te doen uitschijnen. In zoverre de statistieken echtheid verzekeren, ziehier enkele sprekende cijfers.

Het totaal der bladzijden van de 25 delen bereikt 10.770, het onderwerp uitmakend van 374 verschillende studies; 91 auteurs hebben gedurende de laatste halve eeuw hun medewerking aan het « Bulletin » verleend. Laten we aanstippen dat 78 verschillende auteurs hebben bijgedragen tot het samenstellen van de delen XII tot XXV, verschenen onder de directie van Prof. Dr. W. Robyns. Meerdere belangrijke werken zijn in het « Bulletin » gepubliceerd geweest, onder andere :

Tentamen Monographiae Vangueriae generumque affinium door W. Robyns (vol. XI, 1928);

Les Roses d'Europe de l'herbier Crépin, door G. A. Boulenger (vol. X, 1924; vol. XII, 1931-1932);

Révision des Roses d'Asie de la section Eglanteriae, door G. A. Boulenger (vol. XIII, fasc. 3, 1935).

2738 nieuwe taxa en combinaties zijn omschreven geweest in de 25 delen, waarvan het grootste deel betrekking hebben op de kongolese flora. Bijna alle 25 delen zijn geïllustreerd met tekeningen, meesterlijk uitgevoerd door H. Durand, A. Cleuter, J. M. Lerinckx, E. Thuring en W. E. Trevithick, door foto's uitgevoerd door het

personeel van de Rijksplantentuin. Het aantal platen, foto's en andere illustraties bereiken de 971.

In een halve eeuw tijdsruimte wetenschappelijke onderzoekingen van plantensystematiek, in 't bijzonder kongolese systematiek, was het interessant een bilan op te maken der wetenschappelijke bijdrage van de Rijksplantentuin, en, gelijkertijd een precieus werktuig ter beschikking te stellen van hen die zich aan de kongolese flora interesseren.

Ik ben erkentelijk aan de Directeur van de Tuin die mij met dit bibliographisch werk heeft belast. Ik dank de leden van het personeel van de bibliotheek voor hun toewijding in het uitvoeren van de duizenden steekkaarten, die dit werk gevergd heeft.

Anderzijds houd ik er in 't bijzonder aan, mijn dank te betuigen aan M. R. Tournay, botanist van het Instituut der Nationale Parken van Belgisch Congo, die bij het overzicht van dit werk, mij de zeer gewaardeerde hulp verleend heeft van de botanicus, hoog gespecialiseerd in de plantensystematiek en ingewijd in de ontelbare geheimen van de « International Code of botanical Nomenclature ».

Brussel, november 1956.

Table chronologique des articles
Chronologische tafel van de artikels

VOLUME I — DEEL I

Fasc. 1 (Août 1902) — Afl. 1 (Augustus 1902)

MASSART, J. — Un Jardin botanique pour les écoles moyennes 1

Fasc. 2 (Septembre 1902) — Afl. 2 (September 1902)

MASSART, J. — L'accommodation individuelle chez *Polygonum amphibium* 73

Fasc. 3 (Novembre 1902) — Afl. 3 (November 1902)

MASSART, J. — Sur la pollination sans fécondation 89

DE WILDEMAN, E. — Rapport sur une visite aux Instituts botaniques et coloniaux de Berlin, Dresde et Paris en 1902... 97

Fasc. 4 (Septembre 1903) — Afl. 4 (September 1903)

MASSART, J. — Comment les plantes vivaces maintiennent leur niveau souterrain 113

— , — Comment les plantes vivaces sortent de terre au printemps 143

— , — Comment les jeunes feuilles se protègent contre les intempéries 181

Fasc. 5 (Juillet 1904) — Afl. 5 (Juli 1904)

MASSART, J. — Les collections éthologiques au Jardin Botanique de l'État 217

Fasc. 6 (Mai 1905) Afl. 6 (Mei 1905)

Inauguration du buste de François Crépin au Jardin Botanique de l'État. — Compte rendu de la cérémonie du 5 décembre 1904 281

MASSART, J. — Recherches sur les organismes inférieurs. VI. Considérations théoriques sur l'origine polyphylétique des modes d'alimentation, de la sexualité et de mortalité chez les organismes inférieurs 325
— , — Notice sur la serre des plantes grasses au Jardin Botanique de l'État 355
— , — Les muscinées du littoral belge. — Compte rendu d'une herborisation faite, les 1er et 2 novembre 1904, à Westende et Coxyde 387
— , — La collection phylogénique au Jardin Botanique de l'État... 403

VOLUME II (1910) DEEL II (1910)

DURAND, Th. et H. — Sylloge Florae Congolanae.

VOLUME III DEEL III
Fasc. 1 (Janvier 1911) Afl. 1 (Januari 1911)

VAN AERDSCHOT, P. — Catalogue de la Bibliothèque collective réunie au Jardin Botanique de l'État à Bruxelles... 1

Fasc. 2 (Décembre 1911) Afl. 2 (December 1911)

DE WILDEMAN, E. — Decades novarum specierum Florae congolensis 253

Fasc. 3 (Janvier 1913) Afl. 3 (Januari 1913)

Liste des plantes, boutures et graines offertes en échange par les services de cultures du Jardin Botanique de l'État à Bruxelles 281

VOLUME IV DEEL IV
Fasc. 1 (Mars 1914) Afl. 1 (Maart 1914)

DE WILDEMAN, E. — Additions à la Flore du Congo ... 1

Fasc. 2 (25 Juin 1914) Afl. 2 (25 Juni 1914)

DE WILDEMAN, E. — Théophile Durand, Directeur du Jardin Botanique de l'État. 8 novembre 1901-12 janvier 1912 ... ... I-XVII
VAN DEN BROECK, H. — Les Muscinées de l'Herbier belge du Jardin Botanique de l'État à Bruxelles ... 243
DE WILDEMAN, E. — Notes sur des espèces africaines du genre *Dioscorea* L. 311

Fasc. 3 (25 Août 1914) Afl. 3 (25 Augustus 1914)

DE WILDEMAN, E. — Decades novarum specierum Florae Congolensis II 359

VOLUME V DEEL V
Fasc. 1 (Novembre 1915) Afl. 1 (November 1915)

DE WILDEMAN, E. — Decades novarum specierum Florae Congolensis III... 1

Fasc. 2 (Octobre 1916) Afl. 2 (October 1916)

COGNIAUX, A. — *Cucurbitaceae* novae Herbarii Bruxellensis... 109
DE WILDEMAN, E. — Additions à la Flore du Congo II... 117

VOLUME VI DEEL VI
Fasc. 1 (Janvier 1919) Afl. 1 (Januari 1919)

DE WILDEMAN, E. — Additions à la Flore du Congo III, pl. I-XXXV 1

Fasc. 2 (Février 1919) Afl. 2 (Februari 1919)

DE WILDEMAN, E. — Additions à la Flore du Congo III, *(suite)* 65

VOLUME V DEEL V
Fasc. 3 (Mai 1919) Afl. 3 (Mei 1919)

DE WILDEMAN, E. — Additions à la Flore du Congo II... 269
DE WILDEMAN, E. — Alfred Cogniaux ... ... I-XXIX

VOLUME V — DEEL V
Fasc. 4 (1er Décembre 1919) — Afl. 4 (1 December 1919)

DE WILDEMAN, E. — Additions à la Flore du Congo II... 365

VOLUME VI — DEEL VI
Fasc. 3 (Mars 1920) — Afl. 3 (Maart 1920)

DE WILDEMAN, E. — Notes sur le genre *Rinorea* Aubl. 131

VOLUME VII — DEEL VII
Fasc. 1 (Août 1920) — Afl. 1 (Augustus 1920)

DE WILDEMAN, E. — Additions à la Flore du Congo ... 1
BEELI, M. — Notes sur le genre *Meliola* Fr. 89

Fasc. 2 (Octobre 1920) — Afl. 2 (October 1920)

DE WILDEMAN, E. — Notes sur quelques espèces africaines du genre *Clerodendron* 161
— , — Contributions à l'étude des espèces africaines du genre *Acioa* Aubl. 188
— , — Observations sur les Légumineuses de la Flore africaine... 219

VOLUME VI — DEEL VI
Fasc. 4 (Février 1921) — Afl. 4 (Februari 1921)

BOMMER, C. — Considérations sur la documentation en Histoire naturelle 195
DE WILDEMAN, E. — Documents pour une monographie des *Alchemilla* d'Afrique 207

VOLUME VII — DEEL VII
Fasc. 3-4 (Novembre 1921) — Afl. 3-4 (November 1921)

DE WILDEMAN, E. — Additions à la Flore du Congo ... 271
— , — Documents pour une monographie des *Alchemilla* d'Afrique :
II. Sur des *Alchemilla* de Madagascar 317
III. Les *Alchemilla* du groupe « *Pedatae* » Engler... 339
IV. Notes sur des *Alchemilla* du groupe « *Subochreatae* » Engler... 359
V. Sur quelques espèces du groupe « *Latilobae* » Engler 378

VOLUME VIII — DEEL VIII
Fasc. 1 (Décembre 1922) — Afl. 1 (December 1922)

DE WILDEMAN, E. — Fr. M. C. Vermoesen... ... ... I-IX
BEELI, M. — I. Notes mycologiques. Contribution à la flore mycologique du Congo 1
II. Relevé des Ustilaginées du Congo 12
MATTIROLO, O. — Un nouveau champignon hypogé du Congo belge... 23
DE WILDEMAN, E. — Documents pour une monographie du genre *Vangueria* Juss. 39
BEELI, M. — Énumération des champignons signalés au Congo 67

VOLUME IX — DEEL IX
Fasc. 1 (Septembre 1923) — Afl. 1 (September 1923)

DE WILDEMAN, E. — Élie Marchal (avec portrait) 1
— , — Remarques sur les espèces africaines du genre *Grumilea* Gaertn. (4 fig.) 21

VOLUME VIII — DEEL VIII
Fasc. 2 (Novembre 1923) — Afl. 2 (November 1923)

DE WILDEMAN, E. — Deux Bananiers indigènes du Ruanda 103
— , — Deux *Carduus* du Ruwenzori... 115
— , — Notes sur le *Strephonema Gilleti*... 119
— , — Un *Astragalus* nouveau de la région du Rutshuru (Ruchuru) 125
— , — Un *Argyrolobium* nouveau pour le Congo 127
BAKER, E. et DE WILDEMAN, E. — Notes sur des formes congolaises du genre *Crotalaria* 129
— , — Sur quelques *Indigofera* du Congo 143

VOLUME X — DEEL X
Fasc. 1 (Décembre 1924) — Afl. 1 (December 1924)

BOULENGER, G. A. — Les Roses d'Europe de l'Herbier Crépin 1

Fasc. 2 (Mars 1925) — Afl. 2 (Maart 1925)

BOULENGER, G. A. — Les Roses d'Europe de l'Herbier Crépin 193

VOLUME XI — DEEL XI
Fasc. 1 (Mai 1928) — Afl. 1 (Mei 1928)

ROBYNS, W. — Tentamen Monographiae *Vangueriae* generumque affinium (Fig. 1-18) 1

Fasc. 2 (Août 1928) — Afl. 2 (Augustus 1928)

ROBYNS, W. — Tentamen Monographiae *Vangueriae* generumque affinium (Fig. 19-36) 155

VOLUME VIII — DEEL VIII
Fasc. 3 (Avril 1930) — Afl. 3 (April 1930)

ROBYNS, W. et LEBRUN, J. — Essai d'une monographie du genre *Tinnea* 161
ROBYNS, W. — Contribution à l'étude des Graminées du Congo et du Ruanda-Urundi 209
BEELI, M. — Notes mycologiques. IV. Contribution à la flore mycologique du Congo 245

Fasc. 4 (Janvier 1931) — Afl. 4 (Januari 1931)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1930 261

VOLUME IX — DEEL IX
Fasc. 2 (Mars 1931) — Afl. 2 (Maart 1931)

Commémoration du centième anniversaire de la naissance de François Crépin 59
GRAVIS, A. — Discours 62
DE WILDEMAN, E. — Fr. Crépin, la Société Royale de Botanique de Belgique et le Jardin Botanique de l'État... 66
BOULENGER, G. A. — Fr. Crépin et les Roses 78
CHRIST, H. — Quelques impressions sur Crépin 83
BOMMER, C. — Fr. Crépin et la flore fossile de la Belgique. 86
MARCHAL, E. — Le Prix François Crépin... 90
MATTIROLO, O. — Sertulum Fungorum Congoensium (1 fig.)... 95
VAN AERDSCHOT, P. — Notes sur la Bibliothèque collective du Jardin Botanique de l'État... 99

VOLUME XII — DEEL XII
Fasc. 1 (November 1931) — Afl. 1 (November 1931)

BOULENGER, G. A. — Les Roses d'Europe de l'Herbier Crépin ... 1

Fasc. supplémentaire (Décembre 1931)
Aanvullende aflevering (December 1931)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1931.

Fasc. 2 (Avril 1932) — Afl. 2 (April 1932)

BOULENGER, G. A. — Les Roses d'Europe de l'Herbier Crépin ... 193

Fasc. supplémentaire 2 (Décembre 1932)
Aanvullende aflevering (December 1932)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1932.

VOLUME IX — DEEL IX
Fasc. 3 (Décembre 1932) — Afl. 3 (December 1932)

FREMY, P. — Contribution à la Flore algologique du Congo belge d'après les récoltes du R. P. H. Vanderyst (26 fig.) ... 109

GHESQUIÈRE, L. — Contribution à l'étude des Légumineuses, principalement du Congo belge. I. Les *Cassia* africains de la section *Chamaecrista* Benth. (Pl. I et II) ... 139

ROBYNS, W. — Contribution à l'étude des Graminées du Congo belge et du Ruanda-Urundi. II. Panicées (Pl. III)... 171

Fasc. 4 (Décembre 1933) — Afl. 4 (December 1933)

BOULENGER, G. A. — Révision des Roses d'Asie de la Section des *Synstylae* ... 203

LEBRUN, J. — Révision des espèces congolaises du genre *Cynometra* L. ... 281

ROBYNS, W. et GHESQUIÈRE, J. — Révision du genre *Enantia* Oliv. (Annonacées)... 303
NORMAND, D. — Note sur les bois d'*Enantia* (Annonacées) (Pl. IV)... 317
FREMY, P. — Seconde contribution à la flore algologique du Congo belge d'après les récoltes du R. P. Vanderyst (32 fig.) 322
Communication. — VI^e Congrès International de Botanique... 348

Fasc. supplémentaire 3 (Décembre 1933) — Aanvullende aflevering (December 1933

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1933.

VOLUME XIII Fasc. 1 (Octobre 1934) — DEEL XIII Afl. 1 (October 1934)

ROBYNS, W. — Contribution à l'étude des Graminées du Congo belge. III. *Pennisetum* Rich. 1
STANER, P. — Un genre nouveau de Gesnériacées du Congo belge 7
LEBRUN, J. — Révision des Araliacées du Congo belge ... 11
STANER, P. et MICHOTTE, D. — Révision des espèces congolaises du genre *Strophanthus* P. DC. 23
MOSSERAY, R. — Sur l'existence du *Quercus pedunculata* Ehrh. dans les alluvions de la Nèthe... 57
VI^e Congrès International de Botanique. Amsterdam 2-7 septembre 1935 59

Fasc. 2 (Décembre 1934) — Afl. 2 (December 1934)

STANER, P. — Les Guttifères de la flore du Congo belge (Pl. I et 1 fig.) 61

Fasc. supplémentaire 1 (Décembre 1934) — Aanvullende aflevering 1 (December 1934)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1934.

Fasc. 3 (Juin 1935) Afl. 3 (Juni 1935)

BOULENGER, G. A. — Révision des Roses d'Asie de la Section des *Eglanteriae*, groupes des *Pimpinelli-Suavifoliae, Orientales* et *Alpinae-Vestitae* (4 fig.) ... 165

GUSTAFSSON, C. E. — Les *Rubus* africains de l'Herbier du Jardin Botanique de l'État à Bruxelles (Pl. II) ... 267

Fasc. 4 (Novembre 1935) Afl. 4 (November 1935)

CHERMEZON, H. — Cypéracées nouvelles du Congo belge. 277

SHERFF, E. E. — Novelties in *Bidens* and *Coreopsis* from Belgian Congo and Central Africa 285

LOUIS, J. — Révision des espèces congolaises du genre *Erythrina* L. (Pl. III et 4 fig.) 295

STANER, P. — Les Thyméléacées de la flore du Congo belge (14 fig.) 321

Fasc. supplémentaire 2 (Décembre 1935) Aanvullende aflevering 2 (December 1935)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1935.

VOLUME XIV Fasc. 1 (Juillet 1936) DEEL XIV Afl. 1 (Juli 1936)

HAUMAN, L. et BALLE, S. — Les *Alchemilla* de l'Abyssinie et de Madagascar, avec un tableau synoptique des espèces africaines (fig. 1-13) 1

MOSSERAY, R. — Matériaux pour une flore de Belgique. V. Genre *Senecio* (Pl. I)... 57

BEELI, M. — Contribution à l'étude de la flore mycologique du Congo. — XI. Fungi Goossensiani (Pl. II). — XII. Fungi Loosiani (Pl. III)... 83

ROBYNS, W. — Contribution à l'étude des Graminées du Congo belge et du Ruanda-Urundi. — IV. *Schizachyrium kwiluense* VANDERYST 93

HUMBERT, H. et STANER, P. — Observations critiques sur quelques Composées du Congo belge (Pl. IV-V). 99

Fasc. 2 (Novembre 1936) Afl. 2 (November 1936)

BOULENGER, G. A. — Révision des Roses d'Asie, sections des *Eglanteriae* (suite et fin), *Chinenses, Bracteatae, Banksianae* et *Microphyllae* (fig. 14-18) 115
STEBBINS, G. L. — Two new species of *Lactuca* from Tropical Africa (fig. 19) 223

Fasc. supplémentaire 1 (Décembre 1936) Aanvullende aflevering 1 (December 1936)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1936.

Fasc. 3 (Juin 1937) Afl. 3 (Juni 1937)

BOULENGER, G. A. — Monographie du genre *Hesperhodos* Cocker. (fig. 20-21)... 227
— , — Introduction à l'étude du genre *Rosa* 241
— , — Supplément à la révision des Roses d'Asie, section des *Synstylae* 274
— , — Étude du *Rosa gymnocarpa* Nutt. (fig. 22-23) ... 279
— , — Le *Rosa blanda* Ait. comparé au *Rosa cinnamomea* L. 289
BABCOCK, E. B. — *Crepis* species of western tropical Africa (Angola, Congo, Cameroons, Nigeria) 293
BREMEKAMP, C. E. B. — Contribution à l'étude du genre *Pavetta*. Description de quatre espèces nouvelles du Congo belge 305
MOSSERAY, R. — Matériaux pour une flore de Belgique. — VI. Genres *Bidens* et *Galinsoga* (fig. 24-25) ... 313

Fasc. 4 (Décembre 1937) Afl. 4 (December 1937)

CHERMEZON, H. — Cypéracées nouvelles du Congo belge. II 329
STEBBINS, G. L. — The scandent species of *Prenanthes* and *Lactuca* in Africa (Pl. VI-VIII) 333
MILDBRAED, J. — Neue und seltene Acanthaceen aus dem Oestlichen belgischen Kongo... 353
CROIZAT, L. — Une nouvelle espèce de *Kalanchoe* du Mozambique (fig. 26 et Pl. IX) 363

BOULENGER, G. A. — Sur un Rosier cultivé nommé *Rosa Rouletii* Correvon... 367
— , — Note sur le *Rosa stylosa* des auteurs (fig. 27)... ... 373
DEMARET, F. — Catalogue bryologique de la Forêt de Soignes 379

Fasc. supplémentaire 2 (Décembre 1937) — Aanvullende aflevering 2 (December 1937)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1937.

VOLUME XV — DEEL XV

Fasc. 1 (Juin 1938) — Afl. 1 (Juni 1938)

ROBYNS, W. — G. A. Boulenger, 1858-1937. Sa vie et son œuvre rhodologique. (Avec portrait et 1 fig.) 1
BEELI, M. — Étude de la flore mycologique africaine. Note sur des Basidiomycètes récoltés à Sierra Leone par F. C. Deighton. (Pl. I-IV) 25
SUESSENGUTH, K. — Afrikanische Amaranthaceen aus dem Herbarium Brüssel 55
KOSTERMANS, A. J. — The african *Lauraceae* I (Révision of the *Lauraceae*, IV) (Pl. V-IX) 73
CROIZAT, L. — Euphorbiacées africaines nouvelles ou peu connues : *Elaeophorbia* et *Euphorbia* Section *Tekeanae*. 109

Fasc. 2 (Décembre 1938) — Afl. 2 (December 1938)

DE WILDEMAN, E. — Charles Bommer (1866-1938) (avec portrait)... 121
STANER, P. — Révision des espèces congolaises du genre *Acalypha* L. (1 fig.) 132
— , — Révision des espèces congolaises des genres *Cycnium* et *Rhamphicarpa* (Scrophulariacées)... 147
DEMARET, F. — Contribution à l'étude de la flore et de la végétation muscinales dans la région de Mariembourg (1 fig.) 152
MOSSERAY, R. — Esquisse des groupements végétaux de quelques bois du District Hesbayen de Belgique (4 fig. et 1 Pl.) 173
BEGUINOT, A. — Note sur les *Romulea* du Congo belge... 215

GHESQUIÈRE, J. — Un *Erythrina* nouveau du Congo belge (2 fig.) 217
WERDERMANN, E. — Uebersicht ueber die aus dem Belgischen Kongo stammenden Arten der Gattung *Ceropegia*... 222

Fasc. supplémentaire 1 (Décembre 1938) — Aanvullende aflevering 1 (December 1938)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1938.

Fasc. 3 (Juillet 1939) — Afl. 3 (Juli 1939)

ROBYNS, W. and LAMB, S. H. — Preliminary ecological survey of the Island of Hawaii (34 fig.) 241
STANER, P. — Révision des espèces congolaises du genre *Tetracera* L. 295
— , — Révision des Renonculacées du Congo belge (1 Pl.). 307
VAN MEEL, L. — Sur la répartition du genre *Batrachospermum* en Belgique (1 fig. et 1 Pl.) 319
VERPLANCKE, G. — Note sur quelques Ascomycètes nouveaux pour la flore belge 333

Fasc. 4 (Décembre 1939) — Afl. 4 (December 1939)

BURKILL, I. H. — Notes on the Genus *Dioscorea* in the Belgian Congo... 345
STANER, P. — Révision des Rhamnacées du Congo belge (fig. 45-60) 393
DEMARET, F. — *Rhynchostegiella Teesdalei* Limpr. en Belgique... 425

Fasc. supplémentaire 2 (Décembre 1939) — Aanvullende aflevering 2 (December 1939)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1939.

VOLUME XVI — DEEL XVI

Fasc. 1 (Décembre 1940) — Afl. 1 (December 1940)

ROBYNS, W. — Raoul Mosseray 1908-1940 (avec portrait). 1

VERPLANCKE, G. — Quelques Champignons nouveaux pour la flore belge... 9
DEMARET, F. — Prodrome des Bryophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi. I. Musci 21
BEELI, M. — Notes mycologiques congolaises. — Champignons récoltés dans la région du Kivu par F. L. Hendrickx, Mycologue à l'I. N. É A. C. 105

Fasc. supplémentaire 1 (Décembre 1940) — Aanvullende aflevering 1 (December 1940)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1940.

Fasc. 2-3 (Décembre 1941) — Afl. 2-3 (December 1941)

STANER, P. — Les Méliacées du Congo belge (fig. 1-13, Pl. I-XIII) 109
ROBYNS, W. — Note sur le *Xylia Ghesquierei* Robyns (fig. 14, Pl. XIV)... 253
DUVIGNEAUD, P. — *Xanthodactylon* Duvign., genre nouveau de Lichens de l'Afrique du Sud (Pl. XV) ... 259
DEMARET, F. — Révision des espèces belges de *Sphagnum* Dill. sous-section *Cymbifolia* Lindb. (fig. 15-21)... 267

Fasc. supplémentaire 2 (Décembre 1941) — Aanvullende aflevering 2 (December 1941)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1941.

Fasc. 4 (Décembre 1942) — Afl. 4 (December 1942)

DEMARET, F. — Prodrome des Bryophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi. II. Hepaticae 287
HAUMAN, L. — Les Bryophytes des hautes altitudes au Ruwenzori (fig. 22) 311
DUVIGNEAUD, P. — *Hendricxia* Duvign., nouveau genre de Parméliacées des montagnes équatoriales (fig. 23-24)... 355
BALLE, S. — Révision des *Piperaceae* du Congo belge (Pl. XVI) 367

HAUMAN, L. — Note sur les Ulmacées du Congo belge ... 407
ROBYNS, W. — Le concept des Phytocénoses biotiques principalement dans les régions intertropicales 413

Fasc. supplémentaire 3 (Décembre 1942) — Aanvullende aflevering 3 (December 1942)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1942.

VOLUME XVII — DEEL XVII

Fasc. 1 (Décembre 1943) — Afl. 1 (December 1943)

MARTENS, P. — Les organes glanduleux de *Polypodium virginianum (P. vulgare* var. *virginianum)* (fig. 1-2). 1
ROBYNS, W. — Note sur le genre *Platostoma* P. Beauv. *(Labiatae-Ocimoideae)* (fig. 3-5) 15
— , — Un nouveau genre de *Labiatae-Ocimoideae* de l'Afrique tropicale centrale (Pl. I)... 27
DEMARET, F. — Le genre *Andreaea* en Afrique centrale et orientale (fig. 6-12) 33
VAN MEEL, L. I. J. — Sur la répartition du genre *Batrachospermum* en Belgique. II 49
LAWALRÉE, A. — Les genres *Hoffmanniella* Schlecht., *Eleutheranthera* Poit., et *Exomiocarpon* Lawalrée gen. nov. (fig. 13-14)... 55
ROBYNS, W. — Sympétales nouvelles de la région du Parc National Albert (Congo belge) 65
LOUIS, J. — Contribution à l'étude du genre *Afrormosia* au Congo belge 109

Fasc. 2 (Décembre 1944) — Afl. 2 (December 1944)

TATON, A. — *Ophioglossum Louisii* Taton sp. nov. — Épiphyte remarquable de la forêt équatoriale congolaise (Pl. II) 117
LÉONARD, J. — Note sur *Antidesma leptobotryum* Müll.-Arg. *(Euphorb.)* au Congo belge (fig. 15-16) 129
ROBYNS, W. et LAWALRÉE, A. — Révision des espèces congolaises du genre *Thesium* L. 135
DUVIGNEAUD, P. — Remarques sur la systématique des Lichens à « Podétions » (fig. 17)... 149

ROBYNS, W. — Note sur *Oxygonum* Burch. et sur les espèces congolaises de ce genre 157
HAUMAN, L. — Le genre *Protea* L. en Afrique tropicale... 165
— , — Deux *Pilea* nouveaux du Congo belge 177
— , — Deux Podostémonacées nouvelles du Congo belge ... 179
DEMARET, F. — Coup d'œil sur les principaux groupements bryophytiques de quelques rochers calcaires en Belgique (fig. 18) 181
BALLE, S. — Les *Loranthus* du Congo belge. Note préliminaire à l'étude des Loranthoïdées d'Afrique... 225

Fasc. 3-4 (Décembre 1945) Afl. 3-4 (December 1945)

WOUTERS, W. — Au sujet du spécimen-type de *Gossypium obtusifolium* Roxb. (fig. 19, Pl. III) 245
LÉONARD, J. — *Euphorbiaceae-Antidesminae* africanae novae (fig. 20-24)... 253
MARLIER-SPIRLET, M.-L. — Sur quelques épidermes de feuilles de *Cinnamomum* L. (Pl. IV-XXI) 266
TATON, A. — Nouveaux *Drosera* du Congo belge... 307
ROBYNS, W. et BOUTIQUE, R. — *Sedum Churchillianum*. Espèce nouvelle du Parc National Albert (Congo belge) (fig. 25) 313
DEMARET, F. — Prodrome des Mousses de Belgique... ... 317

Fasc. supplémentaire 1 (Décembre 1945) Aanvullende aflevering 1 (December 1945)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1945.

VOLUME XVIII DEEL XVIII

Fasc. 1-2 (Décembre 1946) Afl. 1-2 (December 1946)

BRENAN, J. P. M. and JONES, A. P. D. — A new species of *Cola* from Tanganyika Territory (1 Pl.) ... 1
DEMARET, F. — Prodrome des Bryophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi (I. Musci, Supplément 1) ... 7
ROBYNS, W. et BOUTIQUE, R. — Révision des *Phaseoleae-Galactieae* du Congo belge (2 fig.)... 67
WILCZEK, R. — Note sur quelques Mousses rares de Pologne 83

VANDEN BERGHEN, C. — Note sur *Sprucella succida* (Mitt.) Steph. au Congo belge (1 fig.) 89
DEMARET, F. — Une forme nouvelle de *Brachythecium velutinum* (Hedw.) Br. et Schpr var. *validum* (C. Jens.) C. Jens. (1 Pl., 1 fig.) 97
MILNE-REDHEAD, E. — A new species of *Otiophora* from central Africa 103
HAUMAN, L. — Sur quelques Amaranthacées nouvelles ou mal connues de l'Afrique Équatoriale 105
DEMARET, F. et VANDEN BERGHEN, C. — *Frullania capensis* Gottsche et les espèces confondues avec lui (3 fig.) 117
ROBYNS, W. — Sur l'existence de *Juniperus procera* Hochst. au Congo belge (1 fig.) 125
— , — Statistiques de nos connaissances sur les Spermatophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi 133

Fasc. supplémentaire 1 (Décembre 1946) — Aanvullende aflevering 1 (December 1946)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1946.

Fasc. 3-4 (Décembre 1947) — Afl. 3-4 (December 1947)

LÉONARD, J. — Notulae systematicae I *(Moraceae, Opiliaceae, Olacaceae, Octoknemaceaeque* africanae) (1 fig.) 145
LEROY, V. — Récoltes bryologiques au Congo belge et au Ruanda-Urundi (15 fig.)... 155
DEMARET, F. et LEROY, V. — Contribution à l'étude des genres *Syrrhopodon* et *Thyridium* et révision des espèces congolaises (9 fig.) 207
DEMARET, F. et VANDEN BERGHEN, C. — Révision de quelques espèces africaines du genre *Frullania* (3 fig.) 231
ANDREAS, Ch.-H. — *Erodium dentatum* Du Mortier (1 fig.) 241
LAWALRÉE, A. — *Campylostemon Laurentii* De Wild. et la position systématique du genre *Campylostemon* Welw. (1 fig.) 249
LOUIS, J. et BOUTIQUE, R. — Une espèce nouvelle d'*Anacolosa* au Congo belge (1 Pl.)... 255

ROBYNS, W. et BOUTIQUE, R. — Une espèce nouvelle de *Clitandra* du Parc National Albert (Congo belge). 259
ROBYNS, W. — Choripétales nouvelles de la région du Parc National Albert (Congo belge) 261
MOSSERAY, R. — Note sur quelques formes de *Papaver dubium* 293
LAWALRÉE, A. — Les *Ambrosia* adventices en Europe occidentale 305

Fasc. supplémentaire 2 (Décembre 1947) — Aanvullende aflevering 2 (December 1947)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1947.

VOLUME XIX — DEEL XIX
Fasc. 1 (Juin 1948) — Afl. 1 (Juni 1948)

ROBYNS, W. — Émile De Wildeman (1866-1947) (avec portrait)... 1
VAN DEN BERGHEN, C. — Note sur le genre *Ptychocoleus* Trev. en Afrique tropicale (fig. 1-4) 37
HAUMAN, L. — Sur quelques *Protea* de l'Afrique tropicale. 51
— , — Trois Moracées nouvelles du Congo belge 59
STEYAERT, R. L. — Quelques *Pestalotia* de la Flore belge (Pl. I-II) 65
DEMARET, F. et VANDEN BERGHEN, C. — *Frullania Arecae* (Spreng.) Gottsche et *F. Ecklonii* (Spreng.) Gottsche et Lindenb. (fig. 5) 73
DEMARET, F. et LEROY, V. — Une espèce nouvelle de *Campylopus* du Parc National Albert (Congo belge) (fig. 6) 85
ROBYNS, W. et TOURNAY, R. — Une espèce nouvelle de *Hippocratea* du Parc National Albert (Congo belge) 89

Fasc. 2 (Décembre 1948) — Afl. 2 (December 1948)

WILCZEK, R. — Le genre *Dicranum* Hedw. en Belgique (fig. 7-17) 91
STEYAERT, R. — Contribution à l'étude des *Pestalotia* du Congo belge (Pl. III-VI)... 173

VANDEN BERGHEN, C. — Contribution à l'étude des espèces africaines du genre *Metzgeria* (fig. 18-20)... 187
TROUPIN, G. — Quelques *Polygala* nouveaux du Congo belge... 205

Fasc. supplémentaire 1 (Décembre 1948) — Aanvullende aflevering 1 (December 1948)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1948.

Fasc. 3 (Décembre 1949) — Afl. 3 (December 1949)

BOUTIQUE, R. — Une espèce nouvelle de *Ficus* du Congo belge (fig. 21)... 211
LEBRUN, J. et BOUTIQUE, R. — Un *Ficus* nouveau pour le Congo belge... 213
BOUTIQUE, R. et LÉONARD, J. — Notulae Systematicae II (*Ficus* nouveaux du Congo belge) (fig. 22)... ... 215
LAWALRÉE, A. — Dicotylées nouvelles du Congo belge et du Territoire du Tanganyika... 219
LÉONARD, J. — Notulae Systematicae III (Une espèce nouvelle de *Dorstenia* du Congo belge) (fig. 23) 227
ROBYNS, W. — Une Flore du Congo belge et du Ruanda-Urundi 231
LAWALRÉE, A. — Notes sur quelques Ptéridophytes de Belgique... 237
KLOOS, A. W. — Dix espèces d'*Amaranthus* nouvelles pour la Flore belge 243
DEMARET, F. — Les Ptéridophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi. I. 251
TROUPIN, G. — Révision des espèces congolaises du genre *Alectra* Thunb. *(Scrophulariaceae)* 271
STEYAERT, R. L. — Contribution à l'étude monographique de *Pestalotia* De Not. et *Monochaetia* Sacc. (*Truncatella* gen. nov. et *Pestalotiopsis* gen. nov.) (Pl. VII-XVII, fig. 24-28) 285

Fasc. 4 (Décembre 1949) — Afl. 4 (December 1949)

DEMARET, F. — *Bryum Brotherianum* Demaret nom. nov. (fig. 29) 355

DEMARET, F. et LEROY, V. — Récoltes bryologiques de M. R. Germain au Congo belge (fig. 30) 359
VANDEN BERGHEN, C. — Contribution à l'étude des espèces africaines du genre *Mastigolejeunea* (Spr.) Schiffn. (fig. 31-33) 371
LÉONARD, J. — Notulae Systematicae IV *(Caesalpiniaceae-Amherstieae* africanae americanaeque) (fig. 34-39). 383
TROUPIN, G. — Contribution à l'étude des Ménispermacées africaines — I. (Pl. XVIII-XIX) 409
RAYMOND-HAMET. — Sur quelques espèces du genre *Kalanchoë* du Congo belge (fig. 40)... 437
HAUMAN, L. — Notes sur quelques Aizoacées et sur un *Chenopodium* du Congo belge 443
STANER, P. et LÉONARD, J. — Notulae Systematicae V *Thalictrum* africains *(Ranunculaceae)* (fig. 41) ... 449
LÉONARD, J. — Notulae Systematicae VI. Un genre nouveau de *Marantaceae* du Congo belge : *Haumania* ... 453
ROBYNS, W. et WILCZEK, R. — Contribution à l'étude des Lauracées du Congo belge et de l'Afrique tropicale (fig. 42-49) 457

Fasc. supplémentaire 2 (Décembre 1949)

. Aanvullende aflevering 2 (December 1949)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1949.

VOLUME XX
Fasc. 1 (Juin 1950)

DEEL XX
Fasc. 1 (Juni 1950)

DEMARET, F. et VANDEN BERGHEN, C. — Révision des espèces africaines du genre *Frullania* Raddi, sous-genre *Meteoriopsis* Spruce (fig. 1-3) 1
LÉONARD, J. et TROUPIN, G. — Observations sur le genre *Okoubaka* Pellegr. et Normand *(Octoknemaceae)* (fig. 4) 11
VANDEN BERGHEN, C. — Le genre *Stictolejeunea* (Spruce) Schiffn. en Afrique (fig. 5) 15
NORMAND, D. — Note sur les bois de *Guibourtia Arnoldiana* et de *Copaifera religiosa* du Mayumbe (Pl. I et II) 19

LÉONARD, J. — *Lepidobotrys* ENGL., type d'une famille nouvelle de Spermatophytes : les *Lepidobotryaceae* (fig. 6) 31
DEMARET, F. — Les mousses des chutes de la Tshopo (Congo belge)... 41
LÉONARD, J. — Notulae Systematicae VII. Un *Pittosporum* nouveau d'Afrique équatoriale (fig. 7) 47
DEMARET, F. — Les Ptéridophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi. II... 51
BOUTIQUE, R. et TROUPIN, G. — *Theaceae*. Famille nouvelle pour la flore du Congo belge (fig. 8-10) ... 61
ARÈNES, J. — Monographie du genre *Arctium* L. (Pl. III-VII, fig. 11-15) 67
ROBYNS, W. et LAWALRÉE, A. — Trois *Thesium* nouveaux du Congo belge 157

Fasc. 2 (Décembre 1950) Afl. 2 (December 1950)

VANDEN BERGHEN, C. — Contribution à l'étude des espèces africaines du genre *Lopholejeunea* (SPRUCE) SCHIFFN. (fig. 16-20)... 161
WILCZEK, R. — Note sur quelques *Capparidaceae* nouvelles du Congo belge... 181
HAUMAN, L. — Sur quelques *Capparidaceae* d'Afrique tropicale (fig. 21) 191
ROBYNS, W. et WILCZEK, R. — Contribution à l'étude du genre *Beilschmiedia* de l'Afrique tropicale (fig. 21). 197
LÉONARD, J. — Notulae Systematicae VIII. — *Pittosporaceae* et *Caesalpiniaceae-Amherstieae* congolanae novae (fig. 22) 227
STEYAERT, R. L. — Note sur des *Cassia* africains et asiatiques de la section *Chamaecrista* avec description de nouvelles espèces (Pl. VIII-X, fig. 23-26) 233
LÉONARD, J. — Notulae Systematicae IX. — Nouvelles observations sur le genre *Guibourtia (Caesalpiniaceae)* (fig. 27-28)... 269
TROUPIN, G. — Contribution à l'étude systématique de *Berlinia* SOLAND. et genres voisins *(Caesalpiniaceae-Amherstieae)* (fig. 29-30) 285
DEMARET, F. — Une capsule double chez *Mnium hornum* HEDW. (fig. 31) 325

Fasc. supplémentaire 1 (Décembre 1950)
Aanvullende aflevering 1 (December 1950)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1950.

VOLUME XXI DEEL XXI
Fasc. 1-2 (Juin 1951) Afl. 1-2 (Juni 1951)

ROBYNS, W. — Une Flore générale de Belgique... 1
DEMARET, F. et POTIER DE LA VARDE, R. — Les espèces africaines du genre *Cyclodictyon* MITT. (fig. 1-22) 11
VANDEN BERGHEN, C. — Contribution à l'étude des espèces africaines du genre *Ceratolejeunea* (SPRUCE) SCHIFFN. (fig. 23-28) 61
WILCZEK, R. — Deux nouvelles espèces de *Caesalpinia* du Congo belge (fig. 29) 83
VANDEN BERGHEN, C. — Contribution à l'étude des espèces africaines du genre *Brachiolejeunea* (SPRUCE) SCHIFFN. (fig. 30-31)... 87
BOUTIQUE, R. — Annonacées nouvelles de la flore du Congo belge et du Ruanda-Urundi (Pl. I-IV) 95
LÉONARD, J. — Notulae systematicae X. *Leguminosae-Caesalpinieae* africanae novae (fig. 32-36) 127
TROUPIN, G. — Plantae africanae I. *(Myristicaceae-Connaraceae)* (fig. 37-38)... 141
WILCZEK, R. — Révision des genres *Blighia* KOENIG et *Phialodiscus* RADLK. (fig. 39-41)... 149
HAUMAN, L. — Contribution à l'étude des *Chrysobalanoideae* africaines (fig. 42-43) 167
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE TAXONOMIE BOTANIQUE. — Circulaire 199

Fasc. 3-4 (Décembre 1951) Afl. 3-4 (December 1951)

HEIM, R. — *Les Termitomyces* du Congo belge recueillis par M^me^ M. Goossens-Fontana (Pl. V-VI, fig. 44-47). 205
HEINEMANN, P. — Champignons récoltés au Congo belge par M^me^ M. Goossens-Fontana. I. *Boletineae* (fig. 48-98)... 223
MELVILLE, R. — The elms of the Dumortier Herbarium ... 347

WILCZEK, R. — Une espèce nouvelle de *Kaoue* Pellegr. du Congo belge (Pl. VII)... 353
STEYAERT, R. L. — Description de *Cassia* nouveaux pour la flore du Congo belge (fig. 99-100)... 357
HOYLE, A. C. — Notulae systematicae africanae I. Deux variétés nouvelles de *Brachystegia spiciformis (Caesalpiniaceae)* (fig. 101) 361
TROUPIN, G. — Plantae Africanae II. *(Connaraceae)* ... 365
LÉONARD, J. — Notulae systematicae XI. Les *Cynometra* et les genres voisins en Afrique tropicale (Pl. VIII, fig. 102-116) 373
NORMAND, D. et CAVACO, A. — Observations taxonomiques et xylologiques sur le genre *Pinacopodium* Exell et Mendonça (Pl. IX-X, fig. 117) 451

Fasc. supplémentaire (Décembre 1951) — Aanvullende aflevering (December 1951)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1951.

VOLUME XXII — DEEL XXII
Fasc. 1-2 (Juin 1952) — Afl. 1-2 (Juni 1952)

VANDEN BERGHEN, C. — Contribution à l'étude des bas-marais de Belgique (fig. 1-5) 1
LAWALRÉE, A. — *Ulmus hollandica* Mill. en Belgique (fig. 6)... 65
GERMAIN, R. — Groupes nouveaux de Spermatophytes de la plaine de la Ruzizi (Congo belge) 71
LAWALRÉE, A. — Le genre *Rumex* sous-genre *Acetosella* en Belgique (fig. 7) 79
HAUMAN, L. — Sur quelques Rosacées d'Afrique tropicale (fig. 8) 87
BREMEKAMP, C. E. B. — Rubiacées nouvelles pour le Congo belge 97
STEYAERT, R. L. — Description de *Sida* nouveaux du Congo belge *(Malvaceae)* 105
PICHON, M. — Extension au Congo belge de l'aire de quelques Apocynacées... 107
— , — Classification des Apocynacées : XXXIV, les *Malouetiinae* d'Afrique (Pl. I, fig. 9) 115

KOSTERMANS, A. J. G. H. — Some new names in african species of *Beilschmiedia* Nees *(Lauraceae)*... 137
GERMAIN, R. — Une nouvelle espèce de *Schizachyrium* au Congo belge (fig. 10)... 139
ROBYNS, W. et VAN DER VEKEN, P. — *Digitariae* novae congolanae africanaeque (fig. 11-14) 143
DEMARET, F. — Complément à l'étude des espèces africaines du genre *Cyclodictyon* Mitt. (fig. 15-16) ... 155
VANDEN BERGHEN, C. — Notes sur quelques Lejeunéacées de l'Afrique continentale (fig. 17-19) 165
GILBERT, G. et BOUTIQUE, R. — Groupes nouveaux de Mimosacées et de Caesalpiniacées 177
LÉONARD, J. — Notulae systematicae XII. Les genres *Macrolobium* Schreb. et *Gilbertiodendron* J. Léonard au Congo belge *(Caesalpiniaceae)* (fig. 20-21). 185

Fasc. 3-4 (Décembre 1952) Afl. 3-4 (December 1952)

LAWALRÉE, A. — Le groupe du *Valeriana officinalis* L. en Belgique... 193
LÉONARD, J. — Notulae systematicae XIII. *Caesalpiniaceae* africanae *(Cynometra, Didelotia, Zingania, Cryptosepalum, Pynaertiodendron)* (fig. 22-25) 201
LAWALRÉE, A. — Deux hybrides *Polygonum convolvulus* × *dumetorum* (fig. 26) 211
CRONQUIST, A. — New species and varieties of *Papilionaceae* from the Belgian Congo... 215
VERDCOURT, B. — A revision of certain african genera of herbaceous *Rubiaceae*. I. — The genus *Pentanisia* Harvey (fig. 27-32) 233
SCHUBERT, B. G. — Notes on *Desmodium* and *Droogmansia* in the Belgian Congo (fig. 33) 287
CRONQUIST, A. — A new species and a new combination in tropical african *Compositae* 309
HUBBARD, C. E. and LÉONARD, J. — A new genus of *Gramineae* from tropical Africa 313
ROBYNS, W. — A new species of *Vangueriopsis* Robyns from Liberia (fig. 34) 319
DEMARET, F. et POTIER DE LA VARDE, R. — Les espèces africaines du genre *Callicostella* (C. Müll.) Jaeg. (fig. 35-61)... 323

Fasc. supplémentaire 1 (Décembre 1952) — Aanvullende aflevering 1 (December 1952)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1952.

VOLUME XXIII Fasc. 1-2 (Juin 1953) — DEEL XXIII Afl. 1-2 (Juni 1953)

DEMARET, F. — Note sur *Callicostella heterophylla* J. Ångstr. (fig. 1) ... 1

VERDCOURT, B. — A revision of certain african genera of herbaceous *Rubiaceae*. II. — The genus *Otomeria* Benth. and the new genus *Batopedina* Verdcourt (fig. 2-3) ... 5

— , — A revision of certain african genera of herbaceous *Rubiaceae*. III. — The genus *Virectaria* Brem. (fig. 4-5) ... 35

— , — A revision of certain african genera of herbaceous *Rubiaceae*. IV. — Notes on the genera *Parapentas* Brem., *Tapinopentas* Brem., and *Otiophora* Zucc. 53

VANDEN BERGHEN, C. — Le genre *Leptolejeunea* (Spruce) Schiffn. en Afrique continentale (fig. 6-8). 65

HEINEMANN, P. — Champignons récoltés au Congo belge par M^me^ Goossens-Fontana. I. *Boletineae*, Note complémentaire (fig. 9) ... 73

LAWALRÉE, A. — *Stellaria nemorum* L. subsp. *glochidosperma* Murb. en Belgique ... 77

MÖRZER BRUIJNS, M. F., LAWALRÉE, A., SCHIMMEL, H. en DEMARET, F. — Vegetatieonderzoek van het Zwin in 1951-1952 (fig. 10-22) ... 81

WILCZEK, R. — *Papilionaceae Genisteae* congolanae novae *(Robynsiophyton, Crotalaria, Argyrolobium)* (Pl. I-VI, fig. 23-25) ... 125

Fasc. 3-4 (Décembre 1953) — Afl. 3-4 (December 1953)

TROUPIN, G. — Plantae africanae III. *Aponogetonaceae* (Nouvelle famille pour le Congo belge) ... 223

TROUPIN, G. et PETIT, E. — *Pseudomussaenda* Wernham au Congo belge ... 227

BOUTIQUE, R. — Espèces nouvelles du genre *Lotus* L. *(Papilionaceae)*... 233
VERDCOURT, B. — A revision of certain african genera of herbaceous *Rubiaceae*. V. — A revision of the genus *Pentas* BENTHAM together with a key to related genera (fig. 26-35) 237
GERMAIN, R. et ÉVRARD, C. — Un nouveau *Brachiaria* de l'Est du Congo belge (fig. 36-37) 273
TOUSSAINT, L. — Papilionacées nouvelles du Congo belge. 279
LAWALRÉE, A. — *Veronica Anagallis-aquatica* L. et *Veronica catenata* PENNELL en Belgique 383
PICHON, M. — Classification des Apocynacées : XXXVII, une espèce nouvelle du genre *Hunteria* (fig. 38) ... 391

Supplément — Bijvoegsel

CUFODONTIS, G. — Enumeratio plantarum Aethiopiae, Spermatophyta (fig. 1) ... ...I-XVI, I-112

Fasc. supplémentaire 1 (Décembre 1953) — Aanvullende aflevering 1 (December 1953)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1953.

VOLUME XXIV — DEEL XXIV
Fasc. 1 (Mars 1954) — Afl. 1 (Maart 1954)

ROBYNS, W. et PETIT, E. — Note supplémentaire sur *Oxygonum* BURCH. et sur les espèces congolaises de ce genre... 1
PICHON, M. — Classification des Apocynacées : XXXVIII, révision du genre *Oncinotis* BENTH. (Pl. I-II, fig. 1-2). 9
VANDEN BERGHEN, C. — Le genre *Marchantia* L. au Congo belge (fig. 3-7) 37
DEMARET, F. — Additions à la flore bryologique du Congo belge (fig. 8-9) 51
LÉONARD, J. — Notulae systematicae XIV. Les genres *Macrolobium* SCHREB. et *Gilbertiodendron* J. LÉONARD en Afrique tropicale *(Caesalpiniaceae)* 57
— , — Notulae systematicae XV. *Papilionaceae-Hedysareae* africanae *(Aeschynomene, Alysicarpus, Ormocarpus)* (fig. 10-14) 63

Fasc. 2 (Juin 1954) Afl. 2 (Juni 1954)

DEMARET, F. — Contribution à l'étude de la végétation bryophytique pionnière des falaises de Yangambi au Congo belge (fig. 1-4) 107
HEINEMANN, P. — Notes sur les *Boletineae* africaines (fig. 5-7) 113
— , — Un Bolet de l'Ile de la Trinité (fig. 8) 121
MILNE-REDHEAD, E. — A new *Zornia* from tropical Africa *(Leguminosae-Papilionaceae-Hedysareae)* ... 127

Supplément Bijvoegsel

CUFODONTIS, G. — Enumeratio Plantarum Aethiopiae, Spermatophyta (Sequentia) 113-192

Fasc. 3 (Septembre 1954) Afl. 3 (September 1954)

PICHON, M. — Classification des Apocynacées : XXXIX, révision du genre *Alafia* THOU. (Pl. III-VI, fig. 15-20) 129
HAUMAN, L. — Quelques *Papilionaceae-Dalbergieae* du Congo belge 223
LAWALRÉE, A. — *Juncus Kochii, Euphrasia montana* et *Galeopsis bifida* en Belgique (fig. 21) 229
POTIER DE LA VARDE, R. — *Oligotrichum africanum* P. DE LA V. sp. nov. (fig. 22) 235
DEMARET, F. — *Orthodontium lineare* SCHWAEGR. en Belgique... 239

Fasc. 4 (Décembre 1954) Afl. 4 (December 1954)

ARÈNES, J. — Les Composées-Cynarocéphales de Belgique. 241
RAYMOND-HAMET. — Sur le *Kalanchoë rhombopilosa* MANNONI et BOITEAU (fig. 23-24) 329
KOSTERMANS, A. J. G. H. — A note on some african *Sterculiaceae*... 335
PETIT, E. — A propos de « *Mussaenda stenocarpa* » HIERN *(Rubiaceae)* (Pl. VII)... 339
LÉONARD, J. — Notulae systematicae XVI. *Paramacrolobium* genre nouveau de *Caesalpiniaceae* d'Afrique tropicale... 347
ROBYNS, A. — Essai d'étude systématique et écologique des *Centaurium* de Belgique (Pl. VIII-XI, fig. 25-32)... 349

VAN DER VEKEN, P. — Sur l'identité de l'*Ichnanthus Dewildemani* VANDERYST *(Gramineae)* (fig. 33-34). 399
WILCZEK, R. — Groupes nouveaux des *Phaseoleae-Phaseolinae* du Congo belge et du Ruanda-Urundi (Pl. XII-XIII, fig. 35) 405
DEMARET, F. — Une collection de Muscinées africaines des hautes altitudes (fig. 36)... 451

Fasc. supplémentaire 1 (Décembre 1954)

Aanvullende aflevering 1 (December 1954)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1954.

VOLUME XXV
Fasc. 1 (Mars 1955)

DEEL XXV
Afl. 1 (Maart 1955)

HEIM, R. — Les Lactaires d'Afrique intertropicale (Congo belge et Afrique noire française (Pl. I-VI, fig. 1-37). 1
HAUMAN, L. — Contribution à l'étude des *Papilionaceae-Phaseoleae* du Congo belge et du Ruanda-Urundi ... 93
BOUTIQUE, R. — Une nouvelle espèce du genre *Abrus* L. *(Papilionaceae-Vicieae)* d'Afrique tropicale... 127
TROUPIN, G. — Contribution à l'étude des Ménispermacées africaines III 131
VAN DER VEKEN, P. — Trois taxa nouveaux de Cypéracées du Congo belge (fig. 38-39) 143

Fasc. 2 (Juin 1955)

Afl. 2 (Juni 1955)

PETIT, E. — Les *Mussaenda* L. *(Rubiaceae)* du Congo belge... 149
HEINEMANN, P. — Champignons récoltés au Congo belge par M^me^ M. Goossens-Fontana I. *Boletineae.* — Note complémentaire 2 (fig. 40-43) 169
HOYLE, A. C. — Notulae systematicae II. A new species of *Brachystegia* from Southern Nigeria *(Caesalpiniaceae)* (fig. 44) 183
STEYAERT, R. L. — *Pestalotia, Pestalotiopsis* et *Truncatella* 191

LÉONARD, J. — Notulae systematicae XVII. — Les genres *Anthonotha* P. Beauv. et *Pellegriniodendron* J. Léonard en Afrique tropicale *(Caesalpiniaceae)* 201

Supplément Bijvoegsel

CUFODONTIS, G. — Enumeratio plantarum Aethiopiae, Spermatophyta (Sequentia) 193-272

Fasc. 3 (Septembre 1955) Afl. 3 (September 1955)

LAWALRÉE, A. — *Cochlearia pyrenaica* DC. en Belgique. 205
KEAY, R. W. J. — A new species of *Parkia* R. Br. *(Leguminosae-Mimosaceae)* 209
MAC LEAY, K. N. G. — Geographical relationships of the Pteridophyte flora of the Sudan 213
TROUPIN, G. — Plantae Africanae IV. *Monocotyledoneae* (fig. 45) 221
ROBYNS, W. et TOURNAY, R. — Monocotylées nouvelles ou critiques de la région du Parc National Albert (Congo belge) (fig. 46) 239
GERMAIN, R. — Acquisitions nouvelles pour la flore du Congo belge *(Octoknemaceae, Flacourtiaceae, Guttiferae)* 261

Supplément Bijvoegsel

CUFODONTIS, G. — Enumeratio Plantarum Aethiopiae, Spermatophyta (Sequentia) 273-344

Fasc. 4 (Décembre 1955) Afl. 4 (December 1955)

TROUPIN, G. — Plantae Africanae. V. Note sur le genre *Kaempferia* L. au Congo belge (*Zingiberaceae)* ... 265
KEAY, R. W. J. et MIÈGE, J. — *Neostachyanthus occidentalis* Keay et Miège. Nouvelle espèce d'Icacinacée d'Afrique occidentale (fig. 47-51) 271
LÉONARD, J. — Notulae systematicae XVIII. *Euphorbiaceae* Africanae novae (Pl. VII, fig. 52) 281
WILCZEK, R. — Novitates Africanae I *(Malpighiaceae* et *Linaceae)* (Pl. VIII) 303
LÉONARD, J. — A propos des genres africains *Grossera* Pax et *Cavacoa* J. Léonard *(Euphorbiaceae)* (fig. 53-54)... 315

VAN DER VEKEN, P. — Graminées nouvelles ou peu connues de l'Afrique centrale (fig. 55-56) 325
PETIT, E. — *Polygalaceae* nouvelles du Congo belge 333
HAUMAN, L. — Notes sur le genre *Dichapetalum* Thou. en Afrique centrale 339
DEMARET, F. et POTIER DE LA VARDE, R. — Deux *Hookeriaceae* nouvelles du Ruwenzori (Congo belge) (Pl. IX-X) 353
LÉONARD, J. — Notulae systematicae XIX. Observations sur divers *Bridelia* africains *(Euphorbiaceae)* 359
BAMPS, P. — *Hyparrhenia* nouveaux du Congo belge *(Gramineae)* 391
ROBYNS, W. et TOURNAY, R. — Essai de révision du genre *Arisaema* Mart. *(Araceae)* en Afrique tropicale 395
GERMAIN, R. et KESLER, W. — Un *Coffea* nouveau du Congo belge (fig. 57)... 405
LAWALRÉE, A. — La Chélidoine double et la Chélidoine laciniée en Belgique 409

Fasc. supplémentaire 1 (Décembre 1955)
Aanvullende aflevering 1 (December 1955)

Delectus seminum quae Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1955.

Table alphabétique des articles
Alphabetische tafel van de artikels

Abrus L. (Papilionaceae-Vicieae) d'Afrique tropicale (une nouvelle espèce du genre), XXV : 127, par R. Boutique.

Acalypha L. (révision des espèces congolaises du genre), XV : 132, par P. Staner.

Acanthaceen aus dem Oestlichen Belgischen Kongo (neue und seltene), XIV : 353, par J. Mildbread.

Accommodation individuelle chez Polygonum amphibium (l'), I : 73, par J. Massart.

Acioa Aubl. (contribution à l'étude des espèces africaines du genre), VII : 188, par E. De Wildeman.

Acquisitions nouvelles pour la flore du Congo belge (Octoknemaceae, Flacourtiaceae, Guttiferae), XXV : 261, par R. Germain.

Additions à la flore bryologique du Congo belge, XXIV : 51, fig. 8-9, par F. Demaret.

Additions à la Flore du Congo, IV : 1, par E. De Wildeman.

Additions à la Flore du Congo II, V : 117, par E. De Wildeman.

Additions à la Flore du Congo III, VI : 1, pl. I-35, par E. De Wildeman.

Additions à la Flore du Congo, VII : 1, par E. De Wildeman.

Additions à la Flore du Congo, VII : 271, par E. De Wildeman.

African species of Beilschmiedia Nees (Lauraceae) (some new names in), XXII : 137, par A. J. G. H. Kostermans.

African Sterculiaceae (a note on some), XXIV : 335, par A. J. G. H. Kostermans.

Afrikanische Amaranthaceen aus dem Herbarium Brüssel, XV : 55, par K. Suessenguth.

Afrique centrale et orientale (le genre Andreaea en), XVII : 33, fig. 6-12, par F. Demaret.

Afrique tropicale (le genre Protea L. en), XVII : 165, par L. Hauman.

Afrique tropicale centrale (un nouveau genre de Labiatae-Ocimoideae de l'), XVII : 27, par W. Robyns.

Afrormosia au Congo belge (contribution à l'étude du genre), XVII : 109, par J. Louis.

Aire de quelques Apocynacées (extension au Congo belge de l'), XXII : 107, par M. Pichon.

Aizoacées et sur un Chenopodium du Congo belge (note sur quelques), XIX : 443, par L. Hauman.

Alchemilla d'Afrique (documents pour une monographie des), VI : 207, par E. De Wildeman.

Alchemilla d'Afrique. II. Sur les Alchemilla de Madagascar (documents pour une monographie des), VII : 317, par E. De Wildeman.

Alchemilla d'Afrique. III. Les Alchemilla du groupe « Pedatae » Engler (documents pour une monographie des), VII : 339, par E. De Wildeman.

Alchemilla d'Afrique (documents pour une monographie des). IV. Notes sur des Alchemilla du groupe « Subochreatae » Engler, VII : 359, par E. De Wildeman.

Alchemilla d'Afrique (documents pour une monographie des). V. Sur quelques espèces du groupe « Latilobae » Engler, VII : 378, par E. De Wildeman.

Alchemilla de l'Abyssinie et de Madagascar, avec un tableau synoptique des espèces africaines (les), XIV : 1, fig. 1-13, par L. Hauman et S. Balle.

Alfred Cogniaux, V : I-XXIX, par E. De Wildeman.

Alectra Thunb. (révision des espèces congolaises du genre), XIX : 271, par G. Troupin.

Amaranthaceen aus den Herbarium Brüssel (afrikanische), XV : 55, par K. Suessenguth.

Amaranthacées nouvelles ou mal connues de l'Afrique équatoriale (sur quelques), XVIII : 105, par L. Hauman.

Amaranthus nouvelles pour la Flore belge (dix espèces d'), XIX : 243, par A. W. Kloos.

Ambrosia adventices en Europe occidentale (les), XVIII : 305, par A. Lawalrée.

Anacolosa au Congo belge (une espèce nouvelle d'), XVIII : 255, 1 pl., par J. Louis et R. Boutique.

Andreaea en Afrique centrale et orientale (le genre), XVII : 33, fig. 6-12, par F. Demaret.

A new genus of Gramineae from tropical Africa, XXII : 313, par C. B. Hubbard and J. Léonard.

A new species and a new combination in tropical african Compositae, XXII : 309, par A. Cronquist.

A new species of Otiophora from central Africa, XVIII : 103, par E. Milne-Redhead.

A new species of Parkia R. Br. (Leguminosae-Mimosaceae), XXV : 209, par R. W. J. Keay.

A new species of Vangueriopsis Robyns from Liberia, XXII : 319, fig. 34, par W. Robyns.

A new Zornia from tropical Africa (Leguminosae-Papilionaceae-Hedysareae), XXIV : 127, par E. Milne-Redhead.

Anniversaire de la naissance de François Crépin (commémoration du centième), IX : 59, Anonyme.

Annonacées nouvelles de la flore du Congo belge et du Ruanda-Urundi, XXI : 95, pl. I-IV, par R. Boutique.

A note on some African Sterculiaceae, XXIV : 335, par A. J. G. H. Kostermans.

Apocynacées : XXXIV, Les Malouetiinae d'Afrique (classification des), XXII : 115, pl. I, fig. 9, par M. Pichon.

Apocynacées : XXXVII, une espèce nouvelle du genre Hunteria (classification des), XXIII : 391, fig. 38, par M. Pichon.

Apocynacées : XXXVIII, révision du genre Oncinotis Benth. (classification des), XXIV : 9, pl. I-II, fig. 1-2, par M. Pichon.

Apocynacées : XXXIX, révision du genre Alafia Thou. (classification des), XXIV : 129, pl. III-VI, fig. 15-20, par M. Pichon.

A propos des genres africains Grossera Pax et Cavacoa J. Léonard (Euphorbiaceae), XXV : 315, fig. 53-54, par J. Léonard.

Araliacées du Congo belge (révision des), XIII : 11, par J. Lebrun.

Arctium L. (monographie du genre), XX : 67, pl. III-VII, fig. 11-15, par J. Arènes.

A revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae. I. — The genus Pentanisia Harvey, XXII : 233, fig. 27-32, par B. Verdcourt.

A revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae. II. — The genus Otomeria Benth. and the new genus Batopedina Verdcourt, XXIII : 5, fig. 2-3, par B. Verdcourt.

A revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae. III. — The genus Virectaria Brem., XXIII : 35, fig. 4-5, par B. Verdcourt.

A revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae. IV. — Notes on the genera Parapentas Brem., and Otiophora Zucc., XXIII : 53, par B. Verdcourt.

A revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae. V. — A revision of the genus Pentas Bentham together with a key to related genera, XXIII : 237, fig. 26-35, par B. Verdcourt.

Argyrolobium nouveau pour le Congo (un), VIII : 127, par E. De Wildeman.

Arisaema Mart. (Araceae) en Afrique tropicale (essai de révision du genre), XXV : 395, par W. Robyns et R. Tournay.

Ascomycètes nouveaux pour la flore belge (note sur quelques), XV : 333, par G. Verplancke.

Association Internationale de Taxonomie Botanique. Circulaire, XXI : 199. Anonyme.

Astragalus nouveau de la région du Rutshuru (Ruchuru) (un), VIII : 125, par E. De Wildeman.

Bananiers indigènes du Ruanda (deux), VIII : 103, par E. De Wildeman.

Bas-marais de Belgique (contribution à l'étude des), XXII : 1, fig. 1-5, par C. Vanden Berghen.

Batrachospermum en Belgique (sur la répartition du genre), XV : 319, 1 fig. et 1 pl., par L. I. J. Van Meel.

Batrachospermum en Belgique II (sur la répartition du genre), XVII : 49, par L. I. J. Van Meel.

Beilschmiedia de l'Afrique tropicale (contribution à l'étude du genre), XX : 197, fig. 21, par W. Robyns et R. Wilczek.

Beilschmiedia Nees (Lauraceae) (some new names in african species of), XXII : 137,, par A. J. G. H. Kostermans.

Belgique (coup d'œil sur les principaux groupements bryophytiques de quelques rochers calcaires en), XVII : 181, fig. 18, par F. Demaret.

Belgique (sur la répartition du genre Batrachospermum en), XV : 319, 1 fig. et 1 pl.; II, XVII : 49, par L. I. J. Van Meel.

Berlinia Soland. et genres voisins (Caesalpiniaceae Amherstieae) (contribution à l'étude systématique de), XX : 285, fig. 29-30, par G. Troupin.

Bibliothèque collective du Jardin Botanique de l'État (notes sur la), IX : 99, par P. Van Aerdschot.
Bidens and Coreopsis from belgian Congo and central Africa (novelties in), XIII : 285, par E. E. Sherff.
Blighia Koenig et Phialodiscus Radlk. (révision des genres), XXI : 149, fig. 39-41, par R. Wilczek.
Bois de Guibourtia Arnoldiana et de Copaifera religiosa du Mayumbe (note sur les), XX : 19, pl. I et II, par D. Normand.
Bois d'Enantia (Annonacées) (note sur les), IX : 317, pl. IV, par D. Normand.
Bolet de l'Ile de la Trinité (un), XXIV : 121, fig. 8, par P. Heinemann.
Boletinae africaines (notes sur les), XXIV : 113, fig. 5-7, par P. Heinemann.
Bommer Charles (1866-1938), XV : 121, avec portrait, par E. De Wildeman.
Boulenger G. A. (1858-1937). Sa vie et son œuvre rhodologique, XV : 1, avec portrait et 1 fig., par W. Robyns.
Brachiaria de l'Est du Congo belge (un nouveau), XXIII : 273, fig. 36-37, par R. Germain et C. Evrard.
Brachiolejeunea (Spruce) Schiffn. (contribution à l'étude des espèces africaines du genre), XXI : 87, fig. 30-31, par C. Vanden Berghen.
Brachythecium velutinum (Hedw.) Br. et Schpr var. validum (C. Jens.) C. Jens. (une forme nouvelle de), XVIII : 97, 1 pl., 1 fig., par F. Demaret.
Bryophytes des hautes altitudes au Ruwenzori (les), XVI : 311, fig. 22, par L. Hauman.
Bryophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi. I. Musci (prodrome des), XVI : 21, par F. Demaret.
Bryophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi. II. Hepaticae (prodrome des), XVI : 287, par F. Demaret.
Bryophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi (I. Musci, Supplément I) (prodrome des), XVIII : 7, par F. Demaret.
Bryum Brotherianum Demaret nom. nov., XIX : 335, fig. 29, par F. Demaret.

Caesalpiniaceae du Congo belge (deux nouvelles espèces de), XXI : 83, fig. 29, par R. Wilczek.
Callicostella (C. Müll.) Jaeg. (les espèces africaines du genre), XXII : 323, fig. 35-61, par F. Demaret et R. Potier de la Varde.

Callicostella heterophylla J. Angstr. (note sur), XXIII : 1, fig. 1, par F. Demaret.

Campylopus du Parc National Albert (Congo belge) (une espèce nouvelle de), XIX : 85, fig. 6, par F. Demaret et V. Leroy.

Campylostemon Laurentii De Wild. et la position systématique du genre Campylostemon Welw., XVIII : 249, 1 fig., par A. Lawalrée.

Capparidaceae d'Afrique tropicale (sur quelques), XX : 191, fig. 21, par L. Hauman.

Capsule double chez Mnium hornum Hedw. (une), XX : 325, fig. 31, par F. Demaret.

Carduus du Ruwenzori (deux), VIII : 115, par E. De Wildeman.

Cassia africains et asiatiques de la section Chamaecrista avec description de nouvelles espèces (note sur des), XX : 233, fig. 23-26, par R. L. Steyaert.

Cassia nouveaux pour la flore du Congo belge (description de), XXI : 357, fig. 99 et 100, par R. L. Steyaert.

Catalogue bryologique de la Forêt de Soignes, XIV : 379, par F. Demaret.

Catalogue de la Bibliothèque collective réunie au Jardin Botanique de l'État à Bruxelles, III : 1, par P. Van Aerdschot.

Centaurium de Belgique (essai d'étude systématique et écologique des), XXIV : 349, fig. 25-32, par A. Robyns.

Ceratolejeunea (Spruce) Schiffn. (contribution à l'étude des espèces africaines du genre), XXI : 61, fig. 23-28, par C. Vanden Berghen.

Ceropegia (Uebersicht ueber die aus dem Belgischen Kongo stammenden Arten der Gattung), XV : 222, par E. Werdermann.

Champignon hypogé du Congo belge (Un nouveau), VIII : 23, par O. Mattirolo.

Champignons nouveaux pour la Flore belge (quelques), XVI : 9, par G. Verplancke.

Champignons récoltés au Congo belge par Mme M. Goossens-Fontana. I. Boletineae, XXI : 223, fig. 48-98, par P. Heinemann.

Champignons récoltés au Congo belge par Mme M. Goossens-Fontana. I. Boletineae, Note complémentaire, XXIII : 73, fig. 9, par P. Heinemann.

Champignons récoltés au Congo belge par Mme M. Goossens-Fontana. I. Boletineae. — Note complémentaire 2, XXV : 169, par P. Heinemann.

Champignons signalés au Congo (énumération des), VIII : 67, par M. Beeli.
Chélidoine double et la Chélidoine laciniée en Belgique (la), XXV : 409, par A. Lawalrée.
Choripétales nouvelles de la région du Parc National Albert (Congo belge), XVIII : 261, par W. Robyns.
Chrysobalanoideae africaines (contribution à l'étude des), XXI : 167, fig. 42-43, par L. Hauman.
Cinnamomum L. (sur quelques épidermes de feuilles de), XVII : 266, pl. IV-XXI, par M.-L. Marlier-Spirlet.
Classification des Apocynacées : XXXIV, les Malouetiinae d'Afrique, XXII, 115, pl. I, fig. 9, par M. Pichon.
Classification des Apocynacées : XXXVII, une espèce nouvelle du genre Hunteria, XXIII : 391, fig. 38, par M. Pichon.
Classification des Apocynacées : XXXVIII, révision du genre Oncinotis Benth., XXIV : 9, fig. 1-2, par M. Pichon.
Classification des Apocynacées : XXXIX, révision du genre Alafia Thou., XXIV : 129, pl. III-VI, fig. 15-20, par M. Pichon.
Clerodendron (notes sur quelques espèces africaines du genre), VII : 161, par E. De Wildeman.
Clitandra du Parc National Albert (Congo belge) (une espèce nouvelle de), XVIII : 259, par W. Robyns et R. Boutique.
Cochlearia pyrenaica DC. en Belgique, XXV : 205, par A. Lawalrée.
Coffea nouveau du Congo belge (un), XXV : 405, fig. 57, par R. Germain et W. Kesler.
Cogniaux (Alfred), V : I-XXIX, par E. De Wildeman.
Cola from Tanganyika Territory (a new species of), XVIII : 1, 1 pl., par J. P. M. Brenan and A. P. D. Jones.
Collection de Muscinées africaines des hautes altitudes (une), XXIV : 451, fig. 36, par F. Demaret.
Collections éthologiques au Jardin Botanique de l'État (les), I : 217, par J. Massart.
Collection phylogénique au Jardin Botanique de l'État (la), I : 403, par J. Massart.
Commémoration du centième anniversaire de la naissance de François Crépin, IX : 59, Anonyme.
Comment les jeunes feuilles se protègent contre les intempéries, I : 181, par J. Massart.
Comment les plantes vivaces maintiennent leur niveau souterrain, I : 113, par J. Massart.

Comment les plantes vivaces sortent de terre au printemps, I : 143, par J. Massart.

Communication. — VI[e] Congrès International de Botanique, IX : 348, Anonyme.

Complément à l'étude des espèces africaines du genre Cyclodictyon Mitt., XXII : 155, fig. 15-16, par F. Demaret.

Composées-Cynarocéphales de Belgique (les), XXIV : 241, par J. Arènes.

Composées du Congo belge (observations critiques sur quelques), XIV : 99, pl. IV-V, par H. Humbert et P. Staner.

Concept des Phytocénoses biotiques principalement dans les régions intertropicales (le), XVI : 413, par W. Robyns.

Congo belge (contribution à l'étude du genre Afrormosia au), XVII : 109, par J. Louis.

Congo belge (Cypéracées nouvelles du), XIII : 277, par H. Chermezon.

Congo belge. II (Cypéracées nouvelles du), XIV : 329, par H. Chermezon.

Congo belge (deux Pilea nouveaux du), XVII : 177, par L. Hauman.

Congo belge (deux Podostémonacées nouvelles du), XVII : 179, par L. Hauman.

Congo belge (les Thyméléacées de la flore du), XIII : 321, 14 fig., par P. Staner.

Congo belge (note sur les Ulmacées du), XVI : 407, par L. Hauman.

Congo belge (observations critiques sur quelques Composées du), XIV : 99, pl. IV-V, par H. Humbert et P. Staner.

Congo belge (révision des Piperaceae du), XVI : 367, pl. XVI, par S. Balle.

Congrès international de Botanique (VI[e]). Amsterdam 2-7 septembre 1935, XIII : 59, Anonyme.

Considérations sur la documentation en Histoire naturelle, VI : 195, par C. Bommer.

Contribution à la Flore algologique du Congo belge d'après les récoltes du R. P. H. Vanderyst, IX : 109, 26 fig., par P. Frémy.

Contribution à l'étude de la Flore et de la Végétation muscinales dans la région de Mariembourg, XV : 152, 1 fig., par F. Demaret.

Contribution à l'étude de la flore mycologique du Congo. — XI. Fungi Goossensiani. — XII. Fungi Loosiani, XIV : 83, pl. II-III, par M. Beeli.

Contribution à l'étude de la végétation bryophytique pionnière des falaises de Yangambi au Congo belge, XXIV : 107, fig. 1-4, par F. Demaret.

Contribution à l'étude des bas-marais de Belgique, XXII : 1, fig. 1-5, par C. Vanden Berghen.

Contribution à l'étude des Chrysobalanoideae africaines, XXI : 167, fig. 42-43, par L. Hauman.

Contribution à l'étude des espèces africaines du genre Acioa Aubl., VII : 188, par E. De Wildeman.

Contribution à l'étude des espèces africaines du genre Brachyolejeunea (Spruce) Schiffn., XXI : 87, fig. 30-31, par C. Vanden Berghen.

Contribution à l'étude des espèces africaines du genre Ceratolejeunea (Spruce) Schiffn., XXI : 61, fig. 23-28, par C. Vanden Berghen.

Contribution à l'étude des espèces africaines du genre Lopholejeunea (Spruce) Schiffn., XX, 161, fig. 16-20, par C. Vanden Berghen.

Contribution à l'étude des espèces africaines du genre Mastigolejeunea (Spr.) Schiffn., XIX, 371, fig. 31-33, par C. Vanden Berghen.

Contribution à l'étude des espèces africaines du genre Metzgeria, XIX : 187, fig. 18-20, par C. Vanden Berghen.

Contribution à l'étude des genres Syrrhopodon et Thyridium et révision des espèces congolaises, XVIII : 207, 9 fig., par F. Demaret et V. Leroy.

Contribution à l'étude des Graminées du Congo et du Ruanda-Urundi, VIII : 209, par W. Robyns.

Contribution à l'étude des Graminées du Congo et du Ruanda-Urundi. II. Panicées, IX : 171, pl. III, par W. Robyns.

Contribution à l'étude des Graminées du Congo belge. III. Pennisetum Rich., XIII : 1, par W. Robyns.

Contribution à l'étude des Graminées du Congo belge et du Ruanda-Urundi. — IV. Schizachyrium kwiluense Vanderyst, XIV : 93, par W. Robyns.

Contribution à l'étude des Lauracées du Congo belge et de l'Afrique tropicale, XIX : 457, fig. 42-49, par W. Robyns et R. Wilczek.

Contribution à l'étude des Légumineuses, principalement du Congo belge. I. Les Cassia africains de la section Chamaecrista Benth., IX : 139, pl. I et II, par L. Ghesquière.

Contribution à l'étude des Ménispermacées africaines — I, XIX : 409, pl. XVIII-XIX, par G. Troupin.

Contribution à l'étude des Ménispermacées africaines, III, XXV : 131, par G. Troupin.

Contribution à l'étude des Papilionaceae-Phaseoleae du Congo belge et du Ruanda-Urundi, XXV : 93, par L. Hauman.

Contribution à l'étude des Pestalotia du Congo belge, XIX : 173, pl. III-VI, par R. Steyaert.

Contribution à l'étude du genre Afrormosia au Congo belge, XVII : 109, par J. Louis.

Contribution à l'étude du genre Beilschmiedia de l'Afrique tropicale, XX : 197, fig. 21, par W. Robyns et R. Wilczek.

Contribution à l'étude du genre Pavetta. Description de quatre espèces nouvelles du Congo belge, XIV : 305, par C. E. B. Bremekamp.

Contribution à l'étude monographique de Pestalotia De Not. et Monochaetia Sacc. (Truncatella gen. nov. et Pestalotiopsis gen. nov.), XIX : 285, pl. VII-XVII, fig. 24-28, par R. L. Steyaert.

Contribution à l'étude systématique de Berlinia Soland. et genres voisins (Caesalpiniaceae-Amherstieae), XX : 285, fig. 29-30, par G. Troupin.

Coup d'œil sur les principaux groupements bryophytiques de quelques rochers calcaires en Belgique, XVII : 181, fig. 18, par F. Demaret.

Crépin François (commémoration du centième anniversaire de la naissance de), IX : 59, Anonyme.

Crépin Fr. et la flore fossile de la Belgique, IX : 86, par C. Bommer.

Crépin Fr., la Société Royale de Botanique de Belgique et le Jardin Botanique de l'État, IX : 66, par E. De Wildeman.

Crépin Fr. et les Roses, IX : 78, par G. A. Boulenger.

Crépin (quelques impressions sur), IX : 83, par H. Christ.

Crepis species of western tropical Africa (Angola, Congo, Cameroons, Nigeria), XIV : 293, par E. B. Babcock.

Crotalaria (notes sur des formes congolaises du genre), VIII : 129, par E. Baker et E. De Wildeman.

Cucurbitaceae novae Herbarii Bruxellensis, V : 109, par A. Cogniaux.

Cyclodictyon Mitt. (les espèces africaines du genre), XXI : 11, fig. 1-22, par F. Demaret et R. Potier de la Varde.

Cyclodictyon Mitt. (complément à l'étude des espèces africaines du genre), XXII : 155, fig. 15-16, par F. Demaret.

Cycnium et Rhamphicarpa (Scrophulariacées) (révision des espèces congolaises des genres), XV : 147, par P. Staner.

Cypéracées du Congo belge (trois taxa nouveaux de), XXV : 143, fig. 38-39, par P. Van der Veken.

Cypéracées nouvelles du Congo belge, XIII : 277, par H. Chermezon.

Cypéracées nouvelles du Congo belge. II, XIV : 329, par H. Chermezon.

Decades novarum specierum Florae Congolensis, III : 253, par E. De Wildeman.

Decades novarum specierum Florae Congolensis, IV : 359, par E. De Wildeman.

Decades novarum specierum Florae Congolensis, V : 1, par E. De Wildeman.

Delectus seminum quae Hortus Bot. Brux. pro mutua commutatione offert : 1930, VIII; 1931, IX; 1932, IX; 1933, IX; 1934, XIII; 1935, XIII; 1936, XIV; 1937, XIV; 1938, XV; 1939, XV; 1940, XVI; 1941, XVI; 1942, XVI; 1945, XVII; 1946, XVIII; 1947, XVIII; 1948, XIX; 1949, XIX; 1950, XX; 1951, XXI; 1952, XXII; 1953, XXIII; 1954, XXIV; 1955, XXV.

Description de Cassia nouveaux pour la flore du Congo belge, XXI : 357, fig. 99 et 100, par R. L. Steyaert.

Description de quatre espèces nouvelles du Congo belge (contribution à l'étude du genre Pavetta), XIV : 305, par C. E. B. Bremekamp.

Description de Sida nouveaux du Congo belge (Malvaceae), XXII : 105, par R. L. Steyaert.

Desmodium and Droogmansia in the Belgian Congo (notes on), XXII : 287, fig. 33, par B. G. Schubert.

Deux Bananiers indigènes du Ruanda, VIII : 103, par E. De Wildeman.

Deux Carduus du Ruwenzori, VIII : 115, par E. De Wildeman.

Deux Pilea nouveaux du Congo belge, XVII : 177, par L. Hauman.

Deux Podostémonacées nouvelles du Congo belge, XVII : 179, par L. Hauman.

De Wildeman Emile (1866-1947), XIX : 1, avec portrait, par W. Robyns.

Dichapetalum Thou. en Afrique centrale (notes sur le genre), XXV : 339, par L. Hauman.

Dicotylées nouvelles du Congo belge et du Territoire du Tanganyika, XIX : 219, par A. Lawalrée.

Dicranum Hedw. en Belgique (le genre), XIX : 91, fig. 7-17, par R. Wilczek.

Digitariae novae congolanae africanaeque, XXII : 143, fig. 11-14, par W. Robyns et P. Van der Veken.

Dioscorea in the Belgian Congo (notes on the Genus), XV : 345, par I. H. Burkill.

Discours, IX : 62, par A. Gravis.

Dix espèces d'Amaranthus nouvelles pour la Flore belge, XIX : 243, par A. W. Kloos.

Documentation en Histoire naturelle (considérations sur la), VI : 195, par C. Bommer.

Documents pour une monographie des Alchemilla d'Afrique, VI : 207, par E. De Wildeman.

Documents pour une monographie des Alchemilla d'Afrique. II. Sur les Alchemilla de Madagascar, VII : 317, par E. De Wildeman.

Documents pour une monographie des Alchemilla d'Afrique. III. Les Alchemilla du groupe « Pedatae » Engler, VII : 339, par E. De Wildeman.

Documents pour une monographie des Alchemilla d'Afrique. IV. Notes sur des Alchemilla du groupe « Subochreatae » Engler, VII : 359, par E. De Wildeman.

Documents pour une monographie des Alchemilla d'Afrique. V. Sur quelques espèces du groupe « Latilobae » Engler, VII : 378, par E. De Wildeman.

Documents pour une monographie du genre Vangueria Juss., VIII : 39, par E. De Wildeman.

Drosera du Congo belge (nouveaux), XVII : 307, par A. Taton.

Durand (Théophile), Directeur du Jardin Botanique de l'État. 8 novembre 1901-12 janvier 1912, IV : I-XVII, par E. De Wildeman.

Elms of the Dumortier Herbarium (the), XXI : 347, par R. Melville.

Enantia (Annonacées) (note sur les bois d'), IX : 317, par D. Normand.

Enantia Oliv. (Annonacées) (révision du genre), IX : 303, par W. Robyns et J. Ghesquière.

Enumeratio Plantarum Aethiopiae, Spermatophyta, XXIII, supplément : I-XVI, 1-112.

Enumeratio Plantarum Aethiopiae, Spermatophyta (Sequentia), XXIV, supplément : 113, par G. Cufodontis.

Enumeratio Plantarum Aethiopiae, Spermatophyta (Sequentia), XXV, supplément : 193, par G. Cufodontis.

Enumeratio Plantarum Aethiopiae, Spermatophyta (Sequentia), XXV, supplément : 273, par G. Cufodontis.

Énumération des champignons signalés au Congo, VIII : 67, par M. Beeli.

Épidermes de feuilles de Cinnamomum L. (sur quelques), XVII : 266, pl. IV-XXI, par M.-L. Marlier-Spirlet.

Épiphyte remarquable de la Forêt congolaise (Ophioglossum Louisii Taton sp. nov.), XVII : 117, pl. II, par A. Taton.

Erodium dentatum Du Mortier, XVIII : 241, 1 fig. par Ch.-H. Andreas.

Erythrina L. (révision des espèces congolaises du genre), XIII : 295, pl. III et 4 fig., par J. Louis.

Erythrina nouveau du Congo belge (un), XV : 217, 2 fig., par J. Ghesquière.

Espèce de Kalanchoë du Mozambique (une nouvelle), XIV : 363, fig. 26 et pl. IX, par L. Croizat.

Espèce de Schizachyrium au Congo belge (une nouvelle), XXII : 139, fig. 10, par R. Germain.

Espèce nouvelle d'Anacolosa au Congo belge (une), XVIII : 255, 1 pl., par J. Louis et R. Boutique.

Espèce nouvelle de Campylopus du Parc National Albert (Congo belge) (une), XIX : 85, fig. 6, par F. Demaret et V. Leroy.

Espèce nouvelle de Clitandra du Parc National Albert (Congo belge) (une), XVIII : 259, par W. Robyns et R. Boutique.

Espèce nouvelle de Ficus du Congo belge (une), XIX : 211, fig. 21, par R. Boutique.

Espèce nouvelle de Hippocratea du Parc National Albert (Congo belge) (une), XIX : 89, par W. Robyns et R. Tournay.

Espèce nouvelle de Kaoue Pellegr. du Congo belge (une), XXI : 353, pl. VII, par R. Wilczek.

Espèces africaines du genre Acioa Aubl. (contributions à l'étude des), VII : 188, par E. De Wildeman.

Espèces africaines du genre Callicostella (C. Müll.) Jaeg. (les), XXII : 323, fig. 35-61, par F. Demaret et R. Potier de la Varde.

Espèces africaines du genre Clerodendron (notes sur quelques), VII : 161, par E. De Wildeman.

Espèces africaines du genre Cyclodictyon Mitt., XXI : 11, fig. 1-22, par F. Demaret et R. Potier de la Varde.

Espèces africaines du genre Dioscorea L. (notes sur des), IV : 311. par E. De Wildeman.

Espèces africaines du genre Grumilea Gaertn. (remarques sur les), IX : 21, par E. De Wildeman.

Espèces africaines (les Alchemilla de l'Abyssinie et de Madagascar, avec un tableau synoptique des), XIV : 1, fig. 1-13, par L. Hauman et S. Balle.

Espèces congolaises du genre Acalypha L. (révision des), XV : 132, par P. Staner.

Espèces congolaises des genres Cycnium et Rhamphicarpa (Scrophulariacées) (révision des), XV : 147, par P. Staner.

Espèces congolaises du genre Cynometra L. (révision des), IX : 281, par J. Lebrun.

Espèces congolaises du genre Erythrina L. (révision des), XIII : 295, pl. III et 4 fig., par J. Louis.

Espèces congolaises du genre Strophanthus P. DC. (révision des), XIII : 23, par P. Staner et D. Michotte.

Espèces congolaises du genre Tetracera L. (révision des), XV : 295, par P. Staner.

Espèces congolaises du genre Thesium L. (révision des), XVII : 135, par W. Robyns et A. Lawalrée.

Espèces nouvelles du genre Lotus L. (Papilionaceae), XXIII : 233, par R. Boutique.

Esquisse des Groupements végétaux de quelques bois du District Hesbayen de Belgique, XV : 173, 4 fig. et 1 pl., par R. Mosseray.

Essai de révision du genre Arisaema Mart. (Araceae) en Afrique tropicale, XXV : 395, par W. Robyns et R. Tournay.

Essai d'étude systématique et écologique des Centaurium de Belgique, XXIV : 349, pl. VIII-XI, fig. 25-32, par A. Robyns.

Essai d'une monographie du genre Tinnea, VIII : 161, par W. Robyns et J. Lebrun.

Étude de la flore mycologique africaine. Note sur les Basidiomycètes récoltés à Sierra Leone par F. C. Deighton, XV : 25, pl. I-IV, par M. Beeli.

Étude de la flore et de la végétation muscinales dans la région de Mariembourg (contribution à l'), XV : 152, 1 fig., par F. Demaret.

Étude du Rosa gymnocarpa Nutt., XIV : 279, fig. 22-23, par G. A. Boulenger.

Étude préliminaire des Hookeriaceae africaines intertropicales, XXV : 375, par F. Demaret.

Étude systématique et écologique des Centaurium de Belgique (essai d'), XXIV : 349, pl. VIII-XI, fig. 25-32, par A. Robyns.

Euphorbiaceae-Antidesminae africanae novae, XVII : 253, fig. 20-24, par J. Léonard.

Euphorbiacées africaines nouvelles ou peu connues : Elaeophorbia et Euphorbia Section Tekeanae, XV : 109, par L. Croizat.

Existence du Juniperus procera Hochst. au Congo belge (sur l'), XVIII : 125, 1 fig., par W. Robyns.

Existence du Quercus pedunculata Ehrh. dans les alluvions de la Nèthe (sur l'), XIII : 57, par R. Mosseray.

Extension au Congo belge de l'aire de quelques Apocynacées, XXII : 107, par M. Pichon.

Ficus du Congo belge (une espèce nouvelle de), XIX : 211, fig. 21, par R. Boutique.

Ficus nouveau pour le Congo belge (un), XIX : 213, par J. Lebrun et R. Boutique.

Flore algologique du Congo belge d'après les récoltes du R. P. H. Vanderyst (contribution à la), IX : 109, 26 fig., par P. Frémy.

Flore algologique du Congo belge d'après les récoltes du R. P. H. Vanderyst (seconde contribution à la), IX : 323, 32 fig., par P. Frémy.

Flore bryologique du Congo belge (additions à la), XXIV : 51, par F. Demaret.

Flore de Belgique. — V. Genre Senecio (matériaux pour une), XIV : 57, pl. I, par R. Mosseray.

Flore de Belgique. — VI. Genres Bidens et Galinsoga (matériaux pour une), XIV : 313, fig. 24-25, par R. Mosseray.

Flore du Congo (additions à la), IV : 1; V : 117; VI : 1, pl. 1-35; VII : 1, 271, par E. De Wildeman.

Flore du Congo belge et du Ruanda-Urundi (une), XIX : 231, par W. Robyns.

Flore du Congo belge (les Guttifères de la), XIII : 61, pl. I et 1 fig., par P. Staner.

Flore du Congo belge (les Thyméléacées de la), XIII : 321, 14 fig., par P. Staner.

Flore du Congo belge (Octoknemaceae, Flacourtiaceae, Guttiferae) (acquisitions nouvelles pour la), XXV : 261, par R. Germain.

Flore fossile de la Belgique (Fr. Crépin et la), IX : 86, par C. Bommer.

Flore générale de Belgique (une), XXI : 1, par W. Robyns.

Flore mycologique africaine. Note sur les Basidiomycètes récoltés à Sierra Leone par F. C. Deighton (étude de la), XV : 25, pl. I-IV, par M. Beeli.

Flore mycologique du Congo. — XI. Fungi Goossensiani. — XII. Fungi Loosiani (contribution à l'étude de la), XIV : 83, pl. II-III, par M. Beeli.

Forêt équatoriale congolaise (Ophioglossum Louisii Taton sp. nov.) (épiphyte remarquable de la), XVII : 117, pl. II, par A. Taton.

Formes congolaises du genre Crotalaria (notes sur des), VIII : 129, par E. Baker et E. De Wildeman.

Forme nouvelle de Brachythecium velutinum (Hedw.) Br. et Schpr var. validum (C. Jens.) C. Jens. (une), XVIII : 97, 1 pl., 1 fig., par F. Demaret.

Frullania Arecae (Spreng.), Gottsche et Lindenb., XIX, 73, fig. 5, par F. Demaret.

Frullania capensis Gottsche et les espèces confondues avec lui, XVIII : 117, 3 fig., par F. Demaret et C. Vanden Berghen.

Frullania Raddi, sous-genre Meteoriopsis Spruce (révision des espèces africaines du genre), XX : 1, fig. 1-3, par F. Demaret et C. Vanden Berghen.

Frullania (révision de quelques espèces africaines du genre), XVIII : 231, par F. Demaret et C. Vanden Berghen.

Genre Andreaea en Afrique centrale et orientale (le), XVII : 33, fig. 6-12, par F. Demaret.

Genre Dicranum Hedw. en Belgique (le), XIX : 91, fig. 7-17, par R. Wilczek.

Genre Enantia Oliv. (Annonacées) (révision du), IX : 303, par W. Robyns et J. Ghesquière.

Genre Erythrina L. (révision des espèces congolaises du), XIII : 295, pl. III et 4 fig., par J. Louis.

Genres Hoffmanniella Schlecht., Eleutheranthera Poit. et Exomiocarpon Lawalrée gen. nov. (les), XVII : 55, fig. 13-14, par A. Lawalrée.

Genre Leptolejeunea (Spruce) Schiffn. en Afrique continentale (le), XXIII : 65, fig. 6-8, par C. Vanden Berghen.

Genre Marchantia L. au Congo belge (le), XXIV : 37, fig. 3-7, par C. Vanden Berghen.

Genre nouveau de Gesnériacées du Congo belge (un), XIII : 7, par P. Staner.

Genre Protea L. en Afrique tropicale (le), XVII : 165, par L. Hauman.

Genre Rumex sous-genre Acetosella en Belgique (le), XX : 79, fig. 7, par A. Lawalrée.

Genre Stictolejeunea (Spruce) Schiffn. en Afrique (le), XX : 15, fig. 5, par C. Vanden Berghen.

Genus of Gramineae from tropical Africa (a new), XXII : 313, par C. E. Hubbard and J. Léonard.

Geographical relationship of the Pteridophyte flora of the Sudan, XXV : 213, par K. N. G. Mac Leay.

Gesnériacées du Congo belge (un genre nouveau de), XIII : 7, par P. Staner.

Gossypium obtusifolium Roxb. (au sujet du spécimen-type de), XVII : 245, par W. Wouters.

Graminées du Congo et du Ruanda-Urundi (contribution à l'étude des), VIII : 209, par W. Robyns.

Graminées du Congo belge et du Ruanda-Urundi. II. Panicées (contribution à l'étude des), IX : 171, pl. III, par W. Robyns.

Graminées du Congo belge et du Ruanda-Urundi. — IV. Schizachyrium kwiluense Vanderyst (contribution à l'étude des), XIV : 93, par W. Robyns.

Graminées du Congo belge. III. Pennisetum Rich. (contribution à l'étude des), XIII : 1, par W. Robyns.

Graminées nouvelles ou peu connues de l'Afrique centrale, XXV : 325, fig. 55-56, par P. Van der Veken.
Gramineae from tropical Africa (a new genus of), XXII : 313, par C. E. Hubbard and J. Léonard.
Grossera Pax et Cavacoa J. Léonard (Euphorbiaceae) (à propos des genres africains), XXV : 315, fig. 53-54, par J. Léonard.
Groupe du Valeriana officinalis L. en Belgique (le), XXII : 193, par A. Lawalrée.
Groupements bryophytiques de quelques rochers calcaires en Belgique (coup d'œil sur les principaux), XVII : 181, fig. 18, par F. Demaret.
Groupements végétaux de quelques bois du District Hesbayen en Belgique ,esquisse des), XV : 173, 4 fig. et 1 pl., par R. Mosseray.
Groupes nouveaux de Mimosacées et Caesalpiniacées, XXII : 177, par G. Gilbert et R. Boutique.
Groupes nouveaux de spermatophytes de la plaine de la Ruzizi (Congo belge), XXII : 71, par R. Germain.
Groupes nouveaux des Phaseoleae-Phaseolinae du Congo belge et du Ruanda-Urundi, XXIV : 405, pl. XII-XIII, fig. 35, par R. Wilczek.
Grumilea Gaertn. (remarques sur les espèces africaines du genre), IX : 21, par E. De Wildeman.
Guttifères de la flore du Congo belge (les), XIII : 61, pl. I et 1 fig., par P. Staner.

Hendricxia Duvign. nouveau genre de Parméliacées des montagnes équatoriales, XVI : 355, fig. 23-24, par P. Duvigneaud.
Herbarium Brüssel (Afrikanischen Amaranthaceen aus dem), XV : 55, par K. Suessenguth.
Herbier du Jardin Botanique de l'État à Bruxelles (les Rubus africains de l'), XIII : 267, pl. II, par C. E. Gustafsson.
Hesperhodos Cocker. (monographie du genre), XIV : 227, fig. 20-21, par G. A. Boulenger.
Hippocratea du Parc National Albert (Congo belge) (une espèce nouvelle de), XIX : 89, par W. Robyns et R. Tournay.
Hoffmanniella Schlecht., Eleutheranthera Poit. et Exomiocarpon Lawalrée gen. nov. (les genres), XVII : 55, fig. 13-14, par A. Lawalrée.
Hookeriaceae africaines intertropicales (étude préliminaire des), XXV : 375, par F. Demaret.

Hookeriaceae nouvelles du Ruwenzori (Congo belge) (deux), XXV : 353, pl. IX-X, par F. Demaret et R. Potier de la Varde.
Hybrides Polygonum convolvulus × dumetorum (deux), XXII : 211, fig. 26, par A. Lawalrée.
Hyparrhenia nouveaux du Congo belge (Gramineae), XXV : 391, par P. Bamps.

Identité de l'Ichnanthus Dewildemani Vanderyst (Gramineae) (sur l'), XXIV : 399, fig. 33-34, par P. Van der Veken.
Inauguration du buste de François Crépin au Jardin Botanique de l'État. — Compte rendu de la cérémonie du 5 décembre 1904, I : 281, Anonyme.
Indigofera du Congo (sur quelques), VIII : 143, par E. Baker et E. De Wildeman.
Instituts botaniques et coloniaux de Berlin, Dresde et Paris en 1902 (rapport sur une visite), I : 97, par E. De Wildeman.
Introduction à l'étude du genre Rosa, XIV : 241, par G. A. Boulenger.
Jardin botanique pour les écoles moyennes (un), I : 1, par J. Massart.
Jeunes feuilles se protègent contre les intempéries (comment les), I : 181, par J. Massart.
Juncus Kochii, Euphrasia montana et Galeopsis bifida en Belgique, XXIV : 229, fig. 21, par A. Lawalrée.
Juniperus procera Hochst. au Congo belge (sur l'existence du), XVIII : 125, 1 fig., par W. Robyns.

Kalanchoë du Congo belge (sur quelques espèces du genre), XIX : 437, fig. 40, par Raymond-Hamet.
Kalanchoë du Mozambique (une nouvelle espèce de), XIV : 363, fig. 26 et pl. IX, par L. Croizat.
Kalanchoë rhombopilosa Mannoni et Boiteau (sur le), XXIV : 329, fig. 23-24, par Raymond-Hamet.

Labiatae-Ocimoideae de l'Afrique tropicale centrale (un nouveau genre de), XVII : 27, 1 pl., par W. Robyns.
l'Accommodation individuelle chez Polygonum amphibium, I : 73, par J. Massart.
Lactaires d'Afrique intertropicale (Congo belge et Afrique noire française) (les), XXV : 1, fig. 1-37, par R. Heim.

Lactuca from tropical Africa (two new species of), XIV : 223, fig. 19, par G. L. Stebbins.

Lauracées du Congo belge et de l'Afrique tropicale (contribution à l'étude des), XIX : 457, par W. Robyns et R. Wilczek.

Le concept des phytogénoses biotiques principalement dans les régions intertropicales, XVI : 413, par W. Robyns.

Le genre Andreaea en Afrique centrale et orientale, XVII : 33, fig. 6-12, par F. Demaret.

Le genre Dicranum Hedw. en Belgique, XIX : 91, fig. 7-17, par R. Wilczek.

Le genre Leptolejeunea (Spruce) Schiffn. en Afrique continentale, XXIII : 65, fig. 6-8, par C. Vanden Berghen.

Le genre Marchantia L. au Congo belge, XXIV : 37, fig. 3-7, par C. Vanden Berghen.

Le genre Protea L. en Afrique tropicale, XVII : 165, par L. Hauman.

Le genre Rumex sous-genre Acetosella en Belgique, XXII : 79, fig. 7, par A. Lawalrée.

Le genre Stictolejeunea (Spruce) Schiffn. en Afrique, XX : 15, fig. 5, par C. Vanden Berghen.

Le groupe du Valeriana officinalis L. en Belgique, XXII : 193, par A. Lawalrée.

Légumineuses de la flore africaine (observations sur des), VII : 219, par E. De Wildeman.

Légumineuses, principalement du Congo belge. I. Les Cassia africains de la section Chamaecrista Benth. (contribution à l'étude des), IX : 139, pl. I et II, par L. Ghesquière.

Léjeunéacées de l'Afrique continentale (notes sur quelques), XXII : 165, fig. 17-19, par C. Vanden Berghen.

Lepidibotrys Engl., type d'une famille nouvelle de Spermatophytes; les Lepidobotryaceae, XX : 31, fig 6, par J. Léonard.

Leptolejeunea (Spruce) Schiffn. en Afrique continentale (le genre), XXIII : 65, fig. 6-8, par C. Vanden Berghen.

Le Rosa blanda Ait. comparé au Rosa cinnamomea L., XIV : 289, par G. A. Boulenger.

Les Composées-Cynarocéphales de Belgique, XXIV : 241, par J. Arènes.

Les genres Hoffmanniella Schlecht., Eleutheranthera Poit. et Exomiocarpon Lawalrée gen. nov., XVII : 55, fig. 13-14, par A. Lawalrée.

Les Guttifères de la flore du Congo belge, XIII : 61, pl. 1 et 1 fig., par P. Staner.

Les Lactaires d'Afrique intertropicale (Congo belge et Afrique noire française), XXV : 1, pl. I-VI, fig. 1-37, par R. Heim.

Les Méliacées du Congo belge, XVI : 109, fig. 1-13, pl. I-XIII, par P. Staner.

Les Mousses des chutes de la Tshopo (Congo belge), XX : 41, par F. Demaret.

Les Muscinées de l'Herbier belge du Jardin Botanique de l'État à Bruxelles, IV : 243, par H. Van den Broeck.

Les Muscinées du littoral belge. — Compte rendu d'une herborisation faite, les 1er et 2 novembre 1904, à Westende et à Coxyde, I : 387, par J. Massart.

Les Mussaenda L. (Rubiaceae) du Congo belge, XXV : 149, par E. Petit.

Les organes glanduleux de Polypodium virginianum (P. vulgare var. virginianum), XVII : 1, fig. 1-2, par P. Martens.

Les Rubus africains de l'Herbier du Jardin Botanique de l'État à Bruxelles, XIII : 267, pl. II, par C. E. Gustafsson.

Les Thyméléacées de la flore du Congo belge, XIII : 321, 14 fig., par P. Staner.

Lichens à « Podétions » (remarques sur la systématique des), XVII : 149, fig. 17, par P. Duvigneaud.

Liste des plantes, boutures et graines offertes en échange par les services de cultures du Jardin Botanique de l'État à Bruxelles, III : 281, Anonyme.

Lopholejeunea (Spruce) Schiffn. (contribution à l'étude des espèces africaines du genre), XX : 161, fig. 16-20, par C. Vanden Berghen.

Lotus L. (Papilionaceae) (espèces nouvelles du genre), XXIII : 233, par R. Boutique.

Marchal Elie, IX : 1, avec portrait, par E. De Wildeman.

Marchantia L. au Congo belge (le genre), XXIV : 37, fig. 3-7, par C. Vanden Berghen.

Mastigolejeunea (Spr.) Schiffn. (contribution à l'étude des espèces africaines du genre), XIX : 371, fig. 31-33, par C. Vanden Berghen.

Matériaux pour une flore de Belgique. — V. Genre Senecio, XIV : 57, pl. I, par R. Mosseray.

Matériaux pour une flore de Belgique. — VI. Genres Bidens et Galinsoga, XIV : 313, fig. 24-25, par R. Mosseray.

Méliacées du Congo belge (les), XVI : 109, fig. 1-13, pl. I-XIII, par P. Staner.

Meliola Fr. (notes sur le genre), VII : 89, par M. Beeli.

Ménispermacées africaines — I (contribution à l'étude des), XIX : 409, pl. XVIII-XIX, par G. Troupin.

Ménispermacées africaines III (contribution à l'étude des), XXV : 131, par G. Troupin.

Metzgeria (contribution à l'étude des espèces africaines du genre), XIX : 187, fig. 18-20, par C. Vanden Berghen.

Mimosacées et Caesalpiniacées (groupes nouveaux), XXII : 177, par G. Gilbert et R. Boutique.

Mnium hornum Hedw. (une capsule double chez), XX : 325, fig. 31, par F. Demaret.

Monocotylées nouvelles ou critiques de la région du Parc National Albert (Congo belge), XXV : 239, fig. 46, par W. Robyns et R. Tournay.

Monographie des Alchemilla d'Afrique (documents pour une), VI : 207, par E. De Wildeman.

Monographie des Alchemilla d'Afrique. II. Sur des Alchemilla de Madagascar (documents pour une), VII : 317, par E. De Wildeman.

Monographie des Alchemilla d'Afrique. III. Les Alchemilla du groupe « Pedatae » Engler (documents pour une), VII : 339, par E. De Wildeman.

Monographie des Alchemilla d'Afrique. IV. Notes sur des Alchemilla du groupe « Subochreatae » Engler (documents pour une), VII : 359, par E. De Wildeman.

Monographie des Alchemilla d'Afrique. V. Sur quelques espèces du groupe « Latilobae » Engler (documents pour une), VII : 378, par E. De Wildeman.

Monographie du genre Arctium L., XX : 67, pl. III-VII, fig. 11-15, par J. Arènes.

Monographie du genre Hesperhodos Cocker., XIV: 227, fig. 20-21, par G. A. Boulenger.

Monographie du genre Tinnea (essai de), VIII : 161, par W. Robyns et J. Lebrun.

Monographie du genre Vangueria Juss. (documents pour une), VIII : 39, par E. De Wildeman.

Moracées nouvelles du Congo belge (trois), XIX : 59, par L. Hauman.
Mosseray Raoul 1908-1940, XVI : 1, avec portrait, par W. Robyns.
Mousses de Belgique (prodrome des), XVII : 317, par F. Demaret.
Mousses des chutes de la Tshopo (Congo belge) (les), XX : 41, par F. Demaret.
Mousses rares de Pologne (note sur quelques), XVIII : 83, par R. Wilczek.
Muscinées africaines des hautes altitudes (une collection de), XXIV : 451, fig. 36, par F. Demaret.
Muscinées de l'Herbier belge du Jardin botanique de l'État à Bruxelles (les), IV : 243, par H. Van den Broeck.
Muscinées du littoral belge (les). — Compte rendu d'une herborisation faite, les 1er et 2 novembre 1904, à Westende et Coxyde, I : 387, par J. Massart.
Mussaenda L. (Rubiaceae) du Congo belge les), XXV : 149, par E. Petit.
« Mussaenda stenocarpa » Hiern (Rubiaceae) (à propos de), XXIV : 339, pl. VI, par E. Petit.

Neostachyanthus occidentalis Keay et Miège. Nouvelle espèce d'Icacinacée d'Afrique occidentale, XXV : 271, fig. 47-51, par R. W. J. Keay et J. Miège.
Neue und seltene Acanthaceen aus dem Oestlichen belgischen Kongo, XIV : 353, par J. Mildbraed.
New species of Lactuca from tropical Africa (two), XIV : 223, fig. 19, par G. L. Stebbins.
New species of Otiophora from central Africa (a), XVIII : 103, par E. Milne-Redhead.
Notes mycologiques congolaises. — Champignons récoltés dans la région du Kivu par F. L. Hendrickx, Mycologue à l'I.N.É.A.C., XVI, 105, par M. Beeli.
Notes mycologiques. I. Contribution à la Flore mycologique du Congo, VIII : 1, par M. Beeli.
Notes mycologiques. II. Relevé des Ustilaginées du Congo, VIII : 12, par M. Beeli.
Notes mycologiques. IV. Contribution à la Flore mycologique du Congo, VIII : 245, par M. Beeli.
Notes on Desmodium and Droogmansia in the Belgian Congo, XXII : 287, fig. 33, par B. G. Schubert.

Note on some african Sterculiaceae (a), XXIV : 335, par A. J. G. H. Kostermans,

Notes on the Genus Dioscorea in the belgian Congo, XV : 345, par I. H. Burkill.

Note supplémentaire sur Oxygonum Burch. et sur les espèces congolaises de ce genre, XXIV : 1, par W. Robyns et E. Petit.

Note sur Antidesma Leptobotryum Müll.-Arg. (Euphorb.) au Congo belge, XVII: 129, fig. 15-16, par J. Léonard.

Note sur Callicostella heterophylla J. Angstr., XXIII : 1, fig. 1, par F. Demaret.

Note sur des Cassia africains et asiatiques de la section Chamaecrista avec description de nouvelles espèces, XX : 233, pl. VIII-X, fig. 23-26, par R. L. Steyaert.

Notes sur des espèces africaines du genre Dioscorea L., IV : 311, par E. De Wildeman.

Notes sur des formes congolaises du genre Crotalaria, VIII : 129, par E. Baker et E. De Wildeman.

Notes sur la Bibliothèque collective du Jardin Botanique de l'État, IX : 99, par P. Van Aerdschot.

Notice sur la serre des plantes grasses au Jardin Botanique de l'État, I : 355, par J. Massart.

Notes sur le genre Dichapetalum Thou. en Afrique centrale, XXV : 339, par L. Hauman.

Notes sur le genre Kaempferia L. au Congo belge (Zingiberaceae), (Plantae Africanae V.), XXV : 265, par G. Troupin.

Notes sur le genre Meliola Fr., VII : 89, par M. Beeli.

Note sur le genre Platostoma P. Beauv. (Labiatae-Ocimoideae), XVII : 15, fig. 3-5, par W. Robyns.

Note sur le genre Ptychocoleus Trev. en Afrique tropicale, XIX : 37, fig. 1-4, par C. Vanden Berghen.

Notes sur le genre Rinorea Aubl., VI : 131, par E. De Wildeman.

Note sur le Rosa stylosa des auteurs, XIV : 373, fig. 27, par G. A. Boulenger.

Notes sur les Boletineae africaines, XXIV : 113, fig. 5-7, par P. Heinemann.

Note sur les bois de Guibourtia Arnoldiana et de Copaifera religinosa du Mayumbe, XX : 19, pl. I et II, par D. Normand.

Note sur les bois d'Enantia (Annonacées), IX : 317, pl. IV, par D. Normand.

Note sur les Romulea du Congo belge, XV : 215, par A. Beguinot.

Notes sur le Strephonema Gilleti, VIII : 119, par E. De Wildeman.

Note sur les Ulmacées du Congo belge, XVI : 407, par L. Hauman.

Note sur le Xylia Ghesquierei Robyns, XVI : 253, fig. 14, pl. XIV, par W. Robyns.

Note sur les Oxygonum Burch. et sur les espèces congolaises de ce genre, XVII : 157, par W. Robyns.

Note sur quelques Aizoacées et sur un Chenopodium du Congo belge, XIX : 443, par L. Hauman.

Note sur quelques Ascomycètes nouveaux pour la flore belge, XV : 333, par G. Verplancke.

Note sur quelques Capparidaceae nouvelles du Congo belge, XX : 181, par R. Wilczek.

Notes sur quelques espèces africaines du genre Clerodendron, VII : 161, par E. De Wildeman.

Note sur quelques formes de Papaver dubium, XVIII : 293, par R. Mosseray.

Notes sur quelques Lejeunéacées de l'Afrique continentale, XXII : 165, fig. 17-19, par C. Vanden Berghen.

Note sur quelques Mousses rares de Pologne, XVIII : 83, par R. Wilczek.

Note sur quelques Ptéridophytes de Belgique, XIX : 237, par A. Lawalrée.

Note sur Sprucella succida (Mitt.) Steph. au Congo belge, XVIII : 89, 1 fig., par C. Vanden Berghen.

Notulae systematicae africanae I. Deux variétés nouvelles de Brachystegia spiciformis (Caesalpiniaceae, XXI : 361, fig. 101, par A. C. Hoyle.

Notulae systematicae II. A new species of Brachystegia from Southern Nigeria (Caesalpiniaceae), XXV : 183, fig. 44, par A. C. Hoyle.

Notulae systematicae XIII. Caesalpiniaceae africanae (Cynometra, Didelotia, Zingania, Cryptosepalum, Pynaertiodendron), XXII : 201, fig. 22-25, par J. Léonard.

Notulae systematicae IV, Caesalpiniaceae-Amherstieae africanae americanaeque, XIX : 383, fig. 34-39, par J. Léonard.

Notulae systematicae XVIII, Euphorbiaceae africanae novae, XXV : 281, pl. VII, par J. Léonard.

Notulae systematicae II (Ficus nouveaux du Congo belge), XIX : 215, fig. 22, par R. Boutique et J. Léonard.

Notulae systematicae X, Leguminosae-Caesalpinieae africanae novae, XXI : 127, fig. 32-36, par J. Léonard.

Notulae systematicae XI. Les Cynometra et les genres voisins en Afrique tropicale, XXI : 373, pl. VIII, fig. 102-116, par J. Léonard.

Notulae systematicae XVII. — Les genres Anthonotha P. Beauv. et Pellegriniodendron J. Léonard en Afrique tropicale (Caesalpiniaceae), XXV : 201, par J. Léonard.

Notulae systematicae XII. Les genres Macrolobium Schreb. et Gilbertiodendron J. Léonard au Congo belge (Caesalpiniaceae), XXII : 185, fig. 20-21, par J. Léonard.

Notulae systematicae XIV. Les genres Macrolobium Schreb. et Gilbertiodendron J. Léonard en Afrique tropicale (Caesalpiniaceae), XXIV : 57, par J. Léonard.

Notulae systematicae I (Moraceae, Opiliaceae, Olacaceae Octoknemaceaeque africanae, XVIII : 145, 1 fig., par J. Léonard.

Notulae systematicae IX. — Nouvelles observations sur le genre Guibourtia (Caesalpiniaceae), XX : 269, fig. 27-28, par J. Léonard.

Notulae systematicae XIX. Observations sur divers Bridelia africains (Euphorbiaceae), XXV : 359, par J. Léonard.

Notulae systematicae XV. Papilionaceae-Hedysareae africanae (Aeschynomene, Alysicarpus, Ormocarpum), XXIV : 63, fig. 10-14, par J. Léonard.

Notulae systematicae XVI. Paramacrolobium, genre nouveau de Caesalpiniaceae d'Afrique tropicale, XXIV : 347, par J. Léonard.

Notulae systematicae VIII. — Pittosporaceae et Caesalpiniaceae-Amherstieae congolanae novae, XX : 227, fig. 22, par J. Léonard.

Notulae systematicae V. — Thalictrum africains (Ranunculaceae), XIX : 449, fig. 41, par P. Staner et J. Léonard.

Notulae systematicae III (Une espèce nouvelle de Dorstenia du Congo belge, XIX : 227, fig. 23, par J. Léonard.

Notulae systematicae VI. Un genre nouveau de Marantaceae du Congo belge : Haumania, XIX : 453, par J. Léonard.

Notulae systematicae VII. Un Pittosporum nouveau d'Afrique équatoriale, XX : 47, fig. 7, par J. Léonard.

Nouveau Brachiaria de l'Est du Congo belge (un), XXIII : 273, fig. 36-37, par R. Germain et C. Evrard.

Nouveau champignon hypogé du Congo belge (un), VIII : 23, par O. Mattirolo.

Nouveau genre de Labiatae-Ocimoideae de l'Afrique tropicale Centrale (un), XVII : 27, pl. I, par W. Robyns.
Nouveaux Drosera du Congo belge, XVII : 307, par A. Taton.
Nouvelle espèce du genre Abrus L. (Papilionaceae-Vicieae) d'Afrique tropicale (une), XXV : 127, par R. Boutique.
Nouvelle espèce de Kalanchoë du Mozambique (une), XIV : 363, fig. 26 et pl. IX, par L. Croizat.
Novelties in Bidens and Coreopsis from Belgian Congo and central Africa, XIII : 285, par E. E. Sherff.
Novitates Africanae I (Malpighiaceae et Linaceae, XXV : 303, pl. VIII, par R. Wilczek.

Observations critiques sur quelques Composées du Congo belge, XIV : 99, pl. IV-V, par H. Humbert et P. Staner.
Observations sur des Légumineuses de la flore africaine, VII : 219, par E. De Wildeman.
Observations sur le genre Okoubaka Pellegr. et Normand (Octoknemaceae), XX : 11, fig. 4, par J. Léonard et G. Troupin.
Observations taxonomiques et xylologiques sur le genre Pinacopodium Exell et Mendonça, XXI : 451, fig. 117, pl. IX-X, par D. Normand et A. Cavaco.
Okoubaka Pellegr. et Normand (Octoknemaceae) (observations sur le genre), XX : 11, fig. 4, par J. Léonard et G. Troupin.
Oligotrichum africanum P. de la V. sp. nov., XXIV : 235, fig. 22, par R. Potier de la Varde.
Ophioglossum Louisii Taton sp. nov. — Épiphyte remarquable de la forêt équatoriale congolaise, XVII : 117, pl. II, par A. Taton.
Organes glanduleux de Polypodium virginianum (P. vulgare var. virginianum (les), XVII : 1, fig. 1-2, par P. Martens.
Organismes inférieurs (recherches sur les). VI. Considérations théoriques sur l'origine polyphylétique des modes d'alimentation, de la sexualité et de la mortalité chez les organismes inférieurs, I : 325, par J. Massart.
Orthodontium lineare Schwaegr. en Belgique, XXIV : 239, par F. Demaret.
Otiophora from central Africa (a new species), XVIII : 103, par E. Milne-Redhead.
Oxygonum Burch. et sur les espèces congolaises de ce genre (note sur), XVII : 157, par W. Robyns.
Oxygonum Burch. et sur les espèces congolaises de ce genre (note supplémentaire sur), XXIV : 1, par W. Robyns et E. Petit.

Papaver dubium (note sur quelques formes de), XVIII : 293, par R. Mosseray.

Papilionaceae from the Belgian Congo (new species and varieties of), XXII : 215, par A. Cronquist.

Papilionaceae-Dalbergieae du Congo belge (quelques), XXIV : 223, par L. Hauman.

Papilionaceae Genisteae congolanae novae (Robynsiophyton, Crotalaria, Argyrolobium), XXIII : 125, pl. I-VI, fig. 23-25, par R. Wilczek.

Papilionaceae-Phaseoleae du Congo belge et du Ruanda-Urundi (contribution à l'étude des), XXV : 93, par L. Hauman.

Papilionacées nouvelles du Congo belge, XXIII : 279, par L. Toussaint.

Parc National Albert (Congo belge) (Sympétales nouvelles de la région du), XVII : 65, par W. Robyns.

Parkia R. Br. (Leguminosae-Mimosaceae) (a new species of), XXV : 209, par R. W. J. Keay.

Pavetta. Description de quatre espèces nouvelles du Congo belge (contribution à l'étude du genre), XIV : 305, par C. E. B. Bremekamp.

Pentanisia Harvey (a revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae I. — The genus), XXII : 233, fig. 27-32, par B. Verdcourt.

Pestalotia de la Flore belge (quelques), XIX : 65, pl. I-II, par R. L. Steyaert.

Pestalotia De Not. et Monochaetia Sacc. (Truncatella gen. nov. et Pestalotiopsis gen. nov.) (contribution à l'étude monographique de), XIX : 285, pl. VII-XVII, fig. 24-28, par R. L. Steyaert.

Pestalotia du Congo belge (contribution à l'étude des), XIX : 173, pl. III-VI, par R. L. Steyaert.

Phaseoleae-Galactieae du Congo belge (révision des), XVIII : 67, 2 fig., par W. Robyns et R. Boutique.

Phaseoleae-Phaseolinae du Congo belge et du Ruanda-Urundi (groupes nouveaux des), XXIV : 405, pl. XII-XIII, fig. 35, par R. Wilczek.

Phytocénoses biotiques principalement dans les régions intertropicales (le concept des), XVI : 413, par W. Robyns.

Pilea nouveaux du Congo belge (deux), XVII : 177, par L. Hauman.

Pinacopodium Exell et Mendonça (observations taxonomiques et xylologiques sur le genre), XXI : 451, pl. IX-X, fig. 117, par D. Normand et A. Cavaco.

Piperaceae du Congo belge (révision des), XVI : 367, pl. XVI, par S. Balle.

Plantae africanae III. Aponogetonaceae (nouvelle famille pour le Congo belge), XXIII : 223, par G. Troupin.

Plantae Africanae II. (Connaraceae), XXI : 365, par G. Troupin.

Plantae Africanae IV. Monocotyledoneae, XXV : 221, fig. 45, par G. Troupin.

Plantae Africanae I. (Myristicaceae-Connaraceae), XX : 141, fig. 37-38, par G. Troupin.

Plantae Africanae. V. Notes sur le genre Kaempferia L. au Congo belge (Zingiberaceae), XXV : 265, par G. Troupin.

Plantes, boutures et graines offertes en échange par les services de cultures du Jardin Botanique de l'État à Bruxelles (liste des), III : 281, Anonyme.

Plantes vivaces maintiennent leur niveau souterrain (comment les), I : 113, par J. Massart.

Plantes vivaces sortent de terre au printemps (comment les), I : 143, par J. Massart.

Platostoma P. Beauv. (Labiatae-Ocimoideae) (note sur le genre), XVII : 15, fig. 3-5, par W. Robyns.

Podostémonacées nouvelles du Congo belge (deux), XVII : 179, par L. Hauman.

Pollination sans fécondation (sur la), I : 89, par J. Massart.

Polygala nouveaux du Congo belge (quelques), XIX : 205, par G. Troupin.

Polygalaceae nouvelles du Congo belge, XXV : 333, par E. Petit.

Polygonum amphibium (l'accommodation individuelle chez), I : 73, par J. Massart.

Polygonum convolvulus × dumetorum (deux hybrides), XXII : 211, fig. 26, par A. Lawalrée.

Polypodium virginianum (P. vulgare var. virginianum) (les organes glanduleux de), XVII : 1, fig. 1-2, par P. Martens.

Preliminary ecological survey of the Island of Hawaii, XV : 241, 34 fig., par W. Robyns et S. H. Lamb.

Prix François Crépin (le), IX : 90, par E. Marchal.

Prodrome des Bryophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi I. Musci, XVI : 21, par F. Demaret.

Prodrome des Bryophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi. II. Hepaticae, XVI : 287, par F. Demaret.
Prodrome des Bryophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi (I. Musci, Supplément 1), XVIII : 7, par F. Demaret.
Prodrome des Mousses de Belgique, XVII : 317, par F. Demaret.
Protea de l'Afrique tropicale (sur quelques), XIX : 51, par L. Hauman.
Protea L. en Afrique tropicale (le genre), XVII : 165, par L. Hauman.
Pseudomussaenda Wernham au Congo belge, XXIII : 227, par G. Troupin et E. Petit.
Pteridophyta flora of the Sudan (geographical relationships of the), XXV : 213, par K. N. G. Mac Leay.
Ptéridophytes de Belgique (note sur quelques), XIX : 237, par A. Lawalrée.
Ptéridophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi (les), XIX : 251, par F. Demaret.
Ptéridophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi, II (les), XX : 51, par F. Demaret.
Ptychocoleus Trev. en Afrique tropicale (note sur le genre), XIX : 37, fig. 1-4, par C. Vanden Berghen.

Quelques Amaranthacées nouvelles ou mal connues de l'Afrique équatoriale (sur), XVIII : 105, par L. Hauman.
Quelques espèces du genre Kalanchoë du Congo belge (sur), XIX : 437, fig. 40, par Raymond-Hamet.
Quelques impressions sur Crépin, IX : 83, par H. Christ.
Quelques Pestalotia de la Flore belge, XIX : 65, pl. I-II, par R. L. Steyaert.
Quelques Polygala nouveaux du Congo belge, XIX : 205, par G. Troupin.
Quelques Protea de l'Afrique tropicale (sur), XIX : 51, par L. Hauman.

Rapport sur une visite aux instituts botaniques et coloniaux de Berlin, Dresde et Paris en 1902, I : 97, par E. De Wildeman.
Recherches sur les organismes inférieurs. VI. Considérations théoriques sur l'origine polyphylétique des modes d'alimentation, de la sexualité et de la mortalité chez les organismes inférieurs, I : 325, par J. Massart.

Récoltes bryologiques au Congo belge et au Ruanda-Urundi, XVIII : 155, 15 fig., par V. Leroy.

Régions intertropicales (le concept des Phytocénoses biotiques principalement dans les), XVI : 413, par W. Robyns.

Remarques sur les espèces africaines du genre Grumilea Gaertn., IX : 21, 4 fig., par E. De Wildeman.

Remarques sur la systématique des Lichens à « Podétions », XVII : 149, fig. 17, par P. Duvigneaud.

Rénonculacées du Congo belge (révision des), XV : 307, 1 pl., par P. Staner.

Répartition du genre Batrachospermum en Belgique (sur la), XV : 319, 1 fig. et 1 pl., par L. I. J. Van Meel.

Répartition du genre Batrachospermum en Belgique II (sur la), XVII : 49, par L. I. J. Van Meel.

Révision de quelques espèces africaines du genre Frullania, XVIII : 231, 3 fig., par F. Demaret et C. Vanden Berghen.

Révision des Araliacées du Congo belge, XIII : 11, par J. Lebrun.

Révision des espèces africaines du genre Frullania Raddi sous-genre Meteoriopsis Spruce, XX : 1, fig. 1-3, par F. Demaret et C. Vanden Berghen.

Révision des espèces belges de Sphagnum Dill. sous-section Cymbifolia Lindb., XVI : 267, fig. 15-21, par F. Demaret.

Révision des espèces congolaises du genre Acalypha L., XV : 132, 1 fig., par P. Staner.

Révision des espèces congolaises du genre Alectra Thunb. (Scrophulariaceae), XIX : 271, par G. Troupin.

Révision des espèces congolaises des genres Cycnium et Rhamphicarpa (Scrophulariacées), XV : 147, par P. Staner.

Révision des espèces congolaises du genre Cynometra L., IX : 281, par J. Lebrun.

Révision des espèces congolaises du genre Erythrina L., XIII : 295, pl. III et 4 fig., par J. Louis.

Révision des espèces congolaises du genre Strophanthus P. DC., XIII : 23, par P. Staner et D. Michotte.

Révision des espèces congolaises du genre Tetracera L., XV : 295, par P. Staner.

Révision des espèces congolaises du genre Thesium L., XVII : 135, par W. Robyns et A. Lawalrée.

Révision des genres Blighia Koenig et Phialodiscus Radlk., XXI : 149, fig. 39-41, par R. Wilczek.

Révision des Phaseoleae-Galactieae du Congo belge, XVIII : 67, 2 fig., par W. Robyns et R. Boutique.

Révision des Piperaceae du Congo belge, XVI : 367, pl. XVI, par S. Balle.

Révision des Renonculacées du Congo belge, XV : 307, 1 pl., par P. Staner.

Révision des Rhamnacées du Congo belge, XV : 393, fig. 45-60, par P. Staner.

Révision des Roses d'Asie de la section des Eglanteriae, groupes des Pimpinelli-Suavifoliae, Orientales et Alpinae-Vestitae, XIII : 165, 4 fig., par G. A. Boulenger.

Révision des Roses d'Asie, sections des Eglanteriae (suite et fin), Chinenses, Bracteatae, Banksianae et Microphyllae, XIV : 115, fig. 14-18, par G. A. Boulenger.

Révision des Roses d'Asie de la Section des Synstylae, IX : 203, par G. A. Boulenger.

Révision des Roses d'Asie, section des Synstylae (supplément à la), XIV : 274, par G. A. Boulenger.

Révision du genre Arisaema Mart. (Araceae) en Afrique tropicale (essai de), XXV : 395, par W. Robyns et R. Tournay.

Révision du genre Enantia Oliv. (Annonacées), IX : 303, par W. Robyns et J. Ghesquière.

Revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae (a). I. — The genus Pentanisia Harvey, XXII : 233, fig. 27-32, par B. Verdcourt.

Revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae (a). II. — The genus Otomeria Benth. and the new genus Batopedina Verdcourt, XXIII : 5, fig. 2, par B. Verdcourt.

Revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae (a). III. — The genus Virectaria Brem., XXIII : 35, fig. 4-5, par B. Verdcourt.

Revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae (a). IV. — Notes on the genera Parapentas Brem., Tapinopentas Brem., and Otiophora Zucc., XXIII : 53, par B. Verdcourt.

Revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae (a). V. — A revision of the genus Pentas Bentham together with a key to related genera, XXIII : 237, fig. 26-35, par B. Verdcourt.

Révision of the Lauraceae, IV (the African Lauraceae I), XV : 73, pl. V-IX, par A. J. Kostermans.

Rhamnacées du Congo belge (révision des), XV : 393, fig. 45-60, par P. Staner.

Rhynchostegiella Teesdalei Limpr. en Belgique, XV : 425, par F. Demaret.

Rinorea Aubl. (notes sur le genre), VI : 131, par E. De Wildeman.

Romulea du Congo belge (notes sur les), XV : 215, par A. Beguinot.

Rosa blanda Ait. comparé au Rosa cinnamomea L. (le), XIV : 289, par G. A. Boulenger.

Rosa gymnocarpa Nutt. (étude du), XIV : 279, fig. 22-23, par G. A. Boulenger.

Rosa (introduction à l'étude du genre), XIV : 241, par G. A. Boulenger.

Rosa stylosa des auteurs (note sur le), XIV : 373, fig. 27, par G. A. Boulenger.

Rosacées d'Afrique tropicale (sur quelques), XXII : 87, fig. 8, par L. Hauman.

Roses d'Asie, sections des Eglanteriae (suite et fin), Chinenses, Bracteatae, Banksianae et Microphyllae (révision des), XIV : 115, fig. 14-18, par G. A. Boulenger.

Roses d'Asie de la section des Synstylae (révision des), IX : 203, par G. A. Boulenger.

Roses d'Asie, section des Synstylae (supplément à la révision des), XIV : 274, par G. A. Boulenger.

Roses d'Europe de l'Herbier Crépin, vol. I (les), X : 1, par G. A. Boulenger.

Roses d'Europe de l'Herbier Crépin, vol. II (les), XII : 1, par G. A. Boulenger.

Rubiacées nouvelles pour le Congo belge, XXII : 97, par C. E. B Bremekamp.

Rubus africains de l'Herbier du Jardin Botanique de l'État à Bruxelles (les), XIII : 267, pl. II, par C. E. Gustafsson.

Rumex sous-genre Acetosella en Belgique (le genre), XXII : 79, fig. 7, par A. Lawalrée.

Scandent species of Prenanthes and Lactuca in Africa (the), XIV : 333, pl. VI-VIII, par G. L. Stebbins.

Schizachyrium au Congo belge (une nouvelle espèce de), XXII : 139, fig. 10, par R. Germain.

Seconde contribution à la Flore algologique du Congo belge d'après les récoltes du R. P. H. Vandèryst, IX : 322, 32 fig., par P. Frémy.

Sedum Churchillianum. Espèce nouvelle du Parc National Albert (Congo belge), XVII : 313, fig. 25, par W. Robyns et R. Boutique.

Serre des plantes grasses au Jardin Botanique de l'État (notice sur la), I : 355, par J. Massart.

Sertulum Fungorum Congoensium, IX : 95, 1 fig., par O. Mattirolo.

Sida nouveaux du Congo belge (Malvaceae) (description de), XXII : 105, par R. L. Steyaert.

Species and a new combination in tropical african Compositae (a new), XXII : 309, par A. Cronquist.

Species and varieties of Papilionaceae from the Belgian Congo (new), XXII : 215, par A. Cronquist.

Species of Parkia R. Br. (Leguminosae-Mimosaceae) (a new), XXV : 209, par R. W. J. Keay.

Species of Vangueriopsis Robyns from Liberia (a new), XXII : 319, par W. Robyns.

Spécimen-type de Gossypium obtusifolium Roxb. (au sujet du), XVII : 245, fig. 19, pl. III, par W. Wouters.

Spermatophytes de la plaine de la Ruzizi (Congo belge) (groupes nouveaux de), XXII : 71, par R. Germain.

Spermatophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi (statistiques de nos connaissances sur les), XVIII : 133, par W. Robyns.

Sphagnum Dill. sous-section Cymbifolia Lindb. (révision des espèces belges de), XVI : 267, par F. Demaret.

Sprucella succida (Mitt.) Steph. au Congo belge (note sur), XVIII : 89, 1 fig., par C. Vanden Berghen.

Statistiques de nos connaissances sur les Spermatophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi, XVIII : 133, par W. Robyns.

Stellaria nemorum L. subsp. glochidosperma Murb. en Belgique, XXIII : 77, par A. Lawalrée.

Sterculiaceae (a note on some African), XXIV : 335, par A. J. G. H. Kostermans.

Stictolejeunea (Spruce) Schiffn. en Afrique (le genre), XX : 15, fig. 5, par C. Vanden Berghen.

Strephonema Gilleti (notes sur le), VIII : 119, par E. De Wildeman.

Strophanthus P. DC. (révision des espèces congolaises du genre), XIII : 23, par P. Staner et D. Michotte.

Supplément à la révision des Roses d'Asie, section des Synstylae, XIV : 274, par G. A. Boulenger.
Sur la pollination sans fécondation, I : 89, par J. Massart.
Sur la répartition du genre Batrachospermum en Belgique II, XVII : 49, par L. I. J. Van Meel.
Sur l'existence du Juniperus procera Hochst. au Congo belge, XVIII : 125, 1 fig., par W. Robyns.
Sur l'existence du Quercus pedunculata Ehrh. dans les alluvions de la Nèthe, XIII : 57, par R. Mosseray.
Sur l'identité de l'Ichnanthus Dewildemani Vanderyst (Gramineae), XXIV : 399, fig. 33-34, par P. Van der Veken.
Sur quelques Capparidaceae d'Afrique tropicale, XX : 191, fig. 21, par L. Hauman.
Sur quelques Indigofera du Congo, VIII : 143, par E. Baker et E. De Wildeman.
Sur un Rosier cultivé nommé Rosa Rouletii Correvon, XIV : 367, par G. A. Boulenger.
Sylloge Florae Congolanae, II, 1, par Th. et H. Durand.
Sympétales nouvelles de la région du Parc National Albert (Congo belge), XVII : 65, par W. Robyns.
Systématique des Lichens à « Podétions » (remarques sur la), XVII : 149, fig. 17, par P. Duvigneaud.
Systématique et écologique des Centaurium de Belgique (essai d'étude), XXIV : 349, pl. VIII-XI, fig. 25-32, par A. Robyns.
Syrrhopodon et Thyridium et révision des espèces congolaises (contribution à l'étude des genres), XVIII : 207, 9 fig., par F. Demaret et V. Leroy.

Tableau synoptique des espèces africaines (les Alchemilla de l'Abyssynie et de Madagascar, avec un), XIV : 1, fig. 1-13, par L. Hauman et S. Balle.
Taxa nouveaux de Cypéracées du Congo belge (trois), XXV : 143, fig. 38-39, par P. Van der Veken.
Tentamen monographiae Vangueriae generumque affinium, XI : 1, 36 fig., par W. Robyns.
Termitomyces du Congo belge recueillis par M^me^ Goossens-Fontana (les), XXI : 205, pl. V et VI, fig. 44-47, par R. Heim.
Tetracera L. (révision des espèces congolaises du genre), XV : 295, par P. Staner.
Theaceae. Famille nouvelle pour la Flore du Congo belge, XX : 61, fig. 8-10, par R. Boutique et G. Troupin.

The african Lauraceae I (revision of the Lauraceae, IV), XV : 73, pl. V-IX, par A. J. Kostermans.
The Elms of the Dumortier Herbarium, XXI : 347, par R. Melville.
The scandent species of Prenanthes and Lactuca in Africa, XIV : 333, pl. VI-VIII, par G. L. Stebbins.
Thesium L. (révision des espèces congolaises du genre), XVII : 135, par W. Robyns et A. Lawalrée.
Thesium nouveaux du Congo belge (trois), XX : 157, par W. Robyns et A. Lawalrée.
Thyméléacées de la flore du Congo belge (les), XIII : 321, 14 fig., par P. Staner.
Tinnea (essai d'une monographie du genre), VIII : 161, par W. Robyns et J. Lebrun.
Trois Moracées nouvelles du Congo belge, XIX : 59, par L. Hauman.
Tropical Africa (two new species of Lactuca from), XIV : 223, fig. 19, par G. L. Stebbins.

Uebersicht ueber die aus dem Belgischen Kongo stammenden Arten der Gattung Ceropegia, XV : 222, par E. Werdermann.
Ulmacées du Congo belge (note sur les), XVI : 407, par L. Hauman.
Ulmus hollandica Mill. en Belgique, XXII : 65, fig. 6, par A. Lawalrée.
Un Coffea nouveau du Congo belge, XXV : 405, fig. 57, par R. Germain et W. Kesler.
Un Ficus nouveau pour le Congo belge, XIX : 213, par J. Lebrun et R. Boutique.
Un genre nouveau de Gesnériacées du Congo belge, XIII : 7, par P. Staner.
Un Jardin botanique pour les écoles moyennes, I : 1, par J. Massart.
Un nouveau champignon hypogé du Congo belge, VIII : 23, par O. Mattirolo.
Un nouveau genre de Labiatae-Ocimoideae de l'Afrique tropicale centrale, XVII : 27, pl. I, par W. Robyns.
Une collection de Muscinées africaines des hautes altitudes, XXIV : 451, fig. 36, par F. Demaret.
Une espèce nouvelle d'Anacolosa au Congo belge, XVIII : 255, 1 pl., par J. Louis et R. Boutique.
Une espèce nouvelle de Campylopus du Parc National Albert (Congo belge), XIX : 85, 6 fig., par F. Demaret et V. Leroy.

Une espèce nouvelle de Clitandra du Parc National Albert (Congo belge), XVIII : 259, par W. Robyns et R. Boutique.

Une espèce nouvelle de Ficus du Congo belge, XIX : 211, fig. 21, par R. Boutique.

Une espèce nouvelle de Hippocratea du Parc National Albert (Congo belge), XIX : 89, par W. Robyns et R. Tournay.

Une espèce nouvelle de Kaoue Pellegr. du Congo belge, XXI : 353, pl. VII, par R. Wilczek.

Une Flore du Congo belge et du Ruanda-Urundi, XIX : 231, par W. Robyns.

Une Flore Générale de Belgique, XXI : 1, par W. Robyns.

Une forme nouvelle de Brachythecium velutinum (Hedw.) Br. et Schpr. var. validum (C. Jens.) C. Jens., XVIII : 97, 1 pl., 1 fig., par F. Demaret.

Une nouvelle espèce de Schizachyrium au Congo belge, XXII : 139, fig. 10, par R. Germain.

Une nouvelle espèce du genre Abrus L. (Papilionaceae-Vicieae) d'Afrique tropicale, XXV : 127, par R. Boutique.

Une nouvelle espèce de Kalanchoë du Mozambique, XIV : 363, fig. 26 et pl. IX, par L. Croizat.

Valeriana officinalis L. en Belgique (le groupe du), XXII : 193, par A. Lawalrée.

Vangueria Juss. (documents pour une monographie du genre), VIII : 39, par E. De Wildeman.

Vangueriopsis Robyns from Liberia (a new species of), XXII : 319, fig. 34, par W. Robyns.

Vegetatieonderzoek van het Zwin in 1951-1952, XXIII : 81, fig. 10-22, par M. F. Mörzer Bruijns, A. Lawalrée, H. Schimmel en F. Demaret.

Végétation bryophytique pionnière des falaises de Yangambi au Congo belge (contribution à l'étude de la), XXIV : 107, fig. 1-4, par F. Demaret.

Vermoesen Fr. M. C., VIII : i-ix, par E. De Wildeman.

Veronica Anagallis-aquatica L. et Veronica catenata Pennell en Belgique, XXIII : 383, par A. Lawalrée.

Visite aux instituts botaniques et coloniaux de Berlin, Dresde et Paris en 1902 (rapport sur une), I : 97, par E. De Wildeman.

Xanthodactylon Duvign., genre nouveau de Lichens de l'Afrique du Sud, XVI : 259, pl. XV, par P. Duvigneaud.

Xylia Ghesquieri Robyns (note sur le), XVI : 253, pl. XIV, fig. 14, par W. Robyns.

Zingiberaceae (plantae Africanae V. Notes sur le genre Kaempferia L. au Congo belge), XXV : 265, par G. Troupin.

Zornia from tropical Africa (Leguminosae-Papilionaceae-Hedysareae) (a new), XXIV : 127, par E. Milne-Redhead.

Zwin in 1951-1952 (vegetatieonderzoek van het), XXIII : 81, par M. F. Mörzer Bruijns, A. Lawalrée, H. Schimmel en F. Demaret.

Table alphabétique des articles par matière
Alphabetische tafel van de artikels per onderwerp

I. — MORPHOLOGIE — ANATOMIE

Cavaco, (Normand, D. et), Observations taxonomiques et xylologiques sur le genre Pinacopodium Exell et Mendonça, XXI : 451, pl. IX-X, fig. 117.

Marlier-Spirlet, M.-L., Sur quelques épidermes de feuilles de Cinnamomum L., XVII : 266, pl. IV-XXI.

Martens, P., Les organes glanduleux de Polypodium virginianum (P. vulgare var. virginianum, XVII : 1, fig. 1-2.

Massart, J., L'accommodation individuelle chez Polygonum amphibium, I : 73.

— , Sur la pollination sans fécondation, I : 89.

— , Comment les plantes vivaces maintiennent leur niveau souterrain, I : 113.

— , Comment les plantes vivaces sortent de terre au printemps, I : 143.

— , Comment les jeunes feuilles se protègent contre les intempéries, I : 181.

Normand, D., Note sur les bois d'Enantia (Annonacées), IX : 317, pl. IV.

— , Note sur les bois de Guibourtia Arnoldiana et de Copaifera religiosa du Mayumbe, XX : 19, pl. I et II.

Normand, D. et Cavaco, A., Observations taxonomiques et xylologiques sur le genre Pinacopodium Exell et Mendonça, XXI : pl. IX-X, fig. 117.

II. — PHYSIOLOGIE

Massart, J., Comment les jeunes feuilles se protègent contre les intempéries, I : 181.

— , Comment les plantes vivaces maintiennent leur niveau souterrain, I : 113.

— , Comment les plantes vivaces sortent de terre au printemps, I : 143.

— , L'accommodation individuelle chez Polygonum amphibium, I : 73.

— , La collection phylogénique au Jardin Botanique de l'État, I : 403.

— , Recherches sur les organismes inférieurs. VI. Considérations théoriques sur l'origine polyphylétique des modes d'alimentation, de la sexualité et de la mortalité chez les organismes inférieurs, I : 325.

— , Sur la pollination sans fécondation, I : 89.

III. — SYSTÉMATIQUE — FLORISTIQUE SYSTEMATIEK — FLORISTIEK

A. — THALLOPHYTES — THALLOPHYTEN

Beeli, M., Contribution à l'étude de la Flore mycologique du Congo. — Fungi Goossensiani. — XII. Fungi Loosiani, XIV : 83, pl. II et III.

— , Énumération des champignons signalés au Congo, VIII : 67.

— , Étude de la Flore mycologique africaine. Note sur des Basidiomycètes récoltés à Sierra Leone par F. C. Deighton, XV : 25, pl. I-IV.

— , Notes sur le genre Meliola Fr., VII : 89.

— , Notes Mycologiques. I. Contribution à la Flore mycologique du Congo, VIII : 1.

— , Notes mycologiques. II. Relevé des Ustilaginées du Congo, VIII : 12.

— , Notes mycologiques. IV. Contribution à la Flore mycologique du Congo, VIII : 245.

— , Notes mycologiques congolaises. — Champignons récoltés dans la région du Kivu par F. L. Hendrickx, mycologue à l'I. N. É. A. C., XVI : 105.

Duvigneaud, P., Hendricxia Duvign., nouveau genre de Parméliacées des montagnes équatoriales, XVI : 355, fig. 23-24.
— , Remarques sur la systématique des Lichens à « Podétions », XVII : 149, fig. 17.
— , Xanthodactylon Duvign., genre nouveau de Lichens de l'Afrique du Sud, XVI : 259, pl. XV.

Frémy, P., Contribution à la Flore algologique du Congo belge d'après les récoltes du R. P. H. Vanderyst, IX : 109, 26 fig.
— , Seconde contribution à la Flore algologique du Congo belge d'après les récoltes du R. P. H. Vanderyst, IX : 322, 32 fig.

Heim, R., Les Lactaires d'Afrique intertropicale (Congo belge et Afrique noire française), XXV : 1, pl. I-VI, fig. 1-37.
— , Les Termitomyces du Congo belge recueillis par Mme M. Goossens-Fontana, XXI : 205, pl. V et VI, fig. 44-47.
Heinemann, P., Un Bolet de l'Ile de la Trinité, XXIV : 121, fig. 8.
— , Champignons récoltés au Congo belge par Mme M. Goossens-Fontana. I. Boletineae, XXI : 223, fig. 48-98.
— , Champignons récoltés au Congo belge par Mme M. Goossens-Fontana. I. Boletineae, Note complémentaire, XXIII : 73, fig. 9.
— , Champignons récoltés au Congo belge par Mme M. Goossens-Fontana. I. Boletineae. — Note complémentaire 2, XXV : 169.
— , Notes sur les Boletineae africaines, XXIV : 113, fig. 5-7.

Mattirolo, O., Un nouveau champignon hypogé du Congo belge, VIII : 23.
— , Sertulum Fungorum Congoensium, IX : 95, 1 fig.

Steyaert, R. L., Contribution à l'étude monographique de Pestalotia De Not. et Monochaetia Sacc. (Truncatella gen. nov. et Pestalotiopsis gen. nov.), XIX : 285, pl. VII-XVII, fig. 24-28.
— , Contribution à l'étude des Pestalotia du Congo belge, XIX : 173, pl. III-VI.
— , Quelques Pestalotia de la Flore belge, XIX : 65, pl. I-II.
— , Pestalotia, Pestalotiopsis et Truncatella, XXV : 191.

Van Meel, L., Sur la répartition du genre Batrachospermum en Belgique, XV : 319, 1 fig. et 1 pl.
— , Sur la répartition du genre Batrachospermum en Belgique, II, XVII : 49.

Verplancke, G., Note sur quelques Ascomycètes nouveaux pour la Flore belge, XV : 333.
— , Quelques Champignons nouveaux pour la Flore belge, XVI : 9.

B. — BRYOPHYTES — BRYOPHYTEN

Demaret, F., Additions à la Flore bryologique du Congo belge, XXIV : 51, fig. 8-9.
— , Bryum Brotherianum Demaret nom. nov., XIX : 355, fig. 29.
— , Catalogue bryologique de la Forêt de Soignes, XIV : 379.
— , Une collection de Muscinées africaines des hautes altitudes, XXIV : 451, fig. 36.
— , Complément à l'étude des espèces africaines du genre Cyclodictyon Mitt., XXII : 155, fig. 15-16.
— , Contribution à l'étude de la Flore et de la Végétation muscinales dans la région de Mariembourg, XV : 152, 1 fig.
— , Contribution à l'étude de la végétation bryophytique pionnière des falaises de Yangambi au Congo belge, XXIV : 107, fig. 1-4.
— , Coup d'œil sur les principaux groupements bryophytiques de quelques rochers calcaires en Belgique, XVII : 181, fig. 18.
— , Étude préliminaire des Hookeriaceae africaines intertropicales, XXV : 375.
— , Une forme nouvelle de Brachythecium velutinum (Hedw.) Br. et Schpr var. validum (C. Jens.) C. Jens., XVIII : 97, 1 pl., 1 fig.
— , Le genre Andreaea en Afrique centrale et orientale, XVII : 33, fig. 6-12.
— , Les Mousses des chutes de la Tshopo (Congo belge), XX : 41.
— , Note sur Callicostella heterophylla J. Angstr., XXIII : 1, fig. 1.
— , Orthodontium lineare Schwaegr. en Belgique, XXIV : 239.
— , Prodrome des Bryophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi. I. Musci, XVI : 21.
— , Prodrome des Bryophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi. I. Musci, Supplément I, XVIII : 7.
— , Prodrome des Bryophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi. II. Hepaticae, XVI, 287.
— , Prodrome des Mousses de Belgique, XVII : 317.

Demaret, F., Révision des espèces belges de Sphagnum Dill. sous-section Cymbifolia Lindb., XVI : 267, fig. 15-21.
— , Rhynchostegiella Teesdalei Limpr. en Belgique, XV : 425.
Demaret, F. et Leroy, V., Contribution à l'étude des genres Syrrhopodon et Thyridium et révision des espèces congolaises, XVIII : 209, 9 fig.
— , Une espèce nouvelle de Campylopus du Parc National Albert (Congo belge), XIX : 85, fig. 6.
Demaret, F. et Potier de la Varde, R., Deux Hookeriaceae nouvelles du Ruwenzori (Congo belge), XXV : 353, pl. IX-X.
— , Les espèces africaines du genre Callicostella (C. Müll.) Jaeg., XXII : 323, fig. 35-61.
— , Les espèces africaines du genre Cyclodictyon Mitt., XXI : 11, fig. 1-22.
Demaret, F. et Vanden Berghen, C., Frullania Arecae (Spreng.) Gottsche et F. Ecklonii (Spreng.) Gottsche et Lindenb., XIX : 73, fig. 5.
— , Frullania capensis Gottsche et les espèces confondues avec lui, XVIII : 117, 3 fig.
— , Révision de quelques espèces africaines du genre Frullania, XVIII : 231, 3 fig.
— , Révision des espèces africaines du genre Frullania Raddi, sous-genre Meteoriopsis Spruce, XX : 1, fig. 1-3.

Hauman, L., Les Bryophytes des hautes altitudes au Ruwenzori, XVI : 311, fig. 22.

Leroy, V. (Demaret, F. et), Contribution à l'étude des genres Syrrhopodon et Thyridium et révision des espèces congolaises, XVIII : 207, 9 fig.
— , Une espèce nouvelle de Campylopus du Parc National Albert (Congo belge), XIX : 85, fig. 6.
Leroy, V., Récoltes bryologiques au Congo belge et au Ruanda-Urundi, XVIII : 155, 15 fig.

Massart, J., Les Muscinées du littoral belge. — Compte rendu d'une herborisation faite, les 1er et 2 novembre 1904, à Westende et Coxyde, I : 387.

Potier de la Varde, R., Oligotrichum africanum P. de la V. sp. nov., XXIV : 235, fig. 22.
Potier de la Varde, (Demaret, F. et), Les espèces africaines du genre Callicostella (C. Müll.) Jaeg., XXII : 323, fig. 35-61.

Vanden Berghen, C., Contribution à l'étude des espèces africaines du genre Brachiolejeunea (Spruce) Schiffn., XXI : 87, fig. 30-31.
— , Contribution à l'étude des espèces africaines du genre Ceratolejeunea (Spruce) Schiffn., XXI : 61, fig. 23-28.
— , Contribution à l'étude des espèces africaines du genre Lopholejeunea (Spruce) Schiffn., XX : 161, fig. 16-20.
— , Contribution à l'étude des espèces africaines du genre Mastigolejeunea (Spr.) Schiffn., XIX : 371, fig. 31-33.
— , Contribution à l'étude des espèces africaines du genre Metzgeria, XIX : 187, fig. 18-20.
— , Le genre Leptolejeunea (Spruce) Schiffn. en Afrique continentale, XXIII : 65, fig. 6-8.
— , Le genre Marchantia L. au Congo belge, XXIV : 37, fig. 3-7.
— , Le genre Stictolejeunea (Spruce) Schiffn. en Afrique, XX : 15, fig. 5.
— , Note sur le genre Ptychocoleus Trev. en Afrique tropicale, XIX : 37, fig. 1-4.
— , Notes sur quelques Lejeunéacées de l'Afrique continentale, XXII : 165, fig. 17-19.
— , Note sur Sprucella succida (Mitt.) Steph. au Congo belge, XVIII : 89, 1 fig.
Vanden Berghen, C. (Demaret, F. et), Frullania Arecae (Spreng.) Gottsche et F. Ecklonii (Spreng.) Gottsche et Lindenb., XIX : 73, fig. 5.
van den Broeck, H., Les Muscinées de l'Herbier belge du Jardin Botanique de l'État à Bruxelles, IV : 243.

Wilczek, R., Le genre Dicranum Hedw. en Belgique, XIX : 91, fig. 7-17.
— , Note sur quelques Mousses rares de Pologne, XVIII : 83.

C. — PTÉRIDOPHYTES — PTERIDOPHYTEN

Demaret, F., Les Ptéridophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi. I., XIX : 251.
— , Les Ptéridophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi. II, XX : 51.

Lawalrée, A., Note sur quelques Ptéridophytes de Belgique, XIX : 237.

Martens, P., Les organes glanduleux de Polypodium virginianum (P. vulgare var. virginianum), XVII : 1, fig. 1-2.

Taton, A., Ophioglossum Louisii Taton, sp. nov. — Épiphyte remarquable de la forêt équatoriale congolaise, XVII : 117, pl. II.

D. — SPERMATOPHYTES — SPERMATOPHYTEN
(Afrique) (Afrika)

Babcock, E. B., Crepis species of western tropical Africa (Angola, Congo, Cameroons, Nigeria), XIV : 293.

Baker, E. et De Wildeman, E., Notes sur les formes congolaises du genre Crotalaria, VII : 129.

— , Sur quelques Indigofera du Congo, VIII : 143.

Balle, S., Les Loranthus du Congo belge. Note préliminaire à l'étude des Loranthoïdées d'Afrique, XVII : 225.

— , Révision des Piperaceae du Congo belge, XVI : 367, pl. XVI.

Balle, S. (Hauman, L. et), Les Alchemilla de l'Abyssinie et de Madagascar, avec un tableau synoptique des espèces africaines, XIV : fig. 1-13.

Bamps, P., Hyparrhenia nouveaux du Congo belge (Gramineae), XXV : 391.

Beguinot, A., Note sur les Romulea du Congo belge, XV : 215.

Boutique, R., Annonacées nouvelles de la Flore du Congo belge et du Ruanda-Urundi, XXI : 95, pl. I-IV.

— , Une espèce nouvelle de Ficus du Congo belge, XIX : 211, fig. 21.

— , Espèces nouvelles du genre Lotus L. (Papilionaceae), XXIII : 233.

— , Une nouvelle espèce du genre Abrus L. (Papilionaceae-Vicieae) d'Afrique tropicale, XXV : 127.

Boutique, R. et Léonard, J., Notulae Systematicae II. (Ficus nouveaux du Congo belge), XIX : 215, fig. 22.

Boutique, R. et Troupin, G., Theaceae. Famille nouvelle pour la Flore du Congo belge, XX : 61, fig. 8-10.

Boutique, R. (Gilbert, G. et), Groupes nouveaux de Mimosacées et de Caesalpiniacées, XXII : 177.

Boutique, R. (Lebrun, J. et), Un Ficus nouveau pour le Congo belge, XIX : 213.

Boutique, R. (Louis, J. et), Une espèce nouvelle d'Anacolosa au Congo belge, XVIII : 255, 1 pl.

Boutique, R. (Robyns, W. et), Une espèce nouvelle de Clitandra du Parc National Albert (Congo belge), XVIII : 259.

— , Révision des Phaseoleae-Galactieae du Congo belge, XVIII : 67, 2 fig.

— , Sedum Churchillianum. Espèce nouvelle du Parc National Albert (Congo belge), XVII : 313, fig. 25.

Bremekamp, C. E. B., Contribution à l'étude du genre Pavetta. Description de quatre espèces nouvelles du Congo belge, XIV : 305.

— , Rubiacées nouvelles pour le Congo belge, XXII : 97.

Brenan, J. P. M. and Jones, A. P. D., A new species of Cola from Tanganyika Territory, XVIII : 1, 1 pl.

Burkill, I. H., Notes on the Genus Dioscorea in the Belgian Congo, XV : 345.

Cavaco, A. (Normand, A. et), Observations taxonomiques et xylologiques sur le genre Pinacopodium Exell et Mendonça, XXI : 451, pl. IX-X, fig. 117.

Chermezon, H., Cypéracées nouvelles du Congo belge, XIII : 277.

— , Cypéracées nouvelles du Congo belge. II, XIV : 329.

Cogniaux, A., Cucurbitaceae novae Herbarii Bruxellensis, V : 109.

Croizat, L., Euphorbiacées africaines nouvelles ou peu connues : Elaeophorbia et Euphorbia Section Tekeanae, XV : 109.

— , Une nouvelle espèce de Kalanchoë du Mozambique, XIV : 363, fig. 26 et pl. IX.

Cronquist, A., A new species and a new combination in tropical african Compositae, XXII : 309.

— , New species and varieties of Papilionaceae from the Belgian Congo, XXII : 215.

Cufodontis, G., Enumeratio plantarum Aethiopiae, Spermatophyta, XXIII, supplément : i-xvi, 1, fig. 1; XXIV, supplément : 113, XXV : supplément : 193, 273.

De Wildeman, E., Additions à la Flore du Congo, IV : 1, ii, V : 117; iii, VI : 1, pl. I-35; IV : 1; VII : 1 et 271.

— , Un Argyrolobium nouveau pour le Congo, VIII : 127.

— , Un Astralagus nouveau de la région de Rutshuru (Ruchuru), VIII : 125.

De Wildeman, E., Contribution à l'étude des espèces africaines du genre Acioa Aubl., VII : 188.
— , Decades novarum specierum Florae Congolensis, III : 253.
— , Decades novarum specierum Florae Congolensis II, IV : 359.
— , Decades novarum specierum Florae Congolensis III, V : 1.
— , Deux Bananiers indigènes du Ruanda, VIII : 103.
— , Deux Carduus du Ruwenzori, VIII : 115.
— , Documents pour une monographie des Alchemilla d'Afrique, VI : 207.
— , Documents pour une monographie des Alchemilla d'Afrique. II. Sur les Alchemilla de Madagascar, VII : 317.
— , Documents pour une monographie des Alchemilla d'Afrique. III. Les Alchemilla du groupe « Pedatae » Engler, VII : 339.
— , Documents pour une monographie des Alchemilla d'Afrique. IV. Notes sur des Alchemilla du groupe « Subochreatae » Engler, VII : 359.
— , Documents pour une monographie des Alchemilla d'Afrique. V. Sur quelques espèces du groupe « Latilobae » Engler, VII : 378.
— , Documents pour une monographie des espèces africaines du genre Vangueria Juss., VIII : 39.
— , Notes sur des espèces africaines du genre Dioscorea L., IV : 311.
— , Notes sur le genre Rinorea Aubl., VI : 131.
— , Notes sur le Strephonema Gilleti, VIII : 119.
— , Notes sur quelques espèces africaines du genre Clerodendron, VII : 161.
— , Notes sur les formes congolaises du genre Crotalaria, VIII : 129.
— , Observations sur des Légumineuses de la Flore africaine, VII : 219.
— , Remarques sur les espèces africaines du genre Grumilea Gaertn., IX : 21, 4 fig.
Durand, Th. et H., Sylloge Florae Congolanae, II : 1.

Evrard, C. (Germain, R. et), Un nouveau Brachiaria de l'Est du Congo belge, XXIII : 273, fig. 36-37.

Germain, R., Acquisitions nouvelles pour la flore du Congo belge (Octoknemaceae, Flacourtiaceae, Guttiferae), XXV : 261.

Germain, R., Groupes nouveaux de Spermatophytes de la plaine de la Ruzizi (Congo belge), XXII : 71.
— , Une nouvelle espèce de Schizachyrium au Congo belge, XXII : 139, fig. 10.
Germain, R. et Evrard, C., Un nouveau Brachiaria de l'Est du Congo belge, XXIII : 273, fig. 36-37.
Germain, R. et Kesler, W., Un Coffea nouveau du Congo belge, XXV : 405, fig. 57.
Ghesquière, J., Contribution à l'étude des Légumineuses, principalement du Congo belge. I. Les Cassia africains de la section Chamaecrista Benth., IX : 139, pl. I et II.
— , Un Erythrina nouveau du Congo belge, XV : 217, 2 fig.
Gilbert, G. et Boutique, R., Groupes nouveaux de Mimosacées et Caesalpiniacées, XXII : 177.
Gustafsson, C. E., Les Rubus africains de l'Herbier du Jardin botanique de l'État à Bruxelles, XIII : 267, pl. II.

Hauman, L., Contribution à l'étude des Chrysobalanoideae africaines, XXI : 167, fig. 42-43.
— , Contribution à l'étude des Papilionaceae-Phaseoleae du Congo belge et du Ruanda-Urundi, XXV : 93.
— , Deux Pilea nouveaux du Congo belge, XVII : 177.
— , Deux Podostémonacées nouvelles du Congo belge, XVII : 179.
— , Le genre Protea L. en Afrique tropicale, XVII : 165.
— , Notes sur le genre Dichapetalum Thou. en Afrique centrale, XXV : 339.
— , Note sur les Ulmacées du Congo belge, XVI : 407.
— , Note sur quelques Aizoacées et sur un Chenopodium du Congo belge, XIX : 443.
— , Quelques Papilionaceae-Dalbergieae du Congo belge, XXIV : 223.
— , Sur quelques Amaranthacées nouvelles ou mal connues de l'Afrique équatoriale, XVIII : 105.
— , Sur quelques Capparidaceae d'Afrique tropicale, XX : 191, fig. 21.
— , Sur quelques Protea de l'Afrique tropicale, XIX : 51.
— , Sur quelques Rosacées d'Afrique tropicale, XXII : 87, fig. 8.
— , Trois Moracées nouvelles du Congo belge, XIX : 59.
Hauman, L. et Balle, S., Les Alchemilla de l'Abyssinie et de Madagascar, avec un tableau synoptique des espèces africaines, XIV : 1, fig. 1-13.

Hoyle, A. C., Notulae systematicae africanae I. Deux variétés nouvelles de Brachystegia spiciformis (Caesalpiniaceae), XXI : 361, fig. 101.
— , Notulae systematicae II. A new species of Brachystegia from Southern Nigeria (Caesalpiniaceae), XXV : 183, fig. 44.
Hubbard, C. E. and Léonard, J., A new genus of Gramineae from tropical africa, XXII : 313.
Humbert, H. et Staner, P., Observations critiques sur quelques Composées du Congo belge, XIV : 99, pl. IV-V.

Jones, A. P. D. (Brenan, J. P. M. et), A new species of Cola from Tanganyika Territory, XVIII : 1, 1 pl.

Keay, R. W. J., A new species of Parkia R. Br. (Leguminosae-Mimosaceae), XXV : 209.
Keay, R. W. J. et Miège, J., Neostachyanthus occidentalis Keay et Miège. Nouvelle espèce d'Icacinacée d'Afrique occidentale, XXV : 271, fig. 47-51.
Kesler, W. (Germain, R. et), Un Coffea nouveau du Congo belge, XXV : 405, fig. 57.
Kostermans, A. J., A note on some African Sterculiaceae, XXIV : 335.
— , Some new names in African species of Beilschmiedia Nees (Lauraceae), XXII : 137.
— , The african Lauraceae I (Revision of the Lauraceae), IV : XV : 73, pl. V-IX.

Lawalrée, A., Campylostemon Laurentii De Wild. et la position systématique du genre Campylostemon Welw., XVIII : 249, 1 fig.
— , Dicotylées nouvelles du Congo belge et du Territoire du Tanganyika, XIX : 219.
— , Les genres Hoffmanniella Schlecht., Eleutheranthera Poit., et Exomiocarpon Lawalrée gen. nov., XVII : 55, fig. 13-14.
Lawalrée, A. (Robyns, W. et), Révision des espèces congolaises du genre Thesium L., XVII : 135.
— , Trois Thesium nouveaux du Congo belge, XX : 157.
Lebrun, J., Révision des Araliacées du Congo belge, XIII : 11.
— , Révision des espèces congolaises du genre Cynometra L., IX : 281.
Lebrun, J. et Boutique, R., Un Ficus nouveau pour le Congo belge, XIX : 213.

Léonard, J., A propos des genres africains Grossera Pax et Cavacoa J. Léonard (Euphorbiaceae), XXV : 315, fig. 53-54.
— , Euphorbiaceae-Antidesminae africanae novae, XVII : 253, fig. 20-24.
— , Lepidobotrys Engl., type d'une famille nouvelle de Spermatophytes; Les Lepidobotryaceae, XX : 31, fig. 6.
— , Note sur Antidesma leptobotryum Müll.-Arg. (Euphorb.) au Congo belge, XVII : 129, fig. 15-16.
— , Notulae systematicae I. — Moraceae, Opiliaceae, Olacaceae, Octoknemaceaeque africanae, XVIII : 145, 1 fig.
— , Notulae Systematicae III. — Une espèce nouvelle de Dorstenia du Congo belge, XIX : 227, fig. 23.
— , Notulae Systematicae IV. — Caesalpiniaceae-Amherstieae africanae americanaeque, XIX : 383, fig. 34-39.
— , Notulae Systematicae VI. — Un genre nouveau de Marantaceae du Congo belge : Haumania, XIX : 453.
— , Notulae Systematicae VII. — Un Pittosporum nouveau d'Afrique équatoriale, XX : 47, fig. 7.
— , Notulae Systematicae VIII. — Pittosporaceae et Caesalpiniaceae-Amherstieae congolanae novae, XX : 227, fig. 22.
— , Notulae Systematicae IX. — Nouvelles observations sur le genre Guibourtia (Caesalpiniaceae), XX : 269, fig. 27-28.
— , Notulae Systematicae X. — Leguminosae-Caesalpinieae africanae novae, XXI : 127, fig. 32-36.
— , Notulae Systematicae XI. — Les Cynometra et les genres voisins en Afrique tropicale, XXI : 373, fig. 102-116.
— , Notulae Systematicae XII.— Les genres Macrolobium Schreb. et Gilbertiodendron J. Léonard au Congo belge (Caesalpiniaceae), XXII : 185, fig. 20-21.
— , Notulae Systematicae XIII. — Caesalpiniaceae africanae (Cynometra, Didelotia, Zingania, Cryptosepalum, Pynaertiodendron), XXII : 201, fig. 22-25.
— , Notulae Systematicae XIV. — Les genres Macrolobium Schreb. et Gilbertiodendron J. Léonard en Afrique tropicale (Caesalpiniaceae), XXIV : 57.
— , Notulae Systematicae XV. — Papilionaceae-Hedysareae africanae (Aeschynomene, Alysicarpus, Ormocarpum), XXIV : 63, fig. 10-14.
— , Notulae Systematicae XVI. — Paramacrolobium genre nouveau de Caesalpiniaceae d'Afrique tropicale, XXIV : 347.

Léonard, J., Notulae Systematicae XVII. — Les genres Anthonotha P. Beauv. et Pellegriniodendron J. Léonard en Afrique tropicale (Caesalpiniaceae), XXV : 201,

— , Notulae Systematicae XVIII. — Euphorbiaceae africanae novae, XXV : 281, pl. VII, fig. 52.

— , Notulae Systematicae XIX. Observations sur divers Bridelia africains (Euphorbiaceae), XXV : 359.

Léonard, J. et Troupin G., Observations sur le genre Okoubaka Pellegr. et Normand (Octoknemaceae), XX : 11, fig. 4.

Léonard, J. (Staner, P. et), Notulae Systematicae V. — Thalictrum africains (Ranunculaceae), XIX : 449, fig. 41.

Louis, J., Contribution à l'étude du genre Afrormosia au Congo belge, XVII : 109.

— , Révision des espèces congolaises du genre Erythrina L., XIII : 295, pl. III et 4 fig.

Louis, J. et Boutique, R., Une espèce nouvelle d'Anacolosa au Congo belge, XVIII : 255, 1 pl.

Michotte, D. (Staner, P. et), Révision des espèces congolaises du genre Strophanthus P. DC., XIII : 23.

Miège, J. (Keay, R. W. J. et), Neostachyanthus occidentalis Keay et Miège. Nouvelle espèce d'Icacinacée d'Afrique occidentale, XXV : 271, fig. 47-51.

Mildbraed, J., Neue und seltene Acanthaceen aus dem oestlichen belgischen Kongo, XIV : 353.

Milne-Redhead., E., A new species of Otiophora from central Africa, XVIII : 103.

— , A new Zornia from tropical Africa (Leguminosae-Papilionaceae-Hedysareae), XXIV : 127.

Normand, D., Note sur les bois de Guibourtia Arnoldiana et de Copaifera religiosa du Mayumbe, XX : 19, pl. I et II.

Normand, D. et Cavaco, A., Observations taxonomiques et xylologiques sur le genre Pinacopodium Exell et Mendonça, XXI : 451, pl. IX-X, fig. 117.

Petit, E., A propos de «Mussaenda stenocarpa » Hiern (Rubiaceae), XXIV : 339, pl. VII.

— , Les Mussaenda L. (Rubiaceae) du Congo belge, XXV : 149.

— , Polygalaceae nouvelles du Congo belge, XXV : 333.

Petit, E. (Robyns, W. et), Note supplémentaire sur Oxygonum Burch. et sur les espèces congolaises de ce genre, XXIV : 1.
Petit, E. (Troupin, G. et), Pseudomussaenda Wernham au Congo belge, XXIII : 227.
Pichon, M., Classification des Apocynacées : XXXIV. — Les Malouetiinae d'Afrique, XXII : 115, pl. I, fig. 9.
— , Classification des Apocynacées : XXXVII. — Une espèce nouvelle du genre Hunteria, XXIII : 391, fig. 38.
— , Classification des Apocynacées : XXXVIII. — Révision du genre Oncinotis Benth., XXIV : 9, pl. I-II, fig. 1-2.
— , Classification des Apocynacées : XXXIX. — Révision du genre Alafia Thou., XXIV : 129, pl. III-VI, fig. 15-20.
— , Extension au Congo belge de l'aire de quelques Apocynacées, XXII : 107.

Raymond-Hamet, Sur quelques espèces du genre Kalanchoë du Congo belge, XIX : 437, fig. 40.
Robyns, W., A new species of Vangueriopsis Robyns from Liberia, XXII : 319, fig. 34.
— , Choripétales nouvelles de la région du Parc National Albert (Congo belge), XVIII : 261.
— , Contribution à l'étude des Graminées du Congo et du Ruanda-Urundi, VIII : 209.
— , Contribution à l'étude des Graminées du Congo belge et du Ruanda-Urundi. II. — Panicées, IX : 171, pl. III.
— , Contribution à l'étude des Graminées du Congo belge. III. — Pennisetum Rich., XIII : 1.
— , Note sur le genre Platostoma P. Beauv. (Labiatae-Ocimoideae), XVII : 15, fig. 3-5.
— , Note sur Oxygonum Burch. et sur les espèces congolaises de ce genre, XVII : 157.
— , Note sur le Xylia Ghesquierei Robyns, XVI : 253, fig. 14, pl. XIV.
— , Statistiques de nos connaissances sur les Spermatophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi, XVIII : 133.
— , Sur l'existence du Juniperus procera Hochst. au Congo belge, XVIII : 125, 1 fig.
— , Sympétales nouvelles de la région du Parc National Albert (Congo belge), XVII : 65.
— , Tentamen monographiae Vangueriae generumque affinium, XI : 1, 36 fig.

Robyns, W., Une Flore du Congo belge et du Ruanda-Urundi, XIX : 231.

— , Un nouveau genre de Labiatae-Ocimoideae de l'Afrique tropicale centrale, XVII : 27, pl. I.

Robyns, W. et Boutique, R., Sedum Churchillianum. Espèce nouvelle du Parc National Albert (Congo belge), XVII : 313, fig. 25.

— , Une espèce nouvelle de Clitandra du Parc National Albert (Congo belge), XVIII : 259.

— , Révision des Phaseoleae-Galactieae du Congo belge, XVIII : 67, 2 fig.

Robyns, W. et Ghesquière, J., Révision du genre Enantia Oliv. (Annonacées), IX : 303.

Robyns, W. et Lawalrée, A., Révision des espèces congolaises du genre Thesium L., XVII : 135.

— , Trois Thesium nouveaux du Congo belge, XX : 157.

Robyns, W. et Lebrun, J., Essai d'une monographie du genre Tinnea, VIII : 161.

Robyns, W. et Petit, E., Note supplémentaire sur Oxygonum Burch. et sur les espèces congolaises de ce genre, XXIV : 1.

Robyns, W. et Tournay, R., Essai de révision du genre Arisaema Mart. (Araceae) en Afrique tropicale, XXV : 395.

— , Monocotylées nouvelles ou critiques de la région du Parc National Albert (Congo belge), XXV : 239, fig. 46.

— , Une espèce nouvelle de Hippocratea du Parc National Albert (Congo belge), XIX : 89.

Robyns, W. et Van der Veken, P., Digitariae novae congolanae africanaeque, XXII : 143, fig. 11-14.

Robyns, W. et Wilczek, R., Contribution à l'étude du genre Beilschmiedia de l'Afrique tropicale, XX : 197, fig. 21.

— , Contribution à l'étude des Lauracées du Congo belge et de l'Afrique tropicale, XIX : 457, fig. 42-49.

Schubert, B. G., Notes on Desmodium and Droogmansia in the Belgian Congo, XXII : 287, fig. 33.

Sherff, E. E., Novelties in Bidens and Coreopsis from Belgian Congo and Central Africa, XIII : 285.

Staner, P., Les Guttifères de la flore du Congo belge, XIII : 61, pl. 1 et 1 fig.

Staner, P., Les Méliacées du Congo belge, XVI : 109, pl. I.
— , Les Thyméléacées de la flore du Congo belge, XII : 321, 14 fig.
— , Révision des espèces congolaises du genre Acalypha L., XV : 132, 1 fig.
— , Révision des espèces congolaises des genres Cycnium et Rhamphicarpa (Scrophulariacées), XV : 147.
— , Révision des espèces congolaises du genre Tetracera L., XV : 295.
— , Révision des Renonculacées du Congo belge, XV : 307, 1 pl.
— , Révision des Rhamnacées du Congo belge, XV: 393, fig. 45-60.
— , Un genre nouveau de Gesnériacées du Congo belge, XIII : 7.
Staner, P. et Léonard, J., Notulae Systematicae v. — Thalictrum africains (Ranunculaceae), XIX : 449, fig. 41.
Staner, P. et Michotte, D., Révision des espèces congolaises du genre Strophanthus P. DC., XIII : 23.
Stebbins, G. L., The scandent species of Prenanthes and Lactuca in Africa, XIV : 333, pl. VI-VIII.
— , Two new species of Lactuca from tropical Africa, XIV : 223, fig. 19.
Steyaert, R. L., Description de Cassia nouveaux pour la flore du Congo belge, XXI : 357, fig. 99 et 100.
— , Description de Sida nouveaux du Congo belge (Malvaceae), XXII : 105.
— , Note sur des Cassia africains et asiatiques de la section Chamaecrista avec description de nouvelles espèces, XX : 233, pl. VIII-X, fig. 23-26.
Suessenguth, K., Afrikanische Amaranthaceen aus dem Herbarium Brüssel, XV : 55.

Taton, A., Nouveaux Drosera du Congo belge, XVII : 307.
— , Ophioglossum Louisii Taton sp. nov. Épiphyte remarquable de la forêt équatoriale congolaise, XVII : 117, pl. XI.
Tournay, R. (Robyns, W. et), Monocotylées nouvelles ou critiques de la région du Parc National Albert (Congo belge), XXV : 239, fig. 46.
— , Une espèce nouvelle de Hippocratea du Parc National Albert (Congo belge), XIX : 89.
— , Essai de révision du genre Arisaema Mart. (Araceae) en Afrique tropicale, XXV : 395.
Toussaint, L., Papilionacées nouvelles du Congo belge, XXIII : 379.

Troupin, G., Contribution à l'étude des Ménispermacées africaines I, XIX : 409, pl. xviii-xix.

— , Contribution à l'étude des Ménispermacées africaines, iii, XXV, 131.

— , Contribution à l'étude systématique de Berlinia Soland. et genres voisins (Caesalpiniaceae-Amherstieae), XX : 285, fig. 29-30.

— , Plantae africanae I. (Myristicaceae-Connaraceae), XX : 141, fig. 37-38.

— , Plantae africanae II. (Connaraceae), XXI : 365.

— , Platae africanae III. (Aponogetonaceae) (Nouvelle famille pour le Congo belge), XIII : 223.

— , Plantae africanae IV. Monocotyledoneae, XXV : 221, fig. 45.

— , Plantae africanae V. Notes sur le genre Kaempferia L. au Congo belge (Zingiberaceae), XXV : 265.

— , Quelques Polygala nouveaux du Congo belge, XIX : 205.

— , Révision des espèces congolaises du genre Alectra Thunb. (Scrophulariaceae), XIX : 271.

Troupin G. (Léonard, J. et) Observations sur le genre Okoubaka Pellegr. et Normand (Octoknemaceae), XX : 11, fig. 4.

Troupin, G. et Petit, E., Pseudomussaenda Wernham au Congo belge, XXIII : 227.

Van der Veken, P., Graminées nouvelles ou peu connues de l'Afrique centrale, XXV : 325, fig. 55-56.

— , Sur l'identité de l'Ichnanthus Dewildemani Vanderyst (Gramineae), XXIV : 399, fig. 33-34.

— , Trois taxa nouveaux de Cypéracées du Congo belge, XXV : 143, fig. 38-39.

Van der Veken, P. (Robyns, W. et), Digitariae novae congolanae africanaeque, XXII : 143, fig. 11-14.

Verdcourt, B., A revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae. I. — The genus Pentanisia Harvey, XXII : 233, fig. 27-32.

— , A revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae. II. — The genus Otomeria Benth. and the new genus Batopedina Verdcourt, XXIII : 5, fig. 2-3.

— , A revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae. III. — The genus Virectaria Brem., XXIII : 35, fig. 4-5.

VERDCOURT, B., A revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae. IV. — Notes on the genera Parapentas BREM., and Otiophora ZUCC., XXIII : 53.
— , A revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae. V. — A revision of the genus Pentas BENTHAM together with a key to related genera, XXIII : 237, fig. 26-35.

WERDERMANN, E., Uebersicht ueber die aus dem Belgischen Kongo stammenden Arten der Gattung Ceropegia, XV : 222.
WILCZEK, R., Note sur quelques Capparidaceae nouvelles du Congo belge, XX : 181.
— , Deux nouvelles espèces de Caesalpinia du Congo belge, XXI : 83, fig. 29.
— , Groupes nouveaux des Phaseoleae-Phaseolinae du Congo belge et du Ruanda-Urundi, XXIV : 405, pl. XII-XIII, fig. 35.
— , Novitates Africanae I (Malpighiaceae et Linaceae), XXV : 303, pl. VIII.
— , Papilionaceae-Genisteae congolanae novae (Robynsiophyton, Crotalaria, Argyrolobium, XXIII : 125, pl. I-VI, fig. 23-25.
— , Une espèce nouvelle de Kaoue PELLEGR. du Congo belge, XXI : 353, pl. VII.
— , Révision des genres Blighia KOENIG et Phialodiscus RADLK., XXI : 149, fig. 30-41.
WILCZEK, R. (ROBYNS, W. et), Contribution à l'étude du genre Beilschmiedia de l'Afrique tropicale, XX : 197, fig. 21.
— , Contribution à l'étude des Lauracées du Congo belge et de l'Afrique tropicale, XIX : 457, fig. 42-49.

E. — SPERMATOPHYTES — SPERMATOPHYTEN
(Belgique) (België)

ANDREAS, Ch.-H., Erodium dentatum DU MORTIER, XVIII : 241, 1 fig.
ARÈNES, J., Les Composées - Cynarocéphales de Belgique, XXIV : 241.
— , Monographie du genre Arctium L., XX : 67, pl. III-VII, fig. 11-15.

BOULENGER, G. A., Note sur le Rosa stylosa des auteurs, XIV : 373, fig. 27.

Kloos, A. W., Dix espèces d'Amaranthus nouvelles pour la Flore belge, XIX : 243.

Lawalrée, A., Cochlearia pyrenaica DC. en Belgique, XXV : 205.
— , Deux hybrides Polygonum convolvulus × dumetorum, XXII : 211, fig. 26.
— , Juncus Kochii, Euphrasia montana et Galeopsis bifida en Belgique, XXIV : 229, fig. 21.
— , La Chélidoine double et la Chélidoine laciniée en Belgique, XXV : 409.
— , Le genre Rumex sous-genre Acetosella en Belgique, XXII : 79, fig. 7.
— , Le groupe du Valeriana officinalis L. en Belgique, XXII : 193.
— , Les Ambrosia adventices en Europe occidentale, XVIII : 305.
— , Stellaria nemorum L. subsp. glochidosperma Murb. en Belgique, XXIII : 77.
— , Ulmus hollandica Mill. en Belgique, XXII : 65, fig. 6.
— , Veronica Anagallis-aquatica L. et Veronica catenata Pennell en Belgique, XXIII : 383.

Melville, R., The elms of the Dumortier Herbarium, XXI : 347.
Mosseray, R., Sur l'existence du Quercus pedunculata Ehrh. dans les alluvions de la Nèthe, XIII : 57.
— , Matériaux pour une flore de Belgique. — V. Genre Senecio, XIV : 57, pl. I.
— , Matériaux pour une flore de Belgique. — VI. Genres Bidens et Galinsoga, XIV : 313, fig. 24-25.
— , Note sur quelques formes de Papaver dubium, XVIII : 293.

Robyns, A., Essai d'étude systématique et écologique des Centaurium de Belgique, XXIV : 349, pl. VIII-XI, fig. 25-32.
Robyns, W., Une flore générale de Belgique, XXI : 1.

F. — SPERMATOPHYTES — SPERMATOPHYTEN
(Autres régions) (Andere landen)

Andreas, Ch.-H., Erodium dentatum Du Mortier, XVIII : 241, 1 fig.
Arènes, J., Monographie du genre Arctium L., XX : 67, pl. III-VII, fig. 11-15.

Boulenger, G. A., Étude du Rosa gymnocarpa Nutt., XIV : 279, fig. 22-23.

— , Introduction à l'étude du genre Rosa, XIV : 241.

— , Le Rosa blanda Ait. comparé au Rosa cinnamomea L., XIV : 289.

— , Les Roses d'Europe de l'Herbier Crépin, vol. I, X : 1.

— , Les Roses d'Europe de l'Herbier Crépin, vol. II, XII : 1.

— , Monographie du genre Hesperhodos Cocker., XIV : 227, fig. 20-21.

— , Note sur le Rosa stylosa des auteurs, XIV : 373, fig. 27.

— , Révision des Roses d'Asie de la section des Eglanteriae, groupes des Pimpinelli-Suavifoliae, Orientales et Alpinae-Vestitae, XIII : 165, 4 fig.

— , Révision des Roses d'Asie, sections des Eglanteriae (suite et fin), Chinenses, Bracteatae, Banksianae et Microphyllae, XIV : 115, fig. 14-18.

— , Révision des Roses d'Asie de la Section des Synstylae, IX : 203.

— , Supplément à la révision des Roses d'Asie, section des Synstylae, XIV : 274.

— , Sur un Rosier cultivé nommé Rosa Rouletii Correvon, XIV : 367.

Lawalrée, A., Les Ambrosia adventices en Europe occidentale, XVIII : 305.

Léonard, J., Notulae Systematicae IV (Caesalpiniaceae-Amherstieae africanae americanaeque), XIX : 383, fig. 34-39.

Melville, R., The Elms of the Dumortier Herbarium, XXI : 347.

Robyns, W., Tentamen monographiae Vangueriae generumque affinium, XI : 1, 36 fig.

Wouters, W., Au sujet du spécimen-type de Gossypium obtusifolium Roxb., XVII : 245, fig. 19, pl. III.

IV. — PHYTOGÉOGRAPHIE PHYTOSOCIOLOGIE — ÉCOLOGIE

PLANTENAARDRIJKSKUNDE PLANTENSOCIOLOGIE — ECOLOGIE

Balle, S. (Hauman, L. et), Les Alchemilla de l'Abyssinie et de Madagascar, avec un tableau synoptique des espèces africaines, XIV : 1, fig. 1-13.

Demaret F., Contribution à l'étude de la végétation bryophytique pionnière des falaises de Yangambi au Congo belge, XXIV : 107, fig. 1-4.

— , Coup d'œil sur les principaux groupements bryophytiques de quelques rochers calcaires en Belgique, XVII : 181, fig. 18.

— , Le genre Andreaea en Afrique centrale et orientale, XVII : 33, fig. 6-12.

Hauman, L., Les Bryophytes des hautes altitudes au Ruwenzori, XVI : 311, fig. 22.

Hauman, L. et Balle, S., Les Alchemilla de l'Abyssinie et de Madagascar, avec un tableau synoptique des espèces africaines, XIV : 1, fig. 1-13.

Mac Leay, K. N. G., Geographical relationships of the Pteridophyte flora of the Sudan, XXV : 213.

Massart, J., Comment les jeunes feuilles se protègent contre les intempéries, I : 181.

— , Comment les plantes vivaces maintiennent leur niveau souterrain, I : 113.

— , Comment les plantes vivaces sortent de terre au printemps, I : 143.

— , L'accommodation individuelle chez Polygonum Amphibium, I : 73.

— , Les collections éthologiques au Jardin botanique de l'État, I : 217.

Mörzer Bruijns, M. F., Lawalrée, A., Schimmel, H. en Demaret, F., Vegetatieonderzoek van het Zwin in 1951-1952, XXIII : 81, fig. 10-22.

Mosseray, R., Esquisse des Groupements végétaux de quelques bois du District hesbayen de Belgique, XV : 173, 4 fig. et 1 pl.
— , Sur l'existence du Quercus pedunculata Ehrh. dans les alluvions de la Nèthe, XIII : 57.

Robyns, A., Essai d'étude systématique et écologique des Centaurium de Belgique, XIV : 349, pl. VIII-XI, fig. 25-32.
Robyns, W., Le concept des Phytocénoses biotiques principalement dans les régions intertropicales, XVI : 413.
Robyns, W. et Lamb, S. H., Preliminary ecological survey of the Island of Hawaii, XV : 241, 34 fig.

Taton, A., Ophioglossum Louisii Taton sp. nov. Épiphyte remarquable de la forêt équatoriale congolaise, XVII : 117, pl. II.

Vanden Berghen, C., Contribution à l'étude des bas-marais de Belgique, XXII : 1, fig. 1-5.
Van Meel, L., Sur la répartition du genre Batrachospermum en Belgique, XV : 319, 1 fig. et 1 pl.
— , Sur la répartition du genre Batrachospermum en Belgique. II, XVII : 49.

V. — TÉRATOLOGIE — TERATOLOGIE

Demaret, F., Une capsule double chez Mnium hornum Hedw., XX : 325, fig. 31.

VI. — PALÉOBOTANIQUE — PALEOBOTANIEK

Bommer, C., Fr. Crépin et la flore fossile de la Belgique, IX : 86.

VII. — BIOGRAPHIES — BIOGRAFIEN

Anonyme, Commémoration du centième anniversaire de la naissance de François Crépin, IX : 59.
— , Inauguration du buste de François Crépin au Jardin botanique de l'État. — Compte rendu de la cérémonie du 5 décembre 1904, I : 281.

Bommer, C., Fr. Crépin et la flore fossile de la Belgique, IX : 86.
Boulenger, G. A., Fr. Crépin et les Roses, IX : 78.

Christ, H., Quelques impressions sur Crépin, IX : 83.

De Wildeman, E., Alfred Cogniaux, V : I-XXIX, avec portrait.
— , Charles Bommer (1866-1938), XV : 121, avec portrait.
— , Elie Marchal, IX : 1, avec portrait.
— , Fr. Crépin, la Société Royale de Botanique de Belgique et le Jardin botanique de l'État, IX : 66.
— , Fr. M. C. Vermoesen, VIII : I-IX.
— , Théophile Durand, Directeur du Jardin botanique de l'État. 8 novembre 1901 — 12 janvier 1912, IV : I-XVII.

Robyns, W., Emile De Wildeman (1866-1947), XIX : 1, avec portrait.
— , G. A. Boulenger (1858-1937). Sa vie et son œuvre rhodologique, XV : 1, 1 fig.
— , Raoul Mosseray (1908-1940), XVI : 1, avec portrait.

VIII. — VARIA

Anonyme, Association Internationale de Taxonomie Botanique. Circulaire, XXI : 199.
— , Communication. — VI^e Congrès International de Botanique, IX : 348.
— , VI^e Congrès International de Botanique. Amsterdam, 2-7 septembre 1935, XIII : 59.
— , Delectus seminum quae Hortus Bot. Brux. pro mutua commutatione offert. — Anno : 1930, VIII; 1931, IX; 1932, IX; 1933, IX; 1934, XIII; 1935, XIII; 1936, XIV; 1937, XIV; 1938, XV; 1939, XV; 1940, XVI; 1941, XVI; 1942, XVI; 1945, XVII; 1946, XVIII; 1947, XVIII; 1948, XIX; 1949, XIX; 1950, XX; 1951, XXI; 1952, XXII; 1953, XXIII; 1954, XXIV; 1955, XXV.
— , Liste des plantes, boutures et graines offertes en échange par les services de cultures du Jardin botanique de l'État à Bruxelles : III, 281.
Bommer, C., Considérations sur la documentation en histoire naturelle, VI : 195.

De Wildeman, E., Fr. Crépin, la Société Royale de Botanique de Belgique et le Jardin Botanique de l'État, IX : 66.
— , Rapport sur une visite aux Instituts botaniques et coloniaux de Berlin, Dresde et Paris en 1902, I : 97.

Gravis, A., Discours, IX : 62.

Marchal, E., Le Prix François Crépin, IX : 90.
Massart, J., Notice sur la serre des plantes grasses au Jardin Botanique de l'État, I : 355.
— , Un jardin botanique pour les écoles moyennes, I : 1.

Van Aerdschot, P., Catalogue de la Bibliothèque collective réunie au Jardin Botanique de l'État à Bruxelles, III ; 1.
— , Notes sur la Bibliothèque collective du Jardin Botanique de l'État, IX : 99.

Table alphabétique des articles par auteur
Alphabetische tafel van de artikels per auteur

Andreas, Ch.-H., Erodium dentatum Du Mortier, XVIII : 241, 1 fig.

Anonyme, Association Internationale de Taxonomie Botanique. Circulaire, XXI : 199.

— , Commémoration du centième anniversaire de la naissance de François Crépin, IX : 59.

— , VI[e] Congrès International de Botanique. Amsterdam, 2-7 septembre 1935, XIII : 59.

— , Delectus seminum quae Hortus Bot. Brux. pro mutua commutatione offert. — Anno : 1930, VIII; 1931, IX; 1932, IX; 1933, IX; 1934, XIII; 1935, XIII; 1936, XIV; 1937, XIV; 1938, XV; 1939, XV; 1940, XVI; 1941, XVI; 1942, XVI; 1945, XVII; 1946, XVIII; 1947, XVIII; 1948, XIX; 1949, XIX; 1950, XX; 1951, XXI; 1952, XXII; 1953, XXIII; 1954, XXIV; 1955, XXV.

— , Inauguration du buste de François Crépin au Jardin Botanique de l'État. — Compte rendu de la cérémonie du 5 décembre 1904, I : 281.

— , Liste des plantes, boutures et graines offertes en échange par les services de culture du Jardin Botanique de l'État à Bruxelles, III : 281.

Arènes, J., Les Composées - Cynarocéphales de Belgique, XXIV : 241.

— , Monographie du genre Arctium L., XX : 67, pl. III-VII, fig. 11-15.

Babcock, E. B., Crepis species of western tropical Africa (Angola, Congo, Cameroons, Nigeria), XIV : 293.

Baker, E. et De Wildeman, E., Notes sur les formes congolaises du genre Crotalaria, VIII : 129.
— , Sur quelques Indigofera du Congo, VIII : 143.
Balle, S., Les Loranthus du Congo belge. Note préliminaire à l'étude des Loranthoïdées d'Afrique, XVII : 225.
— , Révision des Piperaceae du Congo belge, XVI : 367, pl. XVI.
Balle, S. (Hauman, L. et), Les Alchemilla de l'Abyssinie et de Madagascar, avec un tableau synoptique des espèces africaines, XIV : 1, fig. 1-13.
Bamps, P., Hyparrhenia nouveaux du Congo belge (Gramineae), XXV : 391.
Beeli, M., Contribution à l'étude de la flore mycologique du Congo. — XI. Fungi Goossensiani, XII. Fungi Loosiani, XIV : 83, pl. II-III.
— , Énumération des champignons signalés au Congo, VIII : 67.
— , Étude de la flore mycologique africaine. Note sur des Basidiomycètes récoltés à Sierra Leone par F. C. Deighton, XV : 25, pl. I-IV.
— , Notes sur le genre Meliola Fr., VII : 89.
— , Notes Mycologiques. I. Contribution à la Flore mycologique du Congo, VIII : 1.
— , Notes mycologiques. II. Relevé des Ustilaginées du Congo, VIII : 12.
— , Notes mycologiques. IV. Contribution à la Flore mycologique du Congo, VIII : 245.
— , Notes mycologiques congolaises. — Champignons récoltés dans la région du Kivu par F. L. Hendrickx, Mycologue à l'I. N. É. A. C., XVI : 105.
Beguinot, A., Note sur les Romulea du Congo belge, XV : 215.
Bommer, C., Considérations sur la documentation en Histoire naturelle, VI : 195.
— , Fr. Crépin et la flore fossile de la Belgique, IX : 86.
Boulenger, G. A., Étude du Rosa gymnocarpa Nutt., XIV : 279, fig. 22-23.
— , Fr. Crépin et les Roses, IX : 78.
— , Introduction à l'étude du genre Rosa, XIV : 241.
— , Monographie du genre Hesperhodos Cocker., XIV : 227, fig. 20-21.
— , Note sur le Rosa stylosa des auteurs, XIV : 373, fig. 27.
— , Révision des Roses d'Asie de la Section des Synstylae, IX : 203.

Boulenger, G. A., Révision des Roses d'Asie de la Section des Eglanteriae, groupes des Pimpinelli-Suavifoliae, Orientales et Alpinae-Vestitae, XIII : 165, 4 fig.

— , Révision des Roses d'Asie, sections des Eglanteriae (suite et fin), Chinenses, Bracteatae, Banksianae et Microphyllae, XIV : 115, fig. 14-18.

— , Le Rosa blanda Ait. comparé au Rosa cinnamomea L., XIV : 289.

— , Les Roses d'Europe de l'Herbier Crépin, vol. I, X : 1.

— , Les Roses d'Europe de l'Herbier Crépin, vol. II, XII : 1.

— , Supplément à la révision des Roses d'Asie, section des Synstylae, XIV : 274.

— , Sur un Rosier cultivé nommé Rosa Rouletii Correvon, XIV : 367.

Boutique, R., Annonacées nouvelles de la Flore du Congo belge et du Ruanda-Urundi, XXI : 95, pl. I-IV.

Boutique, R., Une nouvelle espèce du genre Abrus L. (Papilionaceae-Vicieae) d'Afrique tropicale, XXV : 127.

Boutique, R., Une espèce nouvelle de Ficus du Congo belge, XIX : 211, fig. 21.

— , Espèces nouvelles du genre Lotus L. (Papilionaceae), XXIII : 233.

Boutique, R. (Gilbert, G. et), Groupes nouveaux de Mimosacées et Caesalpiniacées, XXII : 177.

Boutique, R. (Lebrun, J. et), Un Ficus nouveau pour le Congo belge, XIX : 213.

Boutique, R. et Léonard, J., Notulae Systematicae II (Ficus nouveaux du Congo belge), XIX : 215, fig. 22.

Boutique, R. (Louis, J. et), Une espèce nouvelle d'Anacolosa au Congo belge, XVIII : 255, 1 pl.

Boutique, R. (Robyns, W. et), Une espèce nouvelle de Clitandra du Parc National Albert (Congo belge), XVIII : 259.

Boutique, R. (Robyns, W. et), Révision des Phaseoleae-Galactieae du Congo belge, XVIII : 67, 2 fig.

— , Sedum Churchillianum. Espèce nouvelle du Parc National Albert (Congo belge), XVII : 313, fig. 25.

Boutique, R. et Troupin, G., Theaceae. Famille nouvelle pour la Flore du Congo belge, XX : 61, fig. 8-10.

Bremekamp, C. E. B., Contribution à l'étude du genre Pavetta. Description de quatre espèces nouvelles du Congo belge, XIV : 305.

Bremekamp, C. E. B., Rubiacées nouvelles pour le Congo belge, XXII : 97.
Brenan, J. P. M. and Jones, A. P. D., A new species of Cola from Tanganyika Territory, XVIII : 1, 1 pl.
Burkill, I. H., Notes on the Genus Dioscorea in the Belgian Congo, XV : 345.

Cavaco, A. (Normand, D. et), Observations taxonomiques et xylologiques sur le genre Pinacopodium Exell et Mendonça, XXI : 451, pl. IX-X, fig. 117.
Chermezon, H., Cypéracées nouvelles du Congo belge, XIII : 277.
— , Cypéracées nouvelles du Congo belge. II., XIV : 329.
Christ, H., Quelques impressions sur Crépin, IX : 83.
Cogniaux, A., Cucurbitaceae novae Herbarii Bruxellensis, V : 109.
Croizat, L., Une nouvelle espèce de Kalanchoë du Mozambique, XIV : 363, pl. IX, fig. 26.
— , Euphorbiacées africaines nouvelles ou peu connues : Elaeophorbia et Euphorbia Section Tekeanae, XV : 109.
Cronquist, A., A new species and a new combination in tropical african Compositae, XXII : 309.
— , New species and varieties of Papilionaceae from the Belgian Congo, XXII : 215.
Cufodontis, G., Enumeratio plantarum Aethiopiae, Spermatophyta, XXIII, supplément : I-XVI, 1.
— , Enumeratio Plantarum Aethiopiae, Spermatophyta (Sequentia), XXIV, supplément : 113; XXV, supplément : 193, 273.

Demaret, F., Additions à la Flore bryologique du Congo belge, XXIV : 51, fig. 8-9.
— , Bryum Brotherianum Demaret nom. nov., XIX : 355, fig. 29.
— , Une capsule double chez Mnium hornum Hedw., XX : 325, fig. 31.
— , Catalogue bryologique de la Forêt de Soignes, XIV : 379.
— , Une collection de Muscinées africaines des hautes altitudes, XXIV : 451, fig. 36.
— , Complément à l'étude des espèces africaines du genre Cyclodictyon Mitt., XXII : 155, fig. 15-16.
— , Contribution à l'étude de la Flore et de la Végétation muscinales dans la région de Mariembourg, XV : 152, 1 fig.
— , Contribution à l'étude de la végétation bryophytique pionnière des falaises de Yangambi au Congo belge, XXIV: 107, fig. 1-4.

Demaret, F., Coup d'œil sur les principaux groupements bryophytiques de quelques rochers calcaires en Belgique, XVII : 181, fig. 18.
— , Étude préliminaire des Hookeriaceae africaines intertropicales, XXV : 375.
— , Une forme nouvelle de Brachythecium velutinum (Hedw.)
— , Br. et Schpr var. validum (C. Jens.) C. Jens., XVIII : 97, 1 pl., 1 fig.
— , Le genre Andreaea en Afrique centrale et orientale, XVII : 33, fig. 6-12.
— , Les Mousses des chutes de la Tshopo (Congo belge), XX : 41.
— , Note sur Callicostella heterophylla J. Angstr., XXIII : 1, fig. 1.
— , Orthodontium lineare Schwaegr. en Belgique, XXIV, 239.
— , Prodrome des Bryophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi. I. Musci, XVI : 21.
— , Prodrome des Bryophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi. I. (Musci, supplément I), XVIII : 7.
— , Prodrome des Bryophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi. II. Hepaticae, XVI : 287.
— , Prodrome des Mousses de Belgique, XVII : 317.
— , Les Ptéridophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi, I, XIX : 251.
— , Les Ptéridophytes du Congo belge et du Ruanda-Urundi, II, XX : 51.
— , Révision des espèces belges de Sphagnum Dill. sous-section Cymbifolia Lindb., XVI : 267, fig. 15-21.
— , Rhynchostegiella Teesdalei Limpr. en Belgique, XV : 425.
Demaret, F. et Leroy, V., Contribution à l'étude des genres Syrrhopodon et Thyridium et révision des espèces congolaises XVIII : 207, 9 fig.
— , Une espèce nouvelle de Campylopus du Parc National Albert (Congo belge), XIX : 85, fig. 6.
— , Récoltes bryologiques de M. R. Germain au Congo belge, XIX : 359, fig. 30.
Demaret, F. et Potier de la Varde, R., Deux Hookeriaceae nouvelles du Ruwenzori (Congo belge), XXV : 353, pl. IX-X.
— , Les espèces africaines du genre Callicostella (C. Müll.) Jaeg., XXII : 323, fig. 35-61.
— , Les espèces africaines du genre Cyclodictyon Mitt., XXI : 11, fig. 1-22.

Demaret, F. et Vanden Berghen, C., Frullania Arecae (Spreng.) Gottsche et F. Ecklonii (Spreng.) Gottsche et Lindenb., XIX : 73, fig. 5.

— , Frullania capensis Gottsche et les espèces confondues avec lui, XVIII : 117, 3 fig.

— , Révision de quelques espèces africaines du genre Frullania, XVIII : 231, 3 fig.

— , Révision des espèces africaines du genre Frullania Raddi, sous-genre Meteoriopsis Spruce, XX : 1, fig. 1-3.

Demaret, F. (Mörzer Bruijns, M. F., Lawalrée, A., Schimmel, H. en), Vegetatieonderzoek van het Zwin in 1951-1952, XXIII : 81, fig. 10-22.

De Wildeman, E., Additions à la Flore du Congo, IV : 1.

— , Additions à la Flore du Congo II, V : 117, 269, 365.

— , Additions à la Flore du Congo III, VI : 1, pl. I-XXXV.

— , Additions à la Flore du Congo, VII : 1, 271.

— , Alfred Cogniaux, V : I-XXIX.

— , Un Argyrolobium nouveau pour le Congo, VIII : 127.

— , Un Astragalus nouveau de la région du Rutshuru (Ruchuru), VIII : 125.

— , Charles Bommer (1866-1938), XV : 121, avec portrait.

— , Contributions à l'étude des espèces africaines du genre Acioa Aubl., VII : 188.

— , Decades novarum specierum Florae congolensis, III : 253; II, IV : 359.

— , Decades novarum specierum Florae congolensis III, V : 1.

— , Deux Bananiers indigènes du Ruanda, VIII : 103.

— , Deux Carduus du Ruwenzori, VIII : 115.

— , Documents pour une monographie des Alchemilla d'Afrique, VI : 207.

— , Documents pour une monographie des Alchemilla d'Afrique. II. Sur les Alchemilla de Madagascar, VII : 317.

— , Documents pour une monographie des Alchemilla d'Afrique. III. Les Alchemilla du groupe « Pedatae » Engler, VII : 339.

— , Documents pour une monographie des Alchemilla d'Afrique. IV. Notes sur les Alchemilla du groupe « Subochreatae » Engler, VII : 359.

— , Documents pour une monographie des Alchemilla d'Afrique. V. Sur quelques espèces du groupe « Latilobae » Engler, VII : 378.

De Wildeman, E., Documents pour une monographie du genre Vangueria Juss., VIII : 39.
— , Elie Marchal, IX : 1, avec portrait.
— , Fr. Crépin, la Société Royale de Botanique de Belgique et le Jardin Botanique de l'État, IX : 66.
— , Fr. M. C. Vermoesen, VIII : I-IX.
— , Notes sur les espèces africaines du genre Dioscorea L., IV : 311.
— , Notes sur le genre Rinorea Aubl., VI : 131.
— , Notes sur le Strephonema Gilleti, VIII : 119.
— , Notes sur quelques espèces africaines du genre Clerodendron, VII : 161.
— , Observations sur les Légumineuses de la Flore africaine, VII : 219.
— , Rapport sur une visite aux Instituts botaniques et coloniaux de Berlin, Dresde et Paris en 1902, I : 97.
— , Remarques sur les espèces africaines du genre Grumilea Gaertn., IX : 21, 4 fig.
— , Théophile Durand, Directeur du Jardin Botanique de l'État. 8 novembre 1901 — 12 janvier 1912, IV : I-XVII.
De Wildeman, E. (Baker, E. et), Notes sur les formes congolaises du genre Crotalaria, VIII : 129.
— , Sur quelques Indigofera du Congo, VIII : 143.
Durand, Th. et H., Sylloge Florae Congolanae, II : 1.
Duvigneaud, P., Hendricxia Duvign., nouveau genre de Parméliacées des montagnes équatoriales, XVI : 355, fig. 23-24.
— , Remarques sur la systématique des Lichens à « Podétions », XVII : 149, fig. 17.
— , Xanthodactylon Duvign., genre nouveau de Lichens de l'Afrique du Sud, XVI : 259, pl. XV.

Evrard, C. (Germain, R. et), Un nouveau Brachiaria de l'Est du Congo belge, XXIII : 373, fig. 36-37.

Frémy, P., Contribution à la Flore algologique du Congo belge d'après les récoltes du R. P. H. Vanderyst, IX : 109, 26 fig.
— , Seconde Contribution à la Flore algologique du Congo belge d'après les récoltes du R. P. H. Vanderyst, IX : 322, 32 fig.

Germain, R., Acquisitions nouvelles pour la flore du Congo belge (Octoknemaceae, Flacourtiaceae, Guttiferae), XXV : 261.

Germain, R., Groupes nouveaux de Spermatophytes de la plaine de la Ruzizi (Congo belge), XXII : 71.
— , Une nouvelle espèce de Schizachyrium au Congo belge, XXII : 139, fig. 10.
Germain, R. et Evrard, C., Un nouveau Brachiaria de l'Est du Congo belge, XXIII : 373, fig. 36-37.
Germain, R. et Kesler, W., Un Coffea nouveau du Congo belge, XXV : 405, fig. 57.
Ghesquière, J., Contribution à l'étude des Légumineuses, principalement du Congo belge. I. Les Cassia africains de la section Chamaecrista Benth., IX : 139, pl. I et II.
— , Un Erythrina nouveau du Congo belge, XV : 217, 2 fig.
Ghesquière, J. (Robyns, W. et), Révision du genre Enantia Oliv. (Annonacées), IX : 303.

Gilbert, G. et Boutique, R., Groupes nouveaux de Mimosacées et Caesalpiniacées, XXII : 177.
Gravis, A., Discours, IX : 62.
Gustafsson, C. E., Les Rubus africains de l'Herbier du Jardin Botanique de l'État à Bruxelles, XIII : 267, pl. II.

Hauman, L., Les Bryophytes des hautes altitudes au Ruwenzori, XVI : 311, fig. 32.
— , Contribution à l'étude des Chrysobalanoideae africaines, XXI : 167, fig. 42-43.
— , Contribution à l'étude des Papilionaceae-Phaseoleae du Congo belge et du Ruanda-Urundi, XXV : 93.
— , Deux Pilea nouveaux du Congo belge, XVII : 177.
— , Deux Podostémonacées nouvelles du Congo belge, XVII : 179.
— , Le genre Protea L. en Afrique tropicale, XVII : 165.
— , Notes sur le genre Dichapetalum Thou. en Afrique centrale, XXV : 339.
— , Note sur les Ulmacées du Congo belge, XVI : 407.
— , Note sur quelques Aizoacées et sur un Chenopodium du Congo belge, XIX : 443.
— , Quelques Papilionaceae-Dalbergieae du Congo belge, XXIV : 223.
— , Sur quelques Amaranthacées nouvelles ou mal connues de l'Afrique équatoriale, XVIII : 105.
— , Sur quelques Capparidaceae d'Afrique tropicale, XX : 191, fig. 21.

Hauman, L., Sur quelques Protea de l'Afrique tropicale, XIX : 51.
— , Sur quelques Rosacées d'Afrique tropicale, XXII : 87, fig. 8.
— , Trois Moracées nouvelles du Congo belge, XIX : 59.
Hauman, L. et Balle, S., Les Alchemilla de l'Abyssinie et de Madagascar, avec un tableau synoptique des espèces africaines, XIV : 1, fig. 1-13.
Heim, R., Les Lactaires d'Afrique intertropicale (Congo belge et Afrique noire française), XXV : 1, fig. 1-37.
— , Les Termitomyces du Congo belge recueillis par Mme M. Goossens-Fontana, XXI : 205, pl. V et VI, fig. 44-47.
Heinemann, P., Un Bolet de l'Ile de la Trinité, XXIV : 121, fig. 8.
— , Champignons récoltés au Congo belge par Mme M. Goossens-Fontana. I. Boletineae, XXI : 223, fig. 48-98.
— , Champignons récoltés au Congo belge par Mme M. Goossens-Fontana. I. Boletineae. Note complémentaire, XXIII : 73, fig. 9.
— , Champignons récoltés au Congo belge par Mme M. Goossens-Fontana. I. Boletineae. Note complémentaire 2, XXV : 169.
— , Notes sur les Boletineae africaines, XXIV : 113, fig. 5-7.
Hoyle, A. C., Notulae systematicae africanae I. Deux variétés nouvelles de Brachystegia spiciformis (Caesalpiniaceae), XXI : 361, fig. 101.
— , Notulae systematicae II. A new species of Brachystegia from Southern Nigeria (Caesalpiniaceae), XXV : 183, fig. 44.
Hubbard, C. B. and Léonard, J., A new genus of Gramineae from tropical Africa, XXII : 313.
Humbert, H. et Staner, P., Observations critiques sur quelques Composées du Congo belge, XIV : 99, pl. IV-V.

Jones, A. P. D. (Brenan, J. P. M. and), A new species of Cola from Tanganyika Territory, XVIII : 1, 1 pl.

Keay, R. W. J., A new species of Parkia R. Br. (Leguminosae-Mimosaceae), XXV : 209.
Keay, R. W. J. et Miège, J., Neostachyanthus occidentalis Keay et Miège. Nouvelle espèce d'Icacinacée d'Afrique occidentale, XXV : 271, fig. 47-51.
Kesler, W. (Germain, R. et), Un Coffea nouveau du Congo belge, XXV : 405, fig. 57.
Kloos, A. W., Dix espèces d'Amaranthus nouvelles pour la Flore belge, XIX : 243.

Kostermans, A. J. G. H., The african Lauraceae I (Revision of the Lauraceae, IV), XV : 73, pl. V-IX.
— , A note on some african Sterculiaceae, XXIV : 335.
— , Some new names in african species of Beilschmiedia Nees (Lauraceae), XXII : 137.

Lamb, S. H. (Robyns, W. et), Preliminary ecological survey of the Island of Hawaii, XV : 241, 34 fig.
Lawalrée, A., Les Ambrosia adventices en Europe Occidentale, XVIII : 305.
— , Campylostemon Laurentii De Wild. et la position systématique du genre Campylostemon Welw., XVIII, 249, 1 fig.
— , La Chélidoine double et la Chélidoine laciniée en Belgique, XXV : 409.
— , Cochlearia pyrenaica DC. en Belgique, XXV : 205.
— , Deux hybrides Polygonum convolvulus × dumetorum, XXII : 211, fig. 26.
— , Les genres Hoffmanniella Schlecht., Eleutheranthera Poit. et Exomiocarpon Lawalrée gen. nov., XVII : 55, fig. 13-14.
— , Le genre Rumex sous-genre Acetosella en Belgique, XXII : 79, fig. 7.
— , Le groupe du Valeriana officinalis L. en Belgique, XXII : 193.
— , Juncus Kochii, Euphrasia montana et Galeopsis bifida en Belgique, XXIV : 229, fig. 21.
— , Note sur quelques Ptéridophytes de Belgique, XIX : 237.
— , Stellaria nemorum L. subsp. glochidosperma Murb. en Belgique, XXIII : 77.
— , Ulmus hollandica Mill. en Belgique, XXII : 65, fig. 6.
— , Veronica Anagallis-aquatica L. et Veronica catenata Pennell en Belgique, XXIII : 383.
Lawalrée, A. (Mörzer Bruijns, M. F., Schimmel, H., Demaret, F. en), Vegetatieonderzoek van het Zwin in 1951-1952, XXIII : 81, fig. 10-22.
Lawalrée, A. (Robyns, W. et), Trois Thesium nouveaux du Congo belge, XX : 157.
Lawalrée, A. (Robyns, W. et), Révision des espèces congolaises du genre Thesium L., XVII : 135.
Lebrun, J., Révision des Araliacées du Congo belge, XIII : 11.
— , Révision des espèces congolaises du genre Cynometra L., IX : 281.

Lebrun, J. et Boutique, R., Un Ficus nouveau pour le Congo belge, XIX : 213.

Lebrun, J. (Robyns, W. et), Essai d'une monographie du genre Tinnea, VIII : 161.

Léonard, J., Euphorbiaceae-Antidesminae africanae novae, XVII : 253, fig. 20-24.

— , Lepidobotrys Engl., type d'une famille nouvelle de Spermatophytes : les Lepidobotryaceae, XX : 31, fig. 6.

— , Note sur Antidesma leptobotryum Müll.-Arg. (Euphorb.) au Congo belge, XVII : 129, fig. 15-16.

— , Notulae systematicae I. — Moraceae, Opiliaceae, Olacaceae, Octoknemaceaeque africanae, XVIII : 145, 1 fig.

— , Notulae systematicae III. — Une espèce nouvelle de Dorstenia du Congo belge, XIX : 227, fig. 23.

— , Notulae systematicae IV. — Caesalpiniaceae-Amherstieae africanae americanaeque, XIX : 383, fig. 34-39.

— , Notulae systematicae VI. — Un genre nouveau de Marantaceae du Congo belge : Haumania, XIX : 453.

— , Notulae systematicae VII. — Un Pittosporum nouveau d'Afrique équatoriale, XX : 47, fig. 7.

— , Notulae systematicae VIII. — Pittosporaceae et Caesalpiniaceae-Amherstieae congolanae novae, XX : 227, fig. 22.

— , Notulae systematicae IX. — Nouvelles observations sur le genre Guibourtia (Caesalpiniaceae), XX : 269, fig. 27-28.

— , Notulae systematicae X. — Leguminosae-Caesalpinieae africanae novae, XXI : 127, fig. 32-36.

— , Notulae systematicae XI. — Les Cynometra et les genres voisins en Afrique tropicale, XXI : 373, pl. VIII, fig. 102-116.

— , Notulae systematicae XII. — Les genres Macrolobium Schreb. et Gilbertiodendron J. Léonard au Congo belge (Caesalpiniaceae), XXII : 185, fig. 20-21.

— , Notulae systematicae XIII. — Caesalpiniaceae africanae (Cynometra, Didelotia, Zingania, Cryptosepalum, Pynaertiodendron), XXII : 201, fig. 22-25.

— , Notulae systematicae XIV. — Les genres Macrolobium Schreb. et Gilbertiodendron J. Léonard en Afrique tropicale (Caesalpiniaceae), XXIV : 57.

— , Notulae systematicae XV. — Papilionaceae-Hedysareae africanae (Aeschynomene, Alysicarpus, Ormocarpum), XXIV : 63, fig. 10-14.

Léonard, J., Notulae systematicae XVI. — Paramacrolobium genre nouveau de Caesalpiniaceae d'Afrique tropicale, XXIV : 347.

— , Notulae systematicae XVII. — Les genres Anthonotha P. Beauv. et Pellegriniodendron J. Léonard en Afrique tropicale (Caesalpiniaceae), XXV : 201.

— , Notulae systematicae XVIII. — Euphorbiaceae africanae novae, XXV : 281, pl. VII, fig. 52.

— , Notulae systematicae XIX. — Observations sur divers Bridelia africains (Euphorbiaceae), XXV : 359.

— , A propos des genres africains Grossera Pax et Cavacoa J. Léonard (Euphorbiaceae), XXV : 315, fig. 53-54.

Léonard, J. (Boutique, R. et), Notulae systematicae II. — (Ficus nouveaux du Congo belge), XIX : 215, fig. 22.

Léonard, J. et Troupin, G., Observations sur le genre Okoubaka Pellegr. et Normand (Octoknemaceae), XX : 11, fig. 4.

Léonard, J. (Hubbard, C. E. and), A new genus of Gramineae from tropical Africa, XXII : 313.

Léonard, J. (Staner, P. et), Notulae systematicae V. — Thalictrum africains (Ranunculaceae), XIX : 449, fig. 41.

Leroy, V., Récoltes bryologiques au Congo belge et au Ruanda-Urundi, XVIII : 155, 15 fig.

Leroy, V. (Demaret, F. et), Contribution à l'étude des genres Syrrhopodon et Thyridium et révision des espèces congolaises, XVIII : 207, 9 fig.

— , Une espèce nouvelle de Campylopus du Parc National Albert (Congo belge), XIX : 85, fig. 6.

— , Récoltes bryologiques de M. R. Germain au Congo belge, XIX : 359, fig. 30.

Louis, J., Contribution à l'étude du genre Afrormosia au Congo belge, XVII : 109.

— , Révision des espèces congolaises du genre Erythrina L., XIII : 295, pl. III et 4 fig.

Louis, J. et Boutique, R., Une espèce nouvelle d'Anacolosa au Congo belge, XVIII : 255, 1 pl.

Mac Leay, K. N. G., Geographical relationships of the Pteridophyte flora of the Sudan, XXV : 213.

Marchal, E., Le Prix François Crépin, IX : 90.

Marlier-Spirlet, M.-L., Sur quelques épidermes de feuilles de Cinnamonum L., XVII : 266, pl. IV-XXI.

MARTENS, P., Les organes glanduleux de Polypodium virginianum (P. vulgare var. virginianum), XVII : 1, fig. 1-2.

MASSART, J., L'accommodation individuelle chez Polygonum amphibium, I : 73.

— , Les collections éthologiques au Jardin Botanique de l'État, I : 217.

— , La collection phylogénique au Jardin Botanique de l'État, I : 403.

— , Comment les jeunes feuilles se protègent contre les intempéries, I : 181.

— , Comment les plantes vivaces maintiennent leur niveau souterrain, I : 113.

— , Comment les plantes vivaces sortent de terre au printemps, I : 143.

— , Un jardin botanique pour les écoles moyennes, I : 1.

— , Les muscinées du littoral belge. — Compte rendu d'une herborisation faite, les 1er et 2 novembre 1904, à Westende et Coxyde, I : 387.

— , Notice sur la serre des plantes grasses au Jardin Botanique de l'État, I : 355.

— , Recherches sur les organismes inférieurs. VI. Considérations théoriques sur l'origine polyphylétique des modes d'alimentation, de la sexualité et de la mortalité chez les organismes inférieurs, I : 325.

— , Sur la pollination sans fécondation, I : 89.

MATTIROLO, O., Un nouveau champignon hypogé du Congo belge, VIII : 23.

— , Sertulum Fungorum congoensium, IX : 95, 1 fig.

MELVILLE, R., The elms of the Dumortier Herbarium, XXI : 347.

MICHOTTE, D. (STANER, P. et), Révision des espèces congolaises du genre Strophanthus P. DC., XIII : 23.

MIÈGE, J. (KEAY, R. W. J. et), Neostachyanthus occidentalis KEAY et MIÈGE. Nouvelle espèce d'Icacinacée d'Afrique occidentale, XXV : 271, fig. 47-51.

MILDBRAED, J., Neue und seltene Acanthaceen aus dem Oestlichen belgischen Kongo, XIV : 353.

MILNE-REDHEAD, E., A new species of Otiophora from central Africa, XVIII : 103.

— , A new Zornia from tropical Africa (Leguminosae-Papilionaceae-Hedysareae), XXIV : 127.

Mörzer Bruijns, M. P., Lawalrée, A., Schimmel, H. en Demaret, F., Vegetatieonderzoek van het Zwin in 1951-1952, XXIII : 81, fig. 10-22.

Mosseray, R., Esquisse des groupements végétaux de quelques bois du district hesbayen de Belgique, XV : 173, 4 fig. et 1 pl.

— , Matériaux pour une Flore de Belgique. — V. Genre Senecio, XIV : 57, pl. 1.

— , Matériaux pour une Flore de Belgique. — VI. Genres Bidens et Galinsoga, XIV : 313, fig. 24-25.

— , Note sur quelques formes de Papaver dubium, XVIII : 293.

— , Sur l'existence du Quercus pedunculata Ehrh. dans les alluvions de la Nèthe, XIII : 57.

Normand, D., Note sur les bois d'Enantia (Annonacées), IX : 317, pl. IV.

— , Note sur les bois de Guibourtia Arnoldiana et de Copaifera religiosa du Mayumbe, XX : 19, pl. I et II.

Normand, D. et Cavaco, A., Observations taxonomiques et xylologiques sur le genre Pinacopodium Exell et Mendonça, XXI : 451, pl. IX-X, fig. 117.

Petit, E., A propos de « Mussaenda stenocarpa » Hiern (Rubiaceae), XXIV : 339, pl. VII.

— , Les Mussaenda L. (Rubiaceae) du Congo belge, XXV : 149.

— , Polygalaceae nouvelles du Congo belge, XXV : 333.

Petit, E. (Robyns, W. et), Note supplémentaire sur Oxygonum Burch. et sur les espèces congolaises de ce genre, XXIV : 1.

Petit, E. (Troupin, G. et), Pseudomussaenda Wernham au Congo belge, XXIII : 227.

Pichon, M., Classification des Apocynacées : XXXIV. Les Malouetiinae d'Afrique, XXII : 115, pl. I, fig. 9.

— , Classification des Apocynacées : XXXVII. Une espèce nouvelle du genre Hunteria, XXIII : 391, fig. 38.

— , Classification des Apocynacées : XXXVIII. Révision du genre Oncinotis Benth., XXIV : 9, pl. I-II, fig. 1-2.

— , Classification des Apocynacées : XXXIX. Révision du genre Alafia Thou., XXIV : 129, pl. III-VI, fig. 15-20.

— , Extension au Congo belge de l'aire de quelques Apocynacées, XX : 107.

Potier de la Varde, R., Oligotrichum africanum P. de la Varde, sp. nov., XXIV : 235, fig. 22.

Potier de la Varde, R. (Demaret, F. et), Deux Hookeriaceae nouvelles du Ruwenzori (Congo belge), XXV : 353, pl. IX-X.

— , Les espèces africaines du genre Cyclodictyon Mitt., XXI : 11, fig. 1-22.

Raymond-Hamet, Sur le Kalanchoë rhombopilosa Mannoni et Boiteau, XXIV : 329, fig. 23-24.

— , Sur quelques espèces du genre Kalanchoë du Congo belge, XIX : 437, fig. 40.

Robyns, A., Essai d'étude systématique et écologique des Centaurium de Belgique, XXIV : 349, pl. VIII-XI, fig. 25-32.

Robyns, W., G. A. Boulenger, (1858-1937). Sa vie et son œuvre rhodologique, XV : 1, avec portrait et 1 fig.

— , Choripétales nouvelles de la région du Parc National Albert (Congo belge), XVIII : 261.

— , Le concept des Phytocénoses biotiques principalement dans les régions intertropicales, XVI : 413.

— , Contribution à l'étude des Graminées du Congo belge et du Ruanda-Urundi, VIII : 209.

— , Contribution à l'étude des Graminées du Congo belge et du Ruanda-Urundi, II. Panicées, IX : 171, pl. III.

— , Contribution à l'étude des Graminées du Congo belge, III. Pennisetum Rich., XIII : 1.

— , Contribution à l'étude des Graminées du Congo belge et du Ruanda-Urundi, IV. Schizachyrium kwiluense Vanderyst, XIV : 93.

— , Emile De Wildeman (1866-1947), XIX : 1, avec portrait.

— , Une Flore générale de Belgique, XXI : 1.

— , Une Flore du Congo belge et du Ruanda-Urundi, XIX : 231.

— , A new species of Vangueriopsis Robyns from Liberia, XXII : 319, fig. 34.

— , Note sur le genre Platostoma P. Beauv. (Labiatae-Ocimoideae), XVII : 15, fig. 3-5.

— , Note sur le Xylia Ghesquierei Robyns, XVI : 253, pl. XIV, fig. 14.

— , Note sur Oxygonum Burch. et sur les espèces congolaises de ce genre, XVII : 157.

— , Un nouveau genre de Labiatae-Ocimoideae de l'Afrique tropicale centrale, XVII : 27, pl. I.

— Raoul Mosseray (1908-1940). XVI : 1, avec portrait.

Robyns, W., Statistiques de nos connaissances sur les Spermatophytes du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, XVIII : 133.
— , Sur l'existence du Juniperus procera Hochst. au Congo belge, XVIII : 125, 1 fig.
— , Sympétales nouvelles de la région du Parc National Albert (Congo belge), XVII : 65.
— , Tentamen Monographiae Vangueriae generumque affinium, XI : 1, 36 fig.
Robyns, W. et Boutique, R., Une espèce nouvelle de Clitandra du Parc National Albert (Congo belge), XVIII : 259.
— , Révision des Phaseoleae-Galactieae du Congo belge, XVIII : 67, 2 fig.
— , Sedum Churchillianum. Espèce nouvelle du Parc National Albert (Congo belge), XVII : 313, fig. 25.
Robyns, W. et Ghesquière, J., Révision du genre Enantia Oliv. (Annonacées), IX : 303.
Robyns, W. et Lamb, S. H., Preliminary ecological survey of the Island of Hawaii, XV : 241, 34 fig.
Robyns, W. et Lawalrée, A., Révision des espèces congolaises du genre Thesium L., XVII : 135.
— , Trois Thesium nouveaux du Congo belge, XX : 157.
Robyns, W. et Lebrun, J., Essai d'une monographie du genre Tinnea, VIII : 161.
Robyns, W. et Petit, E., Note supplémentaire sur Oxygonum Burch. et sur les espèces congolaises de ce genre, XXIV : 1.
Robyns, W. et Tournay, R., Une espèce nouvelle de Hippocratea du Parc National Albert (Congo belge), XIX : 89.
— , Essai de révision du genre Arisaema Mart. (Araceae) en Afrique tropicale, XXV : 395.
— , Monocotylées nouvelles ou critiques de la région du Parc National Albert (Congo belge), XXV : 239, fig. 46.
Robyns, W. et Van der Veken, P., Digitariae novae congolanae africanaeque, XXII : 143, fig. 11-14.
Robyns, W. et Wilczek, R., Contribution à l'étude du genre Beilschmiedia de l'Afrique tropicale, XX : 197, fig. 21.
— , Contribution à l'étude des Lauracées du Congo belge et de l'Afrique tropicale, XIX : 457, fig. 42-49.

Schimmel, H. (Mörzer Bruijns, M. F., Lawalrée, A., Demaret, F. en), Vegetatieonderzoek van het Zwin in 1951-1952, XXIII : 81, fig. 10-22.

Schubert, B. G., Notes on Desmodium and Droogmansia in the Belgian Congo, XXII : 287, fig. 33.

Sherff, E. E., Novelties in Bidens and Coreopsis from Belgian Congo and central Africa, XIII : 285.

Staner, P., Un genre nouveau de Gesnériacées du Congo belge, XIII : 7.

— , Les Guttifères de la Flore du Congo belge, XIII : 61, pl. 1 et 1 fig.

— , Les Méliacées du Congo belge, XVI : 109, pl. I-XIII, fig. 1-13.

— , Révision des espèces congolaises du genre Acalypha L., XV : 132.

— , Révision des espèces congolaises des genres Cycnium et Rhamphicarpa (Scrophulariacées), XV : 147.

— , Révision des espèces congolaises du genre Tetracera L., XV : 295.

— , Révision des Renonculacées du Congo belge, XV : 307, 1 pl.

— , Révision des Rhamnacées du Congo belge, XV : 393, fig. 45-60.

— , Les Thyméléacées de la Flore du Congo belge, XIII : 321, 14 fig.

Staner, P. (Humbert, H. et) Observations critiques sur quelques Composées du Congo belge, XIV : 99, pl. IV-V.

Staner, P. et Léonard, J., Notulae Systematicae V. — Thalictrum africains (Ranunculaceae), XIX : 449, fig. 41.

Staner, P. et Michotte, D., Révision des espèces congolaises du genre Strophanthus P. DC., XIII : 23.

Stebbins, G. L., Two new species of Lactuca from Tropical Africa, XIV : 223, fig. 19.

— , The scandent species of Prenanthes and Lactuca in Africa, XIV : 333, pl. VI-VIII.

Steyaert, R. L., Contribution à l'étude monographique de Pestalotia De Not. et Monochaetia Sacc. (Truncatella gen. nov. et Pestalotiopsis gen. nov.), XIX : 285, pl. VII-XVII, fig. 24-28.

— , Contribution à l'étude des Pestalotia du Congo belge, XIX : 173, pl. III-VI.

— , Description de Cassia nouveaux pour la flore du Congo belge, XXI : 357, fig. 99-100.

— , Description de Sida nouveaux du Congo belge (Malvaceae), XXII : 105.

Steyaert, R. L., Note sur des Cassia africains et asiatiques de la section Chamaecrista avec description de nouvelles espèces, XX : 233, pl. VIII-X, fig. 23-26.
— , Quelques Pestalotia de la Flore belge, XIX : 65, pl. I-II.
— , Pestalotia, Pestalotiopsis et Truncatella, XXV : 191.
Suessenguth, K., Afrikanische Amaranthaceen aus dem Herbarium Brüssel, XV : 55.

Taton, A., Nouveaux Drosera du Congo belge, XVII : 307.
— , Ophioglossum Louisii Taton sp. nov. — Épiphyte remarquable de la forêt équatoriale congolaise, XVII : 117, pl. II.
Tournay, R. (Robyns, W. et), Une espèce nouvelle de Hippocratea du Parc National Albert (Congo belge), XIX : 89.
— , Essai de révision du genre Arisaema Mart. (Araceae) en Afrique tropicale, XXV : 395.
— , Monocotylées nouvelles ou critiques de la région du Parc National Albert (Congo belge), XXV : 239, fig. 46.
Toussaint, L., Papilionacées nouvelles du Congo belge, XXIII : 279.
Troupin, G., Contribution à l'étude des Ménispermacées africaines. I. — XIX : 409, pl. XVIII-XIX.
— , Contribution à l'étude des Ménispermacées africaines. III. — XXV : 131.
— , Contribution à l'étude systématique de Berlinia Soland. et genres voisins — (Caesalpiniaceae-Amherstieae), XX : 285, fig. 29-30.
— , Plantae africanae I. — (Myristicaceae-Connaraceae), XXI : 141, fig. 37-38.
— , Quelques Polygala nouveaux du Congo belge, XIX : 205.
— , Plantae africanae II. — (Connaraceae), XXI : 365.
— , Plantae africanae III. — (Aponogetonaceae) (Nouvelle famille pour le Congo belge), XXIII : 223.
— , Plantae africanae IV. — (Monocotyledoneae), XXV : 221, fig. 45.
— , Plantae africanae V. — Notes sur le genre Kaempferia L. au Congo belge (Zingiberaceae), XXV : 265.
— , Révision des espèces congolaises du genre Alectra Thunb. (Scrophulariaceae), XIX : 271.
Troupin, G. (Boutique, R. et), Theaceae. Famille nouvelle pour la Flore du Congo belge, XX : 61, fig. 8-10.

Troupin, G. (Léonard, J. et), Observations sur le genre Okoubaka Pellegr. et Normand (Octoknemaceae), XX : 11, fig. 4.
Troupin, G. et Petit, E., Pseudomussaenda Wernham au Congo belge, XXIII : 227.

Van Aerdschot, P., Catalogue de la Bibliothèque collective réunie au Jardin Botanique de l'État à Bruxelles, III : 1.
— , Notes sur la Bibliothèque collective du Jardin Botanique de l'État, IX : 99.
Vanden Berghen, C., Contribution à l'étude des bas-marais de Belgique, XXII : 1, fig. 1-5.
— , Contribution à l'étude des espèces africaines du genre Brachiolejeunea (Spruce) Schiffn., XXI : 87, fig. 30-31.
— , Contribution à l'étude des espèces africaines du genre Ceratolejeunea (Spruce) Schiffn., XXI : 61, fig. 23-28.
— , Contribution à l'étude des espèces africaines du genre Lopholejeunea (Spruce) Schiffn., XX : 161, fig. 16-20.
— , Contribution à l'étude des espèces africaines du genre Mastigolejeunea (Spruce) Schiffn., XIX : 371, fig. 31-33.
— , Contribution à l'étude des espèces africaines du genre Metzgeria, XIX : 187, fig. 18-20.
— , Le genre Leptolejeunea (Spruce) Schiffn. en Afrique continentale, XXIII : 65, fig. 6-8.
— , Le genre Marchantia L. au Congo belge, XXIV : 37, fig. 3-7.
— , Le genre Stictolejeunea (Spruce) Schiffn. en Afrique, XX : 15, fig. 5.
— , Note sur le genre Ptychocoleus Trev. en Afrique tropicale, XIX : 37, fig. 1-4.
— , Notes sur quelques Lejeunéacées de l'Afrique continentale, XXII : 165, fig. 17-19.
— , Note sur Sprucella succida (Mitt.) Steph. au Congo belge, XVIII : 89, 1 fig.
Vanden Berghen, C. (Demaret, F. et), Frullania Arecae (Spreng.) Gottsche et F. Ecklonii (Spreng.) Gottsche et Lindenb., XIX : 73, fig. 5.
— , Frullania capensis Gottsche et les espèces confondues avec lui, XVIII : 117, 3 fig.
— , Révision de quelques espèces africaines du genre Frullania, XVIII : 231, 3 fig.
— , Révision des espèces africaines du genre Frullania Raddi, sous-genre Meteoriopsis Spruce, XX : 1, fig. 1-3.

Van den Broeck, H., Les Muscinées de l'Herbier belge du Jardin Botanique de l'État à Bruxelles, IV : 243.

Van der Veken, P., Graminées nouvelles ou peu connues de l'Afrique centrale, XXV : 325, fig. 55-56.

— , Sur l'identité de l'Ichnanthus Dewildemani Vanderyst (Gramineae), XXIV : 399, fig. 33-34.

— , Trois taxa nouveaux de Cypéracées du Congo belge, XXV : 143, fig. 38-39.

Van der Veken, P. (Robyns, W. et), Digitariae novae congolanae africanaeque, XXII : 143, fig. 11-14.

Van Meel, L., Sur la répartition du genre Batrachospermum en Belgique, XV : 319, 1 fig. et 1 pl.

Van Meel, L., Sur la répartition du genre Batrachospermum en Belgique II, XVII : 49.

Verdcourt, B., A revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae. I. — The genus Pentanisia Harvey, XXII : 233, fig. 27-32.

— , A revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae, II. — The genus Otomeria Benth. and the new genus Batopedina Verdcourt, XXIII : 5, fig. 2-3.

— , A revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae, III. — The genus Virectaria Brem., XXIII : 35, fig. 4-5.

— , A revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae, IV. — Notes on the genera Parapentas Brem., Tapinopentas Brem., and Otiophora Zucc., XXIII : 53.

— , A revision of certain african genera of herbaceous Rubiaceae, V. — A revision of the genus Pentas Bentham together with a key to related genera, XXIII : 237, fig. 26-35.

Verplancke, G., Note sur quelques Ascomycètes nouveaux pour la flore belge, XIII : 333.

— , Quelques Champignons nouveaux pour la flore belge, XVI : 9.

Werdermann, E., Uebersicht ueber die aus dem Belgischen Kongo stammenden Arten der Gattung Ceropegia, XV : 222.

— , Deux nouvelles espèces de Caesalpinia du Congo belge, XXI : 83, fig. 29.

Wilczek, R., Une espèce nouvelle de Kaoue Pellegr. du Congo belge, XXI : 353, pl. VII.

— , Le genre Dicranum Hedw. en Belgique, XIX : 91, fig. 7-17.

— , Groupes nouveaux de Phaseoleae-Phaseolinae du Congo belge et du Ruanda-Urundi, XXIV : 405, pl. XII-XIII, fig. 35.

Wilczek, R., Note sur quelques Capparidaceae nouvelles du Congo belge, XX : 181.
— , Note sur quelques Mousses rares de Pologne, XVIII : 83.
— , Novitates Africanae. I. — (Malpighiaceae et Linaceae), XXV : 303, pl. VIII.
— , Papilionaceae Genisteae congolanae novae (Robynsiophyton, Crotalaria, Argyrolobium), XXIII : 125, pl. I-VI, fig. 23-25.
— , Révision des genres Blighia Koenig et Phialodiscus Radlk., XXI : 149, fig. 39-41.
Wilczek, R. (Robyns, W. et), Contribution à l'étude des Lauracées du Congo belge et de l'Afrique tropicale, XIX : 457, fig. 42-49.
— , Contribution à l'étude du genre Beilschmiedia de l'Afrique tropicale, XX : 197, fig. 21.
Wouters, W., Au sujet du spécimen-type de Gossypium obtusifolium Roxb., XVII : 245, pl. III, fig. 19.

Table alphabétique des taxa nouveaux et combinaisons nouvelles
Alphabetische tafel van de nieuwe taxa en nieuwe combinaties

Abrus suffruticosus Boutique sp. nov., XXV : 127.
Abutilon asiaticum (L.) Don var. lobulatum Robyns et Lawalrée var. nov., XVIII : 273.
— indicum Sweet var. Wittei Hochr. var. nov., XVIII : 274.
Acacia nilotica (L.) Del. var. tomentosa (Benth.) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 196.
— Seyal Delile f. fistula (Schwfth) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 202.
— silvicola Gilbert et Boutique sp. nov., XXII : 179.
— Van-Meelii Gilbert et Boutique sp. nov., XXII : 177.
Acalypha Bequaertii Staner sp. nov., XV : 141.
— deltoidea Robyns et Lawalrée sp. nov., XVIII : 267.
Acanthus Flamandi De Wild. sp. nov., IV : 427.
— Vandermeireni De Wild. sp. nov., IV : 428.
Achyranthes aspera L. f. nigrescens Suessenguth f. nov., XV : 56.
— aspera L. f. rubella Suessenguth f. nov., XV : 56.
— Schinzii (Standl.) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 73.
Acioa Brazzai De Wild. sp. nov., VII : 202.
— Chevalieri De Wild. sp. nov., VII : 213.
— cinerea Engl. ex De Wild. sp. nov., VII : 211.
— dichotoma De Wild. sp. nov., VII : 216.
— eketensis De Wild. sp. nov., VII : 214.
— hirsuta A. Chev. ex De Wild. sp. nov., VII : 200.
— Icondere Baill. var. Welwitschii De Wild. var. nov., VII : 195.
— Klaineana Pierre ex De Wild. sp. nov., VII : 196.
— laevis Pierre ex De Wild. sp. nov., VII : 205.
— Lujai De Wild. sp. nov., VII : 209.

Acioa Pierrei De Wild. sp. nov., VII : 212.
— Reygaerti De Wild. sp. nov., VII : 201.
— Rudatisi De Wild. sp. nov., VII : 215.
— Sapini De Wild. sp. nov., IV : 80.
— Stapfiana De Wild. sp. nov., VII : 204.
— Tholloni De Wild. sp. nov., VII : 208.
— Unwini De Wild. sp. nov., VII : 198.
Acridocarpus longifolius (G. Don.) Hook. f. f. brevialata R. Wilczek f. nov., XXV : 307.
— Vanderystii R. Wilczek sp. nov., XXV : 306.
Acrospira breviscapa De Wild. sp. nov., V : 3.
— Homblei De Wild. sp. nov., V : 4.
Adenia Bequaertii Robyns et Lawalrée sp. nov., XVIII : 284.
Adenodolichos brevipetiolatus Wilczek sp. nov., XXIV : 443.
— caeruleus Wilczek sp. nov., XXIV : 449.
— katangensis Wilczek sp. nov., XXIV : 445.
— oblongifoliolatus Wilczek sp. nov., XXIV : 448.
— rhomboideus (O. Hoffm.) Harms var. kundelunguensis Wilczek var. nov., XXIV : 443.
— rhomboideus (O. Hoffm.) Harms var. lanceolatus Wilczek var. nov., XXIV : 443.
— salvifoliolatus Wilczek sp. nov., XXIV : 446.
— upembaensis Wilczek sp. nov., XXIV : 447.
Adenopus diversifolius Cogn. sp. nov., V : 113.
— multiflorus Cogn. sp. nov., V : 112.
Adiantum tetraphyllum (H. B.) Willd. var. Vogelii (Mett.) R. Bonaparte comb. nov., IV : 35.
Adinandra intermedia Boutique et Toupin sp. nov., XX : 62.
Aeonium leucoblepharum Webb ap. Rich. var. glandulosum (Chiov.) Cuf. comb. nov., XXIV : suppl. 165.
Aërangis compta Summerhayes sp. nov., XXV : 259.
Aerva lanata Juss. var. intermedia Suessenguth var. nov., XV : 57.
— lanata Juss. var. leucuroides Suessenguth var. nov., XV : 57.
— persica (Burm. f.) Merrill var. latifolia (Vahl) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 69.
Aeschynomene L. subgen. Aeschynomene J. Léonard subgen. nov., XXIV : 63.
— subgen. Bakerophyton J. Léonard subgen. nov., XXIV : 83.
— subgen. Ochopodium (Vogel) J. Léonard comb. nov., XXIV : 84.

Aeschynomene L. subgen. Ruppellia (A. Rich.) J. Léonard comb. nov., XXIV : 69.
— subgen. Ruppellia (A. Rich.) J. Léonard sect. Basiadhaerentes J. Léonard sect. nov. XXIV : 70.
— subgen. Ruppellia (A. Rich.) J. Léonard sect. J. Liberae J. Léonard, sect. nov., XXIV : 69.
— subgen. Ruppellia (A. Rich.) J. Léonard sect. Marginulatae (Harms) J. Léonard comb. nov., XXIV : 70.
— subgen. Ruppellia (A. Rich.) J. Léonard sect. Samaroideae J. Léonard sect. nov., XXIV : 82.
— afraspera J. Léonard sp. nov., XXIV : 64.
— Bullockii J. Léonard sp. nov., XXIV : 71.
— Bullockii J. Léonard var. volubilis J. Léonard var. nov., XXIV : 73.
— cristata Vatke var. pubescens J. Léonard var. nov., XXIV : 67.
— glabrescens Welw. ex Bak. var. pubescens J. Léonard var. nov., XXIV : 82.
— leptophylla Harms subsp. magnifoliolata J. Léonard subsp. nov., XXIV : 83.
— mossoensis J. Léonard sp. nov., XXIV : 79.
— mossoensis J. Léonard var. pubescens J. Léonard var. nov., XXIV : 81.
— pararubrofarinacea J. Léonard sp. nov., XXIV : 73.
— pygmaea Welw. ex Bak. var. hebecarpa J. Léonard var. nov., XXIV : 75.
— rubroviolacea J. Léonard sp. nov., XXIV : 81.
— solitariiflora J. Léonard sp. nov., XXIV : 70.
— upembensis J. Léonard sp. nov., XXIV : 78.

Afroguatteria Boutique gen. nov., XXI : 104.
— Bequaertii (De Wild.) Boutique comb. nov., XXI : 106.

Agelaea Claessensii De Wild. sp. nov., III : 256.
— hirsuta De Wild. var. likimensis De Wild. var. nov., III : 257.
— hirsuta De Wild. var. Malchairi De Wild. var. nov., III : 257.
— katangensis Troupin sp. nov., XXI : 366.
— kivuensis Troupin sp. nov., XXI : 367.

Ajuga alba (Gürke) Robyns comb. et sp. nov., XVII : 66.

Alafia Thou. ser. Barbatae M. Pichon ser. nov., XXIV : 178.
— — ser. Conicae M. Pichon ser. nov., XXIV : 169.
— — ser. Digitiformes M. Pichon ser. nov., XXIV : 158.
— — ser. Fusiformes M. Pichon ser. nov., XXIV : 187.

Alafia Thou. ser. Glabrifauces M. Pichon ser. nov., XXIV : 205.
— — ser. Grandiflorae M. Pichon ser. nov., XXIV : 200.
— — ser. Madagascarienses M. Pichon ser. nov., XXIV : 142.
— — ser. Micranthae M. Pichon ser. nov., XXIV : 167.
— — ser. Oliganthae M. Pichon ser. nov., XXIV : 218.
— — ser. Puberulae M. Pichon ser. nov., XXIV : 195.
— Benthami (Baill.) Stapf var. mediafra M. Pichon var. nov., XXIV : 193.
— congolana M. Pichon sp. nov., XXIV : 195.
— glabriflora M. Pichon sp. nov., XXIV : 173.
— insularis M. Pichon sp. nov., XXIV : 149.
— nigrescens M. Pichon sp. nov., XXIV : 148.
— ugandensis M. Pichon sp. nov., XXIV : 179.
— vallium M. Pichon sp. nov., XXIV : 201.
— Vermeuleni De Wild. sp. nov., V : 411.
— Verschuereni De Wild. sp. nov., V : 101.
Albizzia Gillardinii Gilbert et Boutique sp. nov., XXII : 178.
— obliquifoliolata De Wild. sp. nov., VII : 253.
— Welwitschii Oliv. var. pedicellata Gilbert et Boutique var. nov., XXII : 182.
Albuca angustibracteata De Wild. sp. nov., III : 272.
— Homblei De Wild. sp. nov., IV : 427.
— nigritana (Baker) Troupin comb. nov., XXV : 231.
— Sereti De Wild. sp. nov., III : 272.
Alchemilla aberdarensis De Wild. sp. nov., VII : 363.
— abyssinica Fresen. f. muscoidea Haum. et Balle f. nov. XIV : 26.
— affinis De Wild. sp. nov., VI : 211.
— Alluaudi De Wild. sp. nov., VII : 364.
— Bakeri De Wild. sp. nov., VII : 344.
— Baroni De Wild. sp. nov., VII : 321.
— Bequaerti De Wild. sp. nov., VI : 213.
— Bolusi De Wild. sp. nov., VII : 366.
— Brownei De Wild. sp. nov., VII : 367.
— butaguensis De Wild. sp. nov., VI : 214.
— Chevalieri De Wild. sp. nov., VII : 379.
— chillaloensis (Haum. et Balle) Haum. et Balle stat. nov., XIV : 29.
— dubia De Wild. sp. nov., VI : 215.
— emarginata De Wild. sp. nov., VI : 216.

Alchemilla geranioides Rolfe var. major De Wild. var. nov., VII : 371.
— Gerrardi De Wild. sp. nov., VII : 346.
— Gerrardi De Wild. var. hirsuto-petiolata De Wild. var. nov., VII : 347.
— Hendrickxii Hauman et Balle sp. nov., XXII : 87.
— Hildebrandtii Engl. var. hypoleuca Haum. et Balle var. nov., XIV : 40.
— Humberti De Wild. sp. nov., VII : 326.
— Johnstonii Oliv. var. crenato-stipulata De Wild. var. nov., VII : 374.
— keniensis Baker ex De Wild. sp. nov., VI : 217.
— Lecomtei De Wild. sp. nov., VII : 328.
— microphylla De Wild. sp. nov., VI : 218.
— mukuluensis De Wild. sp. nov., VII : 351.
— nyikensis De Wild. sp. nov., VII : 376.
— Perrieri De Wild. sp. nov., VII : 332.
— Perrieri De Wild. var. glabra De Wild. var. nov., VII : 333.
— Rutenbergii O. Hoffm. var. iratsyensis Haum. et Balle var. nov., XIV : 45.
— Rutenbergii O. Hoffm. var. Perrieri (De Wild.) Haum. et Balle stat nov., XIX : 45.
— Rutenbergii O. Hoffm. var. Perrieri (De Wild.) Haum. et Balle f. robusta Haum. et Balle f. nov., XIV : 45.
— subreniformis De Wild. sp. nov., VII : 383.
— Viguieri De Wild. sp. nov., VII : 337.
— Volkensii Engl. var. bracteata De Wild. var. nov., VII : 354.
— Volkensii Engl. var. penicillata De Wild. var. nov., VII : 356.
Alectra congolensis Troupin sp. nov., XIX : 277.
Allanblackia Marienii Staner sp. nov., XIII : 110.
Alloteropsis Homblei Robyns sp. nov., IX : 172.
Alsodeia bondoensis De Wild. nom. nov., VI : 152.
— Brieyi De Wild. nom. nov., VI : 154.
— Claessensi De Wild. nom. nov., VI : 156.
— congensis (Engl.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 34.
— Dewevrei (Engl.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 34.
— dubia De Wild. nom. nov., VI : 160.
— Dupuisii (Engl.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 34.
— Gilleti De Wild. nom. nov., VI : 162.
— Giorgii De Wild. nom. nov., VI : 164.
— Kerkhoveni De Wild. nom. nov., VI : 167.

Alsodeia bondoensis De Wild. nom nov., VI : 169.
— Laurenti De Wild. nom. nov., VI : 170.
— longifolia De Wild. nom. nov., VI : 173.
— Lujai De Wild. nom. nov., VI : 174.
— moandensis De Wild. nom. nov., VI : 176.
— pallidiviridis De Wild. nom. nov., VI : 179.
— pallidiviridis De Wild. var. lembaensis De Wild. nom. nov., VI : 181.
— Poggei (Engl.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 35.
— Sapini De Wild. nom. nov., VI : 182.
— seleensis De Wild. nom. nov., VI : 183.
— Sereti De Wild. nom. nov., VI : 185.
— subglandulosa De Wild. nom. nov., VI : 187.
— variifolia De Wild. nom. nov., VI : 189.
— Verschuereni De Wild. nom. nov., VI : 190.
Alsodeiopsis Laurentii De Wild. sp. nov., III : 268.
Alternanthera macrorhiza Hauman sp. nov., XVIII : 114.
— maritima St. Hil. var. africana Hauman var. nov., XVIII : 115.
Alysicarpus glumaceus (Vahl) DC. subsp. hispidicarpus (Fiori) J. Léonard comb. nov., XXIV : 101.
— glumaceus (Vahl) DC. subsp. hispidicarpus (Fiori) J. Léonard var. patulopedicellatus J. Léonard var. nov., XXIV : 102.
— ovalifolius (Schumach.) J. Léonard comb. nov., XXIV : 88.
— rugosus (Willd.) DC. subsp. perennirufus J. Léonard subsp. nov., XXIV : 95.
— rugosus (Willd.) DC. var. ludens Wallich ex Baker f. pilosulus (Chiov.) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 303.
Amanita Loosii Beeli sp. nov., XIV : 90.
Amanitopsis pudica Beeli sp. nov., XIV : 90.
Ampelocissus Elisabethvilleana De Wild. sp. nov., IV : 365.
— Malchairi De Wild. sp. nov., IV : 365.
— venenosa De Wild. sp. nov., IV : 364.
— Verschuereni De Wild. sp. nov., IV : 366.
Amphinomia laxa (Eckl. et Zeyh.) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 227.
— platycarpa (Viv.) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 227.
— platycarpa (Viv.) Cuf. var. abyssinica (Hochst. ex Rich.) Cuf. comb. nov., XXV : 227.
Anacolosa uncifera Louis et Boutique sp. nov., XVIII : 256.
Ancistrophyllum Laurenti De Wild. sp. nov., V : 148.
Ancylanthus lactiflorus (Welw.) Robyns comb. nov., XI : 325.

Ancylanthus Rogersii (Wernw.) Robyns comb. nov., XI : 326.
Andreaea rupestris Hedw. var. alpestris (Thed.) Demaret comb. nov., XVII : 322.
— rupestris Hedw. var. robusta (Br. et Schpr) Demaret comb. nov., XVII : 322.
— rupestris Hedw. var. sylvicola (Schpr) Demaret comb. nov., XVII : 322.
Andropogon acutispathaceus De Wild. nom. nov., VI : 7.
— argenteo-pilosus De Wild. sp. nov., VI : 26.
— Bavicchii De Wild. sp. nov., VI : 28.
— Bequaerti De Wild. nom. nov., VI : 8.
— Brieyi De Wild. sp. nov., VI : 29.
— Dewevrei De Wild. sp. nov., VI : 32.
— emarginatus De Wild. sp. nov., VI : 33.
— Homblei De Wild. sp. nov., VI : 35.
— kapandensis De Wild. nom. nov., VI : 13.
— luembensis De Wild. nom. nov., VI : 14.
— modicus De Wild. nom. nov., VI : 16.
— pilosovaginatus De Wild. nom. nov., VI : 17.
— Ringoeti De Wild. sp. nov., VI : 36.
— scabrimarginatus De Wild. nom. nov., VI : 20.
— Scaettai Robyns sp. nov., VIII : 223.
— subcordatifolius De Wild. nom. nov., VI : 23.
— Vanderysti De Wild. nom. nov., VI : 24.
Aneilema affinis De Wild. sp. nov., V : 83.
— Allardi De Wild. sp. nov., V : 83.
— Mortehani De Wild. sp. nov., V : 84.
— Vankerckhoveni De Wild. sp. nov., V : 85.
Angraecum acutoemarginatum De Wild. sp. nov., V : 181.
— albidorubrum De Wild. sp. nov., V : 180.
— angustifolium De Wild. sp. nov., V : 181.
— Bieleri De Wild. sp. nov., V : 182.
— bokoyense De Wild. sp. nov., V : 182.
— Boonei De Wild. sp. nov., V : 183.
— canaliculatum De Wild. sp. nov., V : 183.
— Claessensi De Wild. sp. nov., V : 184.
— cordatiglandulum De Wild. sp. nov., V : 184.
— deflexicalcaratum De Wild. sp. nov., V : 185.
— ealaense De Wild. sp. nov., V : 185.
— erecto-calcaratum De Wild. sp. nov., V : 186.
— fimbriatipetalum De Wild. sp. nov., V : 186.

Angraecum acutoemarginatum De Wild. sp. nov., V : 186.
— inaequilongum De Wild. sp. nov., V : 187.
— injoloense De Wild. sp. nov., V : 187.
— latibracteatum De Wild. sp. nov., V : 188.
— mpandense De Wild. sp. nov., V : 188.
— Mofakoko De Wild. sp. nov., V : 189.
— nalaense De Wild. sp. nov., V : 189.
— Reygaerti De Wild. sp. nov., V : 190.
— roseocalcaratum De Wild. sp. nov., V : 190.
— sankuruense De Wild. sp. nov., V : 190.
— Sereti De Wild. sp. nov., V : 191.
— Solheidi De Wild. sp. nov., V : 191.
— subcylindrifolium De Wild. sp. nov., V : 192.
— subfalcifolium De Wild. sp. nov., V : 192.
Angylocalyx Boutiqueanus Toussaint sp. nov., XXIII : 380.
Anisocycla cymosa Troupin sp. nov., XIX : 416.
Anisopappus annuus Lawalrée sp. nov., XIX : 220.
Anisothecium varium (Hedw.) Mitt. var. calaminaris (Card.) Demaret comb. nov., XVII : 326.
— varium (Hedw.) Mitt. var. tenuifolium (Bruch) Demaret comb. nov., XVII : 326.
Antephora truncata Robyns sp. nov., IX : 198.
Anthericum Claessensii De Wild. sp. nov., III : 272.
— Hecqii De Wild. sp. nov., III : 277.
— Hockii De Wild. sp. nov., III : 265.
— kapiriense De Wild. sp. nov., V : 4.
— rigidum De Wild. var. breviscapum De Wild. var. nov., V : 5.
— lukiense De Wild. sp. nov., III : 273.
— lukiense De Wild. var. intermedium De Wild. var. nov., III : 273.
— lukiense De Wild. var. kionzoense De Wild. var. nov., III : 273.
— Malchairi De Wild. sp. nov., III : 274.
Anthonotha cladantha (Harms) J. Léonard comb. nov., XXV : 201.
— crassifolia (Baill.) J. Léonard comb. nov., XXV : 202.
— elongata (Hutch.) J. Léonard comb. nov., XXV : 202.
— ernae (Dinklage) J. Léonard comb. nov., XXV : 202.
— explicans (Baill.) J. Léonard comb. nov., XXV : 202.
— ferruginea (Harms) J. Léonard comb. nov., XXV : 202.
— graciliflora (Harms) J. Léonard comb. nov., XXV : 202.
— isopetala (Harms) J. Léonard comb. nov., XXV : 202.

Anthonotha lamprophylla (Harms) J. Léonard comb. nov., XXV : 202.
— leptorrhachis (Harms) J. Léonard comb. nov., XXV : 202.
— nigerica (Bak. f.) J. Léonard comb. nov., XXV : 202.
— obanensis (Bak. f.) J. Léonard comb. nov., XXV : 203.
— stipulacea (Benth.) J. Léonard comb. nov., XXV : 203.
— trunciflora (Harms) J. Léonard comb. nov., XXV : 203.
— vignei (Hoyle) J. Léonard comb. nov., XXV : 203.
Antidesma meiocarpum J. Léonard sp. nov., XVII : 260.
Aphanocalyx margininervatus J. Léonard sp. nov., XXI : 127.
Aponogeton oblongus Troupin sp. nov., XXIII : 224.
Arctium L. sect. Eglandulosa J. Ar. sect. nov., XX : 74.
— sect. Glandulosa J. Ar. sect. nov., XX : 112.
— batavum J. Ar. hybr. nov., XX : 127.
— Chaberti Briq. et Cav. subsp. Aellenianum J. Ar. subsp. nov., XX : 121.
— Chaberti Briq. et Cav. subsp. balearicum J. Ar. subsp. nov., XX : 122.
— Chaberti Briq. et Cav. subsp. Chaberti J. Ar. subsp. nov., XX : 120.
— Chaberti Briq. et Cav. subsp. corsicum J. Ar. subsp. nov., XX : 121.
— delphinense J. Ar. hybr. nov., XX : 125.
— Lappa L. subsp. majus (Bernh.) J. Ar. comb. nov., XX : 75.
— Lappa L. subsp. platylepis (Boiss. et Bal.) J. Ar. comb. nov., XX : 77.
— minus Bernh. subsp. alpestre J. Ar. subsp. nov., XX : 94.
— minus Bernh. subsp. eu-minus Boswell Syme var. pycnanthum J. Ar. var. nov., XX : 86.
— minus Bernh. subsp. mediterraneum J. Ar. subsp. nov., XX : 108.
— minus Bernh. subsp. mediterraneum J. Ar. var. eumediterraneum J. Ar. var. nov., XX : 108.
— minus Bernh. subsp. mediterraneum J. Ar. var. libanum J. Ar. var. nov., XX : 111.
— minus Bernh. subsp. nemorosum (Lej.) Boswell Syme var. eunemorosum J. Ar. var. nov., XX : 96.
— minus Bernh. subsp. nemorosum (Lej.) Boswell Syme var. orientale J. Ar. var. nov., XX : 105.
— minus Bernh. subsp. pubens (Bak.) J. Ar. comb. nov., XX : 89.
— minus Bernh. subsp. pubens (Bak.) J. Ar. f. albiflora J. Ar. f. nov., XX : 90.

Arctium minus Bernh. subsp. Tchihatchefii J. Ar. subsp. nov., XX : 107.
— tomentosum Mill. f. albiflora J. Ar. f. nov., XX : 116.
— Zalewskii (Dybowski) J. Ar. comb. nov., XX : 128.
Argyrolobium aequinoctiale Welw. ex Bak f. f. elongatum Wilczek f. nov., XXIII : 220.
— Lejeunei Wilczek sp. nov., XXIII : 219.
— Rivae (Harms) Cuf. comb nov., XXV : suppl. 243.
— rufopilosum De Wild. sp. nov., VIII : 127.
Aristida Hocki De Wild. sp. nov., VI : 39.
— Vanderysti De Wild. sp. nov., VI : 40.
Artabotrys Claessensii De Wild. sp. nov., III : 262.
— palustris Louis ex Boutique sp. nov., XXI : 107.
— robustus Louis ex Boutique sp. nov., XXI : 107.
— rufus De Wild. sp. nov., IV : 386.
Arthrosamanea altissima (Hook. f.) Gilbert et Boutique comb. nov., XXII : 182.
— altissima (Hook f.) Gilbert et Boutique var. busiraensis Gilbert et Boutique var. nov., XXII : 183.
— leptophylla (Harms) Gilbert et Boutique comb. nov., XXII : 182.
— leptophylla (Harms) Gilbert et Boutique var. guineensis Gilbert et Boutique var. nov., XXII : 182.
Aspergillus clavatus Desm. var. major Torrend var. nov., IV : 11.
Aspidium cicutarium (L.) Swartz subsp. coadunatum (Wall.) R. Bonaparte comb. nov., IV : 32.
Aspilia tanganyikensis Lawalrée sp. nov., XIX, 222.
Asplenium Breynii Retz. f. Heufleri (Reichardt) Lawalrée comb. nov., XIX : 241.
— Ruta-muraria L. var. Brunfelsii Heufler f. jurassicum Lawalrée f. nov., XIX : 240.
— Scolopendrium L. var. Crepinii Lawalrée var. nov., XIX : 240.
— Scolopendrium L. var. crispum (Willd.) Lawalrée comb. nov., XIX : 240.
— Scolopendrium L. var. dedaleum (Willd.) Lawalrée comb. nov., XIX : 239.
— Scolopendrium L. var. erosum (Kickx) Lawalrée comb. nov., XIX : 240.
— Scolopendrium L. f. cavernarum (Schiffner et Morton) Lawalrée comb. nov., XIX : 239.

Astragalus Bequaerti De Wild. sp. nov., VIII : 126.
— Vogelii (Webb) Hutch. et Dalz. var. congestus (Schwfth) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 290.
Astrochlaena Magisii De Wild. sp. nov., III : 260.
Atopostema Boutique gen. nov., XXI : 121.
— angustifolia Boutique sp. nov., XXI : 122.
— Klainii (Pierre) Boutique comb. nov., XXI : 122.
Atroxima congolana Petit sp. nov., XXV : 336.
Aulacocalyx Lujai De Wild. sp. nov., V : 26.

Baccaurea Lour. sect. Stylaris J. Léonard nom. nov., XVII : 257.
Baikiaea Ghesquiereana J. Léonard sp. nov., XXI : 130.
Baissea Giorgii De Wild. sp. nov., V : 108.
— Malchairi De Wild. sp. nov., V : 107.
— melanocephala (K. Sch.) M. Pichon comb. nov., XXIV : 35.
— Mortehani De Wild. sp. nov., V : 105.
Bambekea Cogn. gen. nov., V : 115.
— racemosa Cogn. sp. nov., V : 116.
Bandeiraea tenuiflora Benth. var. longipetala De Wild. var. nov., IV : 137.
— tenuiflora Benth. var. velutina De Wild. var. nov., IV : 136.
— tenuiflora Benth. var. velutina De Wild. f. cuneata De Wild. f. nov., IV : 137.
— Tesmanni De Wild. sp. nov., IV : 138.
Baphia Boonei De Wild. sp. nov., V : 16.
— Lebrunii Toussaint sp. nov., XXIII : 379.
Barbula tophacea (Brid.) Mitt. f. recurvifolia (Boul.) Demaret comb. nov., XVIII : 335.
Barleria argenteo-calycina De Wild. sp. nov., V : 9.
— grandipetala De Wild. sp. nov., V : 10.
Batopedina Verdcourt gen. nov., XXIII : 29.
— linearifolia (Brem.) Verdcourt comb. nov., XXIII : 29.
— tenuis (A. Chev. ex Hutch. et Dalz.) Verdcourt comb. nov., XXIII : 30.
Batrachium aquatile (L.) Dum. var. caespitosum (DC.) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 111.
Bazzania laxifolia (St.) Demaret comb. nov., XVI : 290.
Beckeropsis uniseta (Nees) Stapf ex Robyns comb. nov., IX : 199.
Begonia Bequaertii Robyns et Lawalrée sp. nov., XVIII : 286.
— Homblei De Wild. sp. nov., V : 51.

Begonia Lebrunii Robyns et Lawalrée sp. nov., XVIII : 285.
— Poggei Warb. var. albiflora Th. et H. Dur. var. nov., II : 234.
— subacuto-alata De Wild. sp. nov., V : 52.
— Vankerckhoveni De Wild. sp. nov., V : 52.
Beilschmiedia Nees subgen. Stemonadenia Robyns et Wilczek subgen. nov., XIX : 463.
— subgen. Stemonadenia Robyns et Wilczek sect. Acrothecon Robyns et Wilczek sect. nov., XIX : 465.
— Nees subgen. Stemonadenia Robyns et Wilczek sect. Hufelandia (Nees) Benth. et Hook. f. subsect. Attenuatae Robyns et Wilczek subsect. nov., XX : 207.
— subgen. Stemonadenia Robyns et Wilczek sect. Hufelandia (Nees) Benth. et Hook. f. subsect. Latae Robyns et Wilczek subsect. nov., XX : 205.
— Nees subgen. Stemonadenia Robyns et Wilczek sect. Hufelandia (Nees) Benth. et Hook. f. subsect. Sessiles Robyns et Wilczek subsect. nov., XX : 210.
— subgen. Synthoradenia Robyns et Wilczek subgen. nov., XIX : 462.
— acuta Kostermans nom. nov., XXII : 137.
— acutifolia (Engl. et Krause) Robyns et Wilczek comb. nov., XX : 203.
— alata Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 476.
— ambigua Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 475.
— anacardioides (Engl. et Krause) Robyns et Wilczek comb. nov., XX : 203.
— auriculata Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 498.
— barensis (Engl. et Krause) Robyns et Wilczek comb. nov., XX : 210.
— batangensis (Engl.) Robyns et Wilczek comb. nov., XX : 212.
— bracteata Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 487.
— Chevalieri Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 486.
— cinnamomea (Stapf) Robyns et Wilczek comb. nov., XIX : 476.
— conferta (S. Moore) Robyns et Wilczek comb. nov., XIX : 496.
— congestiflora (Engl. et Krause) Robyns et Wilczek comb. nov., XX : 205.
— congolana Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 468.
— Corbisieri (Robyns) Robyns et Wilczek comb. nov., XIX : 468.

Beilschmiedia crassifolia (Engl.) Robyns et Wilczek comb. nov., XX : 212.
— crassipes (Engl. et Krause) Robyns et Wilczek comb. nov., XX : 210.
— cuspidata (Krause) Robyns et Wilczek comb. nov., XX : 211.
— Dawei Robyns et Wilczek sp. nov., XX : 204.
— Dinklagei (Engl.) Robyns et Wilczek comb. nov., XIX : 494.
— discolor Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 483.
— diversiflora Pierre ex Robyns et Wilczek sp. nov., XX : 209.
— Donisii Robyns et Wilczek sp. nov., XX : 206.
— euryneura (Stapf) Robyns et Wilczek comb. nov., XIX : 495.
— foliosa (S. Moore) Robyns et Wilczek comb. nov., XIX : 488.
— fulva Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 469.
— Gilbertii Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 504.
— Gilbertii Robyns et Wilczek var. glabra Robyns et Wilczek var. nov., XIX : 506.
— Giorgii Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 496.
— grandibracteata Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 497.
— grandifolia (Engl. ex Stapf) Robyns et Wilczek comb. nov., XIX : 494.
— Hermanii Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 473.
— Hutchinsoniana Robyns et Wilczek nom nov., XIX : 487.
— insularum Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 479.
— jabassensis (Engl. et Krause) Robyns et Wilczek comb. nov., XX : 206.
— Jacques-Felixii Robyns et Wilczek sp. nov., XX : 203.
— Klainei Robyns et Wilczek sp. nov., XX : 207.
— Kostermansiana Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 488.
— Kweo (Mildbr.) Robyns et Wilczek comb. nov., XIX : 494.
— lancifolia (Engl. et Krause) Robyns et Wilczek comb. nov., XX : 202.
— lancilimba Kostermans nom. nov., XXII : 137.
— Lebrunii Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 489.
— Ledermannii (Engl. et Krause) Robyns et Wilczek comb. nov., XX : 210.
— Leemansii Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 500.
— Letouzeyi Robyns et Wilczek sp. nov., XX : 198.
— Louisii Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 470.
— Mannioides Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 481.
— mayumbensis Robyns et Wilczek sp. nov., XX : 201.
— megaphylla Pierre ex Robyns et Wilczek sp. nov., XX : 199.

Beilschmiedia membranacea (Stapf) Robyns et Wilczek comb. nov., XIX : 495.
— membranifolia Kostermans nom. nov., XXII : 138.
— Michelsonii Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 493.
— myrciaefolia (S. Moore) Robyns et Wilczek comb. nov., XIX : 478.
— ndongensis (Engl. et Krause) Robyns et Wilczek comb. nov., XX : 205.
— oblongifolia Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 466.
— olivacea Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 491.
— papyracea (Stapf) Robyns et Wilczek comb. nov., XIX : 495.
— Pierreana Robyns et Wilczek sp. nov., XX : 209.
— Robynsiana Kostermans nom. nov., XXII : 137.
— Schmitzii Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 474.
— Stapfiana Robyns et Wilczek nom. nov., XIX : 479.
— Talbotiae (S. Moore) Robyns et Wilczek comb. nov., XIX : 494.
— Thollonii Robyns et Wilczek sp. nov., XX : 211.
— ugandensis Rendle var. katangensis Robyns et Wilczek var. nov., XIX : 473.
— variabilis Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 501.
— Vermoesenii Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 483.
— versicolor Kostermans nom. nov., XXII : 137.
— yangambiensis Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 485.
— Zahnii (Krause) Robyns et Wilczek comb. nov., XX : 207.
Beirnaertia Louis ex Troupin gen. nov., XIX : 419.
— yangambiensis Louis ex Troupin sp. nov., XIX : 420.
Belmontia Hockii De Wild. sp. nov., III : 266.
— Teuszii Schinz var. angustifolia De Wild. var. nov., III : 279.
Berlinia Soland. sect. Microberlinia (A. Chev.) Troupin comb. nov., XX : 301.
— bifurcata (A. Chev.) Troupin comb. nov., XX : 302.
— brazzavillensis (A. Chev.) Troupin comb. nov., XX : 302.
— Gilletii De Wild. var. Gossweilerii (Baker f.) Troupin comb. nov., XX : 300.
Bidens Grantii (Oliv.) Sherff var. Dawei Sherff var. nov., XIII : 288.
— Grantii (Oliv.) Sherff var. Stapfii Sherff var. nov., XIII : 287.
— Kirkii (O. et H.) Sherff var. flabellata Sherff var. nov., XIII : 287.

Bidens kivuensis Sherff var. armata Sherff var. nov., XIII : 287.
— ruandensis Sherff sp. nov., XIII : 285.
— Steppia (Steetz) Sherff var. Elskensii Sherff var. nov., XIII : 286.
— Uhligii Sherff sp. nov., XII : 286.
Boerhavia coccinea Mill. var. pubescens (Choisy) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 76.
— diffusa L. var. Ehrenbergii (Asch. et Schweth) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 77.
— diffusa L. var. minor (Del.) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 77.
— diffusa L. var. undulata (Asch. et Schweth) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 78.
— diffusa L. var. viscosa (Choisy) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 78.
Boletelloideae Heinemann subfam. nov., XXI : 286.
Boletellus lepidospora Gilbert ex Heinemann, XXI : 293.
— lepidospora Gilbert ex Heinemann var. obscurior Heinemann var. nov., XXI : 295.
— longipes Heinemann sp. nov., XXI : 292.
— purpurascens Heinemann sp. nov., XXI : 298.
— rubroviolaceus Heinemann et Goossens sp. nov., XXI : 296.
Boletochaete calocystis Heinemann et Goossens sp. nov., XXI : 284.
— Goossensii (Beeli) Heinemann comb. nov., XXI : 281.
Boletus congoensis (Beeli) Heinemann comb. nov., XXI : 331.
— loricaceus Beeli sp. nov., XV : 43.
— njalaensis Beeli sp. nov., XV : 43.
Borreria quadrisulcata Brem. sp. nov., XXII : 102.
Boscia praecox Hauman sp. nov., XX : 195.
Brachiaria Bequaertii Robyns sp. nov., IX : 177.
— Bovonei (Chiov.) Robyns comb. nov., IX : 174.
— clavipila (Chiov.) Robyns comb. nov., IX : 179.
— deflexa (Schum.) Hubbard ex Robyns comb. nov., IX : 181.
— Emini (Mez) Robyns comb. nov., IX : 176.
— platynota (K. Schum.) Robyns comb. nov., IX : 174.
— ruziziensis Germain et Evrard sp. nov., XXIII : 373.
— Verdickii Robyns sp. nov., IX : 179.
— Wittei Robyns sp. nov., IX : 180.
—Brachiolejeunea camerunensis Jones et Vanden Berghen sp. nov., XXI : 88.
— rhodesica Vanden Berghen sp. nov., XXI : 94.

Brachymenium latifolium Leroy sp. nov., XVIII : 203.
— perrevolutum Leroy sp. nov., XVIII : 204.
Brachystegia Kennedyi Hoyle sp. nov., XXV : 183.
— Lujai De Wild. sp. nov., VII : 252.
— spiciformis Benth. var. kwangensis Hoyle var. nov., XXI : 361.
— spiciformis Benth. var. Schmitzii Hoyle var. nov., XXI : 362.
Brachystephanus africanus S. Moore var. brevicuspis Mildbr. var. nov., XIV : 359.
Brachythecium velutinum (Hedw.) Br. et Schpr var. validum (C. Jens.) C. Jens. f. uncinatulum Demaret f. nov., XVIII : 98.
Bridelia cathartica Bertol. f. subsp. melanthesoides (Klotzsch) J. Léonard comb. nov., XXV : 364.
— Duvigneaudii J. Léonard sp. nov., XXV : 365.
— grandis Pierre ex Hutch. subsp. puberula J. Léonard subsp. nov., XXV : 369.
— ripicola J. Léonard sp. nov., XXV : 370.
Brillantaisia cicatricosa Lindau var. kivuensis Mildbr. var. nov., XVII : 86.
Bryum Brotherianum Demaret nom. nov., XIX : 355.
— nigerianum Broth. et Par. var. Germainii P. de la V. et Demaret var. nov., XIX : 364.
— pseudolimbatum Leroy sp. nov., XVIII : 173.
Bulbophyllum acutisepalum De Wild. sp. nov., V : 179.
— bambiliense De Wild. sp. nov., V : 174.
— brevidenticulatum De Wild. sp. nov., V : 179.
— Brixhei De Wild. sp. nov., V : 174.
— ealaense De Wild. sp. nov., V : 175.
— injoloense De Wild. sp. nov., V : 175.
— intermedium De Wild. sp. nov., V : 176.
— Jesperseni De Wild. sp. nov., V : 176.
— Sereti De Wild. sp. nov., V : 177.
— Solheidi De Wild. sp. nov., V : 178.
— zobiaense De Wild. sp. nov., V : 178.
Bulbostylis cardiocarpoides Cherm. sp. nov., XIII : 282.
— Vanderystii Cherm. sp. nov., XIII : 283.

Caesalpinia glandulosopedicellata Wilczek sp. nov., XXI : 83.
— Homblei Wilczek sp. nov., XXI : 85.
Callicostella laeviuscula Mitt. var. latifolia (P. de la V.) Demaret et P. de la V. comb. nov., XXII : 357.

Callicostella parvocellulata Demaret et P. de la V. sp. nov., XXII : 342.
— pusilla Broth. ex Demaret et P. de la V. sp. nov., XXII : 343.
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. var. angustifolium (Piré et Card.) Demaret comb. nov., XVII : 368.
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske var. caespitosa (Whit.) Demaret comb. nov., XVII : 368.
— cuspidata (Hedw.) Loeske f. inundata (Lamy) Demaret comb. nov., XVII : 369.
Calvoa Sereti De Wild. sp. nov., V : 81.
Calymperes acanthoneuron P. de la V. sp. nov., XVIII : 167.
— subdiaphanum Leroy sp. nov., XVIII : 165.
Campylium stellatum (Hedw.) J. Lange et C. Jens. f. gracilis (Boul.) Demaret comb. nov., XVII : 362.
Campylopodiella diversifolia Leroy et Thér. sp. nov., XVIII : 200.
Campylopus Germainii Demaret et Leroy sp. nov., XIX : 85.
— homomallus Leroy et Thér. sp. nov., XVIII : 162.
Canthium orthacanthum (Mildbr.) Robyns comb. nov., XI : 334.
— Sapini (De Wild.) Robyns comb. nov., XI : 334.
Capparis Duchesnei De Wild. var. parvifolia Hauman var. nov., XX : 193.
— Duchesnei De Wild. var. Sapinii Hauman var. nov., XX : 194.
— elaeagnoides Gilg var. angustipaniculata Hauman var. nov., XX : 195.
— elaeagnoides Gilg var. longepedicellata Hauman var. nov., XX : 195.
— elaeagnoides Gilg var. zizyphoides (Gilg) Hauman comb. nov., XX : 194.
— lucens Hauman sp. nov., XX : 191.
— pseudocerasifera Hauman sp. nov., XX : 192.
Carduus butaguensis De Wild. sp. nov., VIII : 115.
— lanuriensis De Wild. sp. nov., VIII : 116.
Carissa oppositifolia (Lamk) M. Pichon comb. nov., XXII : 109.
Carlina vulgaris L. var. vulgaris subvar. polycephalos (Gaud.) J. Ar. comb. nov., XXIV : 247.
Carpolobia Delvauxii Petit sp. nov., XXV : 335.
Cassia abbreviata Oliv. var. glabrifructifera Steyaert var. nov., XXI : 357.
— auricoma Grah. var. glabra Ghesq. var. nov., IX : 158.
— capensis Thunb. var. humifusa Ghesq. var. nov., IX : 164.
— capensis Thunb. var. keiensis Steyaert var. nov., XX : 251.

Cassia comosa Vog. var. capricornia Steyaert var. nov., XX : 252.
— comosa Vog. var. lanata Steyaert var. nov., XX : 252.
— Duboisii Steyaert sp. nov., XX : 262.
— falcinella Oliv. var. longifolia Ghesq. var. nov., IX : 163.
— falcinella Oliv. var. parviflora Steyaert var. nov., XX : 251.
— fallacina Chiov. var. gracilior Ghesq. var. nov., IX : 144.
— fallacina Chiov. var. katangensis Ghesq. var. nov., IX : 145.
— gracilior (Ghesq.) Steyaert comb. et sp. nov., XX : 248.
— Hochstetteri Ghesq. sp. nov., IX : 155.
— kalulensis Steyaert sp. nov., XX : 260.
— katangensis (Ghesq.) Steyaert comb. nov., XX : 258.
— katangensis (Ghesq.) Steyaert var. biensis Steyaert var. nov., XX : 260.
— katangensis (Ghesq.) Steyaert var. nuda Steyaert var. nov., XX : 258.
— Kirkii Oliv. var. glabra Steyaert var. nov., XX : 257.
— Kirkii Oliv. var. guineensis Steyaert var. nov., XX : 256.
— Kirkii Oilv. var. Quarrei Ghesq. var. nov., IX : 153.
— Kirkii Oliv. var. velutina Ghesq. var. nov., IX : 152.
— Lechenaultiana DC. var. Wallichiana (DC.) Ghesq. comb. nov., IX : 146.
— Meelii Steyaert sp. nov., XX : 262.
— mimosoides L. var. africana Steyaert var. nov., XX : 247.
— mimosoides L. var. glabriuscula Ghesq. var. nov., IX : 160.
— parva Steyaert sp. nov., XX : 266.
— Quarrei (Ghesq.) Steyaert comb. et sp. nov., XX : 264.
— Robynsiana Ghesq. sp. nov., IX : 149.
— Schmitzii Steyaert sp. nov., XXI : 357.
— sparsa Steyaert sp. nov., XXI : 359.
— Wildemaniana Ghesq. sp. nov., IX : 154.
— Wittei Ghesq. sp. nov., IX : 154.
Cassytha Schliebenii Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 506.
Cavacoa J. Léonard gen. nov., XXV : 320.
— aurea (Cavaco) J. Léonard comb. nov., XXV : 323.
— Baldwinii (Keay et Cavaco) J. Léonard comb. nov., XXV : 324.
— Quintasii Pax et K. Hoffm.) J. Léonard comb. nov. XXV : 322.
Celosia elegantissima Hauman sp. nov., XVIII : 105.
Celtis Prantlii Priem. f. parvifolia Hauman f. nov., XVI : 411.
Centaurea amara L. subsp. amara var. Schrankii (Rouy) J. Ar. comb. nov., XXIV : 305.

Centaurea Scabiosa L. subsp. Scabiosa var. Scabiosa f. albiflora J. Ar. f. nov., XXIV : 314.
Centaurium minus Gars. var. fasciculare (Duby) A. Robyns comb. nov., XXIV : 366.
— minus Gars. var. fasciculare (Duby) A. Robyns f. albiflorum (Magnel) A. Robyns stat. nov. et comb. nov., XXIV : 367.
— minus Gars. var. Jonkerianum A. Robyns var. nov., XXIV : 375.
— minus Gars. f. albiflorum (W. L. Schmidt) A. Robyns comb. nov., XXIV : 365.
— pulchellum (Sw.) Druce var. intermedium (Mérat) Gilmour f. contractum (Wittr. ex Corb.) A. Robyns comb. nov., XXIV : 387.
— pulchellum (Sw.) Druce var. intermedium (Mérat) Gilmour f. palustre (Van Hall) A. Robyns stat. nov. et comb. nov., XXIV : 383.
— vulgare Rafn var. uniflorum (W. L. Schmidt) A. Robyns stat. nov. et comb. nov., XXIV : 374.
Centemopsis myurus Suessenguth sp. nov., XV : 61.
— trinervis Hauman sp. nov., XXII : 72.
Cephaelis Bieleri (De Wild.) Brem. comb. nov., XXII : 103.
Cerastium octandrum Hochst. ex Rich. var. scandens (Engl.) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 94.
Ceratolejeunea beninensis Jones et Vanden Berghen sp. nov., XXI : 63.
— stictophylla Herzog sp. nov., XXI : 81.
Ceratotheca Vanderystii De Wild. sp. nov., III : 256.
Ceropegia Adolfi Schlechter var. gracillima Werd. var. nov., XV : 232.
— aristolochioides Dcne var. Wittei Staner ex Werd. var. nov., XV : 237.
— criniticaulis Werd. sp. nov., XV : 232.
— Lujai De Wild. sp. nov., VII : 28.
— madens Werd. sp. nov., XV : 236.
— Meyeri-Johannis Engl. var. Verdickii (De Wild.) Werd. var. nov., XV : 228.
— Ringoeti De Wild. sp. nov., IV : 394.
— Robynsiana Werd. sp. nov., XV : 238.
— sankuruensis De Wild. sp. nov., VII : 29.
— Vanderysti De Wild. sp. nov., IV : 393.
Chaetostroma arcuatosporum Torrend sp. nov., IV : 14.

Chaetostroma Papayae Torrend sp. nov., IV : 14.
Chasalia cristata (Hiern) Brem. comb. nov., XXII : 104.
Chelidonium majus L. var. pleniflorum Lawalrée var. nov., XXV : 410.
— majus L. var. tenuifolium Retz. f. multifidum (Fast) Lawalrée comb. nov., XXV : 410.
Chenopodium glaucum L. subsp. congolanum Hauman subsp. nov., XIX : 447.
— strictum Roth subsp. striatum (Hayek) Aellen et Iljin var. pseudo-Borbasii (Hayek) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 48.
Chevalierella Dewildemanii (Vanderyst) Van der Veken comb. nov., XXIV : 400.
Chironia transvaalensis Gilg var. longepetiolata De Wild. var. nov., III : 267.
Chloachne oplismenoides (Hack.) Stapf ex Robyns comb. nov., IX : 173.
Chlorophytum ealaense De Wild. sp. nov., III : 274.
— gracile De Wild. sp. nov., III : 274.
— katangense De Wild. sp. nov., III : 277.
— longebracteatum De Wild. sp. nov., III : 275.
— nigrescens De Wild. sp. nov., III : 275.
— ramulosum De Wild. sp. nov., III : 275.
Chrysochloa Hubbardiana Germain et Risopoulos sp. nov., XXII : 71.
Cirriphyllum crassinervium (Tayl.) Loeske et Fleisch. var. auronitens (Mol.) Demaret comb. nov., XVII : 372.
Cirsium palustre (L.) Scop. var. spinosissimum Willk. f. albiflorum J. Ar. f. nov., XXIV : 263.
— vulgare (Savi) Ten. subsp. silvaticum (Tausch) J. Ar. comb. nov., XXIV : 259.
— vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare var. brevilobum (Rouy) J. Ar. comb. nov., XXIV : 258.
— vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare var. microcephalum (Lange) J. Ar. comb. nov., XXIV : 258.
— vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare var. virens (Timb.-Lagr.) J. Ar. comb. nov., XXIV : 259.
— × inerme Reichb. subsp. belgicum J. Ar. subsp. nov., XXIV : 274.
Cissampelos nigrescens Diels var. cardiophylla Troupin var. nov., XXV : 141.

Cissampelos rigidifolia (Engl.) Diels var lanuginosa Troupin var. nov., XXV : 141.
Cissus Flamignii De Wild. sp. nov., IV : 364.
— Humbertii Robyns et Lawalrée sp. nov., XVIII : 271.
— Pynaerti De Wild. sp. nov., IV : 362.
— Pynaerti De Wild. var. subtrilobata De Wild. var. nov., IV : 363.
— Vanmeelii Lawalrée sp. nov., XIX : 219.
Cleistanthus Michelsonii J. Léonard sp. nov., XXV : 282.
Cleistopholis Pynaerti De Wild. sp. nov., IV : 387.
— Verschuereni De Wild. sp. nov., IV : 387.
Clematis hirsuta Perr. et Guill. var. gallaënsis (Engl.) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 108.
Cleome Hochstetteri (Eichl.) Cuf. comb. nov., XXIV : suppl. 121.
— monophylloides Wilczek sp. nov., XX : 189.
— Mullendersii Wilczek sp. nov., XX : 190.
Clerodendron attenuatum (De Wild.) De Wild. stat. nov., VII : 182.
— Bequaerti De Wild. sp. nov., VII : 185.
— Bequaerti var. Debeersti De Wild. var. nov., VII : 186.
— cauliflorum De Wild. sp. nov., VII : 165.
— Gossensi De Wild. sp. nov., VII : 168.
— hexagonum De Wild. sp. nov., VII : 169.
— Hockii De Wild. sp. nov., III : 266.
— laxicymosum De Wild. sp. nov., VII : 171.
— luembense De Wild. sp. nov., III : 267.
— macrocalyx De Wild. sp. nov., VII : 172.
— savanorum De Wild. sp. nov., VII : 183.
— variifolium De Wild. sp. nov., VII : 179.
— variifolium De Wild. var. scandens De Wild. var. nov., VII : 181.
Clitandra semlikiensis Robyns et Boutique sp. nov., XVIII : 259.
Clitoriopsis Wilczek gen. nov., XXIV : 411.
— mollis Wilczek sp. nov., XXIV : 412.
Cnestis Claessensii De Wild. sp. nov., III : 258.
— gimbiensis Troupin sp. nov., XXI : 371.
— hirsuta Troupin sp. nov., XXI : 368.
— Mullendersii Troupin sp. nov., XXI : 370.
— Vanderystii Troupin sp. nov., XXI : 370.
— yangambiensis Louis ex Troupin sp. nov., XXI : 369.
Coccinia Homblei Cogn. sp. nov., V : 114.

Coccinia macrocarpa Cogn. sp. nov., V : 113.
— subsessiliflora Cogn. sp. nov., IV : 225.
— subspicata Cogn. sp. nov., V : 115.
Coffea Lebruniana Germain et Kesler sp. nov., XXV : 405.
Cogniauxia auriculata Cogn. sp. nov., V : 112.
Cola discoglypremnophylla Brenan et Jones sp. nov., XVIII : 2.
— Mengei De Wild. sp. nov., IV : 391.
Coleus collinus Lebrun et Toussaint sp. nov., XVII : 81.
— ferrugineus Robyns sp. nov., XVII : 77.
— fimbriatus Lebrun et Toussaint sp. nov., XVII : 79.
— kivuensis Lebrun et Toussaint sp. nov., XVII : 72.
— Lebrunii Robyns sp. nov., XVII : 73.
— serrulatus Robyns sp. nov., XVII : 78.
— subulatus Robyns sp. nov., XVII : 76.
— Wittei Robyns sp. nov., XVII : 74.
Collybia albofurfuracea Beeli sp. nov., XV : 30.
— sierraleonis Beeli sp. nov., XV : 31.
— viridis Beeli sp. nov., XV : 31.
Colophospermum Kirk ex J. Léonard gen. nov., XIX : 390.
— Mopane Kirk ex J. Léonard sp. nov., XIX : 390.
Colutea istria Miller var. sericea (Rich.) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 288.
Commelina membranacea Robyns sp. nov., XXV : 251.
— Vanderystii De Wild. sp. nov., III : 268.
Commicarpus africanus (Lour.) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 79.
— africanus (Lour.) Cuf. var. sinuatolobatus (Chiov.) Cuf. comb. nov., XXIII : 79.
— Boissieri (Heim.) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 79.
— pedunculosus (Rich.) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 79.
— reniformis (Chiov.) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 80.
— stenocarpus (Chiov.) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 81.
— verticillatus (Poir.) Standl. var. glandulosus (Franch.) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 81.
Connarus Vrydaghii Troupin sp. nov., XXI : 372.
Conyza Wittei Robyns sp. nov., XVII : 99.
Copaifera Arnoldiana (De Wild. et Th. Dur.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 180.
— religiosa J. Léonard sp. nov., XIX : 398.
Corallocarpus congolensis Cogn. sp. nov., IV : 219.
Coreopsis exilis Sherff sp. nov., XIII : 288.
— Giorgii Sherff sp. nov., XIII : 292.

Coreopsis Goffardii Sherff sp. nov., XIII : 290.
— injucunda Sherff sp. nov., XIII : 293.
— multiflora Sherff sp. nov., XIII : 292.
— Quarrei Sherff sp. nov., XIII : 289.
— vulgaris Sherff sp. nov., XIII : 291.
Coryneum congoense Torrend sp. nov., IV : 10.
Coula edulis Baill. var. Cabrae (De Wild. et Th. Dur.) J. Léonard comb. nov., XVIII : 147.
Craibia dubia (De Wild.) De Wild. comb. nov., VII : 268.
— Laurenti (De Wild.) De Wild. comb. nov., VII : 268.
— Lujai De Wild. sp. nov., VII : 269.
— Lujai De Wild. var. longeacuminata De Wild. var. nov., VII : 270.
Craterosiphon Quarrei Staner sp. nov., XIII : 370.
Craterostigma purpureum Lebrun et Toussaint sp. nov., XVII : 83.
Cratoneurum filicinum (Hedw.) Roth f. prolixum (De Not.) Demaret comb. nov., XVII : 361.
— filicinum (Hedw.) Roth. f. tenue (Boul.) Demaret comb. nov., XVII : 361.
Crepis bumbensis Hiern subsp. itakensis Babcock subsp. nov., XIV : 299.
— bumbensis Hiern subsp. kundensis Babcock subsp. nov., XIV : 300.
— bumbensis Hiern subsp. typica Babcock subsp. nov., XIV : 298.
— caudicalis Babcock sp. nov., XIV : 303.
— congoensis Babcock sp. nov., XIV : 301.
— urundica Babcock sp. nov., XIV : 296.
Crotalaria Adamii Wilczek sp. nov., XXIII : 159.
— andromedifolia Wilczek sp. nov., XXIII : 135.
— argenteotomentosa Wilczek sp. nov., XXIII : 207.
— axillifloroides Bak. f. ex Wilczek sp. nov., XXIII : 208.
— axillifloroides Bak. f. ex Wilczek var. gracilis Wilczek var. nov., XXIII : 209.
— basipeta Wilczek sp. nov., XXIII : 141.
— Becquetii Bak. f. ex Wilczek sp. nov., XXIII : 188.
— Bemba Wilczek sp. nov., XXIII : 139.
— beniensis De Wild. sp. nov., VIII : 130.
— Bequaertii Bak. f. var. pubescens Wilczek var. nov., XXIII : 186.
— Boutiqueana Wilczek sp. nov., XXIII : 130.

Crotalaria Bredoi Wilczek sp. nov., XXIII : 183.
— Cabui Wilczek sp. nov., XXIII : 192.
— Callensii Wilczek sp. nov., XXIII : 140.
— carsonioides Wilczek sp. nov., XXIII : 144.
— Claessensii De Wild. sp. nov., III : 271.
— cylindroclados Baker f. et Martin sp. nov., VIII : 131.
— decaulescens Robyns ex Wilczek sp. nov., XXIII : 176.
— Desaegeri Wilczek sp. nov., XXIII : 200.
— Dewildemaniana Wilczek sp. nov., XXIII : 190.
— diloloensis Bak. f. var. prostrata Wilczek var. nov., XXIII : 215.
— dolichonyx Baker f. et Martin sp. nov., VIII : 131.
— Duboisii Wilczek sp. nov., XXIII : 199.
— Exelliana Wilczek sp. nov., XXIII : 168.
— filicauloides Wilczek sp. nov., XXIII : 177.
— Forbesii Bak. var. Vanmeelii Wilczek var. nov., XXIII : 148.
— Germainii Wilczek sp. nov., XXIII : 161.
— glabripedicellata Wilczek sp. nov., XXIII : 186.
— glauca Willd. var. beniensis De Wild. var. nov., VIII : 132.
— gnidioides Wilczek sp. nov., XXIII : 165.
— Haumaniana Wilczek sp. nov., XXII : 164.
— Hoffmannii Wilczek sp. nov., XXIII : 142.
— Homblei De Wild. sp. nov., V : 23.
— impressa Nees subsp. Onobrychis (Rich.) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 232.
— incana L. f. glabrescens Wilczek f. nov., XXIII : 147.
— incana L. f. lanata Wilczek f. nov., XXIII : 147.
— intermedia Kotschy var. dorumaensis Wilczek var. nov., XXIII : 188.
— Jurioniana Wilczek sp. nov., XXIII : 193.
— Kamatinii Wilczek sp. nov., XXIII : 182.
— kambanguensis Wilczek sp. nov., XXIII : 185.
— kapiriensis De Wild. sp. nov., V : 23.
— kasaiensis Wilczek sp. nov., XXIII : 178.
— katongaensis Wilczek sp. nov., XXIII : 217.
— Kerkvoordei Wilczek sp. nov., XXIII : 134.
— — kibaraensis Wilczek sp. nov., XXIII : 187.
— kikangaensis De Wild. sp. nov., VIII : 133.
— kikangaensis De Wild. var. longifoliolata De Wild. var. nov., VIII : 134.
— kipilaensis Wilczek sp. nov., XXIII : 175.

Crotalaria kipiriensis Wilczek sp. nov., XXIII : 179.
— kwengeensis Wilczek sp. nov., XXIII : 136.
— Lawalreeana Wilczek sp. nov., XXIII : 162.
— leptoclada Harms var. bianoensis Wilczek var. nov., XXIII : 133.
— longipedunculata De Wild. ex Wilczek sp. nov., XXIII : 154.
— longipedunculata De Wild. ex Wilczek f. glabra Wilczek f. nov., XXIII : 156.
— longithyrsa Bak. f. var. latifolia Wilczek var. nov., XXIII : 150.
— luniemuensis Bak. f. ex Wilczek sp. nov., XXIII : 153.
— luondeensis Wilczek sp. nov., XXIII : 209.
— lusamboensis Wilczek sp. nov., XXIII : 173.
— lusingaensis Wilczek sp. nov., XXIII : 149.
— Mabobo Wilczek sp. nov., XXIII : 132.
— malangensis Bak. f. var. capituliformis Wilczek var. nov., XXIII : 174.
— malangensis Bak. f. var. Overlaetii Wilczek var. nov., XXIII : 174.
— maxillaris Klotzsch var. latifoliolata De Wild. var. nov., VIII : 135.
— megapteryx Baker f. et Martin sp. nov., VIII : 136.
— mesopontica Taub. f. glabrescens Wilczek f. nov., XXIII : 151.
— mesoponticoides Wilczek sp. nov., XXIII : 152.
— Micheliana Wilczek sp. nov., XXIII : 213.
— microthamnus Robyns ex Wilczek sp. nov., XXIII : 181.
— Milneana Wilczek sp. nov., XXIII : 133.
— mokoroensis Wilczek sp. nov., XXIII : 206.
— Mortelmansii Wilczek sp. nov., XXIII : 214.
— Mullendersii Wilczek sp. nov., XXIII : 196.
— natalitia Meyer var. rutshuruensis De Wild. var. nov., VIII : 137.
— ononoides Benth. var. grandiflora Wilczek var. nov., XXIII : 147.
— ononoides Benth. var. pubescens Wilczek var. nov., XXIII : 145.
— orthoclada Welw. var. Claessensi De Wild. var. nov., VIII : 138.
— oxthoibos Baker f. et Martin sp. nov., VIII : 139.
— oxyphylloides Wilczek sp. nov., XXIII : 211.
— Paolii Cuf. nom. nov., XXV : suppl. 235.

Crotalaria Piedboeufii Wilczek sp. nov., XXIII : 172.
— pseudodiloloensis Wilczek sp. nov., XXIII : 212.
— pseudoflorida Wilczek sp. nov., XXIII : 171.
— pseudokipandensis Wilczek sp. nov., XXIII : 160.
— pseudo-Seretii Wilczek sp. nov., XXIII : 143.
— pycnocephala Baker f. var. Claessensi De Wild. var. nov., VIII : 140.
— recta Steud. ex A. Rich. var. katangensis Robyns ex Wilczek var. nov., XXIII : 148.
— Renieriana Wilczek sp. nov., XXIII : 195.
— Robynsii Wilczek sp. nov., XXIII : 170.
— Rogersii Bak. f. f. kilwaensis Wilczek f. nov., XXIII : 151.
— Schmitzii Wilczek sp. nov., XXIII : 218.
— Sengae Bak. f. ex Wilczek sp. nov., XXIII : 202.
— singulifloroides Wilczek sp. nov., XXIII : 216.
— Szaferiana Wilczek sp. nov., XXIII : 167.
— tamboensis Wilczek sp. nov., XXIII : 203.
— upembaensis Wilczek sp. nov., XXIII : 157.
— Vandenbrandii Wilczek sp. nov., XXIII : 184.
— Vanderystii Wilczek sp. nov., XXIII : 194.
— Vanmeelii Wilczek sp. nov., XXIII : 131.
— Wildemani Baker f. et Martin sp. nov., VIII : 141.
Crotonogyne Manniana Müll. Arg. subsp. congolensis J. Léonard subsp. nov., XXV : 285.
Crudia Harmsiana De Wild. var. velutina J. Léonard var. nov., XX : 231.
— Michelsonii J. Léonard sp. nov., XX : 228.
— Zenkeri Harms ex De Wild. sp. nov., VII : 251.
Cryptolepis Laurenti De Wild. sp. nov., VII : 26.
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. f. gracile (Boul.) Demaret comb. nov., XVII : 380.
Cucumis Homblei De Wild. ex Cogn. sp. nov., V : 110.
— Wildemanianus Cogn. sp. nov., V : 111.
Cussonia sessilis Lebrun sp. nov., XIII : 15.
Cyanothyrsus Klainei Pierre ex De Wild. nom. nov., VII : 259.
— Mortehani De Wild. nom. nov., VII : 260.
Cyanotis Homblei De Wild. sp. nov., V : 81.
Cyathula cylindrica Moq. var. pilosa Suessenguth var. nov., XV : 62.
— echinulata Hauman sp. nov., XVIII : 107.
— prostrata Bl. f. rubella Suessenguth f. nov., XV : 63.

Cyclodictyon bidentatum Demaret sp. nov., XXII : 158.
— Dixonianum Demaret sp. nov., XXII : 161.
— Lebrunii Demaret et P. de la V. sp. nov., XXI : 51.
— Perrottetii Demaret et P. de la V. sp. nov., XXI : 56.
— recognitum Demaret et P. de la V. sp. nov., XXI : 50.
— subobtusifolium Dix. ex Demaret et P. de la V. sp. nov., XXI : 36.
— Vallis-Gratiae (Hamp.) Broth. f. Breutelianum (Hamp.) Demaret et P. de la V. f. nov. et comb. nov., XXI : 45.

Cymbopogon acutispathaceus De Wild. sp. nov., VI : 6.
— Bequaerti De Wild. sp. nov., VI : 8.
— densiflorus (Steud.) De Wild. comb. nov., VI : 10.
— diplandrus (Hack.) De Wild. comb. nov., VI : 11.
— familiaris (Steud.) De Wild. comb. nov., VI : 12.
— kapandensis De Wild. sp. nov., VI : 13.
— luembensis De Wild. sp. nov., VI : 14.
— modicus De Wild. sp. nov., VI : 16.
— pilosovaginatus De Wild. sp. nov., VI : 17.
— scabrimarginatus De Wild. sp. nov., VI : 20.
— subcordatifolius De Wild. sp. nov., VI : 22.
— Vanderysti De Wild. sp. nov., VI : 24.

Cynometra bokalaensis De Wild. sp. nov., V : 20.
— Claessensi De Wild. sp. nov., V : 22.
— Dacremontii Lebrun sp. nov., IX : 288.
— Gillmanii J. Léonard sp. nov., XXI : 388.
— Le-Testui (Pellegr.) J. Léonard, comb. nov., XXI : 382.
— Michelsonii J. Léonard sp. nov., XXI : 394.
— palustris J. Léonard sp. nov., XXII : 201.
— rubriflora De Wild. sp. nov., V : 21.
— sessiliflora Harms var. Laurentii (De Wild.) Lebrun comb. nov., IX : 299.
— sessiliflora Harms var. Oddonii (De Wild.) Lebrun com. nov., IX : 301.
— sessiliflora Harms var. pedicellata (De Wild.) Lebrun comb. nov., IX : 300.
— sessiliflora Harms var. Vermoeseniana Lebrun var. nov., IX : 301.

Cyperus alternifolius L. subsp. flabelliformis (Rottb.) Kük. var. macrostachys Robyns et Tournay var. nov., XXV : 246.
— kabarensis Cherm. sp. nov., XIV : 330.

Cyperus kipasensis Cherm. sp. nov., XIII : 281.
— major Cherm. var. micranthus Cherm. var. nov., XIII : 282.
— serpens Cherm. sp. nov., XIII : 280.
Cyttaranthus J. Léonard gen. nov., XXV : 286.
— congolensis J. Léonard sp. nov., XXV : 288.

Daedalea Milliaui Beeli sp. nov., VIII : 256.
— sistotremoides Beeli sp. nov., VIII : 257.
Dalbergia Afzeliana G. Don var. parvifolia Cronquist var. nov., XXII : 215.
— Gilbertii Cronquist sp. nov., XXII : 216.
— Louisii Cronquist sp. nov., XXII : 217.
Daltonia tortifolia Demaret et P. de la V. sp. nov., XXV : 353.
Daniellia Klainei De Wild. sp. nov., VII : 258.
— Mortehani De Wild. sp. nov., VII 260.
— Soyauxii (Harms) Rolfe var. pilosa J. Léonard var. nov., XIX : 407.
— thurifera J. J. Benn. var. Chevalieri J. Léonard var. nov., XIX : 407.
Dasylepis Sereti De Wild. sp. nov., III : 268.
Dasystachys Hockii De Wild. sp. nov., III : 264.
Deinbollia Giorgii De Wild. sp. nov., IV : 374.
— variabilis De Wild. sp. nov., IV : 374.
Delphinium Wellbyi Hemsley var. micranthum (Fiori) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 107.
— Wellbyi Hemsley f. albiflorum (Chiov.) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 107.
Derris Claessensi De Wild. nom. nov., VII : 225.
— coriacea De Wild. nom. nov., VII : 227.
— cylindrica De Wild. nom. nov., VII : 228.
— Dewevrei De Wild. nom. nov., VII : 229.
— ferruginea De Wild. nom. nov., VII : 231.
— Gilleti De Wild. nom. nov., VII : 232.
— Giorgii De Wild. sp. nov., V : 18.
— Laurenti De Wild. nom. nov., VII : 235.
— Pynaerti De Wild. nom. nov., VII : 237.
— Reygaerti De Wild. nom. nov., VII : 238.
Desmodium adscendens (Sw.) DC. var. robustum Schubert var. nov., XXII : 290.
— barbaratum (L.) Benth. var. argyreum (Welw. ex Bak.) Schubert comb. nov., XXII : 298.

Desmodium barbaratum (L.) Benth. var. dimorphum (Welw. ex Bak.) Schubert comb. nov., XXII : 298.
— barbaratum (L.) Benth. var. procumbens Schubert var. nov., XXII : 297.
— fulvescens Schubert sp. nov., XXII : 296.
— hirtum Guill. et Perr. f. compressum Schubert f. nov., XXII : 288.
— salicifolium (Poir.) DC. var. densiflorum Schubert var. nov., XXII : 295.
— Wittei Schubert sp. nov., XXII : 292.
Dialium Klainei Pierre ex De Wild. sp. nov., VII : 263.
— Pierrei De Wild. sp. nov., VII : 264.
— Reygaerti De Wild. sp. nov., VII : 265.
Dichapetalum angolense Chodat var. glabriusculum Hauman var. nov., XXV : 347.
— Brazzae Pellegr. var. purpuracens Hauman var. nov., XXV : 348.
— cinnamomeum Hauman sp. nov., XXV : 342.
— Claessensii De Wild. sp. nov., III : 269.
— Dewevrei De Wild. et Th. Dur. var. Donisii Hauman var. nov., XXV : 349.
— flabellatiflorum Hauman sp. nov., XXV : 342.
— Germainii Hauman sp. nov., XXV : 343.
— Gillardinii Hauman sp. nov., XXV : 344.
— Gilletii De Wild. sp. nov., III : 270.
— Lebrunii Hauman sp. nov., XXV : 345.
— Lujae De Wild. et Th. Dur. var. brevipile Hauman var. nov., XXV : 349.
— micranthum Hauman sp. nov., XXV : 346.
— mombongense De Wild. var. breviflorum Hauman var. nov., XXV : 350.
— mombongense De Wild. var. orientale Hauman var. nov., XXV : 350.
— palustre Louis ex Hauman sp. nov., XXV: 346.
— palustre Louis ex Hauman var. polyanthum Hauman var. nov., XXV :347.
— patenti-hirsutum Ruhl. var. longibracteolatum Hauman var. nov., XXV : 351.
— Thonneri De Wild. var. longistipulatum Hauman var. nov., XXV : 351.

Dichapetalum Thonneri De Wild. var. polyneuron Hauman var. nov., XXV : 351.
— Zenkeri Engl. var. strigillosum De Wild. var. nov., III : 270.
Dichrospermum Brem. gen. nov., XXII : 75.
— congense Brem. sp. nov., XXII : 76.
Dicliptera Humberti Mildbr. sp. nov., XIV : 356.
— longipedunculata Mildbr. sp. nov., XIV : 357.
— Wittei Mildbr. sp. nov., XVII : 89.
Dicranolepis Brixhei De Wild. sp. nov., V : 75.
— Flamignii De Wild sp. nov., V : 75.
— Soyauxii Engl. var. congolana Germain var. nov., XXV : 263.
Didelotia minutiflora (A. Chev.) J. Léonard comb. nov., XXII : 206.
— unifoliolata J. Léonard sp. nov., XXII : 205.
Didymodon recurvirostris (Hedw.) Jennings var. angustifolius (P. de la V.) Demaret comb. nov., XVIII : 21.
Didymopsis congoensis Torrend sp. nov., IV : 12.
Digitaria Bredoensis Robyns et Van der Veken sp. nov., XXII : 146.
— hyalina Robyns et Van der Veken sp. nov., XXII : 150.
— hydrophila Van der Veken sp. nov., XXV : 326.
— polybotryoides Robyns et Van der Veken sp. nov., XXII : 152.
— Scaettae Robyns var. glabra Robyns et Van der Veken var. nov., XXII : 148.
— Schmitzii Van der Veken sp. nov., XXV : 325.
— subsulcata Robyns et Van der Veken sp. nov., XXII : 144.
Digitariopsis major Van der Veken sp. nov., XXV : 330.
Dimorphochlamys glomerata Cogn. sp. nov., V : 111.
Dinocanthium affine Robyns sp. nov., XVII : 94.
— Bequaertii Robyns sp. nov., XVII : 95.
Dioscorea armata De Wild. sp. nov., IV : 339.
— asteriscus Burkill sp. nov., XV : 356.
— Baya De Wild. var. subcordata De Wild. var. nov., IV : 328.
— Chevalieri De Wild. sp. nov., IV : 316.
— cochleari-apiculata De Wild. sp. nov., IV : 350.
— Dawei De Wild. sp. nov., IV : 317.
— echinulata De Wild. sp. nov., III : 278.
— Ekolo De Wild. sp. nov., IV : 341.
— Engbo De Wild. sp. nov., IV : 342.
— Flamignii De Wild. f. feminea De Wild. f. nov., IV : 343.

Dioscorea Hockii De Wild. sp. nov., III : 277.
— Knuthiana De Wild. sp. nov., IV : 354.
— Lecardi De Wild. var. Chevalieri De Wild. var. nov., IV : 334.
— longespicata De Wild. sp. nov., IV : 323.
— Pynaertioides De Wild. sp. nov., IV : 344.
— smilacifolia De Wild. et Th. Dur. var. alternifolia De Wild. var. nov., IV : 346.
Dioscoreophyllum triandrum Troupin sp. nov., XIX : 433.
Diospyros cauliflora De Wild. sp. nov., V : 63.
— Gilleti De Wild. sp. nov., V : 63.
Diplanthemum Brieyi De Wild. sp. nov., V : 65.
Dissotis latibracteata De Wild. sp. nov., V : 79.
— quinquenervis De Wild. sp. nov., V : 79.
— verticillata De Wild. sp. nov., V : 78.
Distichophyllidium africanum Demaret et P. de la V. sp. nov., XXV : 354.
Ditrichum vaginans (Sull.) Hampe var. Lamyi (Boul.) Demaret comb. nov., XVII : 324.
Dolichos aciphyllus Wilczek sp. nov., XXIV : 424.
— africanus Brenan ex Wilczek sp. nov., XXIV : 430.
— argyros Wilczek sp. nov., XXIV : 426.
— bianoensis Wilczek sp. nov., XXIV : 416.
— compressus Wilczek sp. nov., XXIV : 422.
— corymbosus Wilczek sp. nov., XXIV : 419.
— glabratus Wilczek sp. nov., XXIV : 428.
— glabrescens Wilczek sp. nov., XXIV : 416.
— karaviaensis Wilczek sp. nov., XXIV : 420.
— kasaiensis Wilczek sp. nov., XXIV : 429.
— lualabaensis Wilczek sp. nov., XXIV : 417.
— malosanus Bak. var. trifidus Wilczek var. nov., XXIV 429.
— petiolatus Wilczek sp. nov., XXIV : 423.
— pseudocajanus Welw. ex Bak. var. paniculatus Wilczek var. nov., XXIV : 426.
— pseudocomplanatus Wilczek sp. nov., XXIV : 427.
— Quarrei Wilczek sp. nov., XXIV : 421.
— sericophyllus Wilczek sp. nov., XXIV : 425.
— subcapitatus Wilczek sp. nov., XXIV : 431.
— Zovuanyi Wilczek sp. nov., XXIV : 418.
Dombeya Ringoeti De Wild. sp. nov., V : 24.
Dorstenia campanulata Hauman sp. nov., XIX : 61.

Dorstenia Hockii De Wild. sp. nov., III : 278.
— papillosa Hauman sp. nov., XIX : 59.
— papillosa Hauman var. plethorica Hauman var. nov., XIX : 60.
— yangambiensis J. Léonard sp. nov., XIX : 227.
Doryalis Giorgii De Wild sp. nov., IV : 408.
Dovyalis retusa Robyns et Lawarée sp. nov., XVIII : 282.
Dracaena dundusanensis De Wild. sp. nov., V : 5.
— Laurentii De Wild. var. linearifolia De Wild. var. nov., V : 6.
— Vanderysti De Wild. sp. nov., V : 7.
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Moenkem. var. denticulatus (Boul.) Demaret comb. nov., XVII : 364.
— aduncus (Hedw.) Moenkem. var. Kneiffii (Br. et Schpr) Moenkem. f. laxum (Schpr) Demaret comb. nov., XVII : 365.
— aduncus (Hedw.) Moenkem. var. pseudofluitans (San.) Moenkem. f. flexile (Ren.) Demaret comb. nov., XVII : 365.
— aduncus (Hedw.) Moenkem. var. pseudofluitans (San.) Moenkem. f. paternum (San.) Demaret comb. nov., XVII, 365.
— aduncus (Hedw.) Moenkem. f. attenuatus (Boul.) Demaret comb. nov., XVII : 364.
— aduncus (Hedw.) Moenkem. f. falcatus (Ren.) Demaret comb. nov., XVII : 364.
— fluitans (Hedw.) Warnst. var. gracilis (Boul.) Demaret comb. nov., XVII : 366.
— fluitans (Hedw.) Warnst. var. gracilis (Boul.) Demaret f. angustifolius (V. d. Br.) Demaret comb. nov., XVII : 366.
Drimiopsis Sereti De Wild. sp. nov., III : 268.
Droogmansia elongata Schubert sp. nov., XXII : 304.
— Giorgii De Wild. var. floribunda Schubert var. nov., XXII : 300.
— grandiflora Schubert sp. nov., XXII : 302.
— grandiflora Schubert var. angusta Schubert var. nov., XXII : 303.
— longirhachis Schubert sp. nov., XXII : 304.
— platypus (Bak.) Schindl. var. Hockii (De Wild.) Schubert comb. nov., XXII : 301.
— pteropus (Bak.) De Wild. f. velutina Schubert f. nov., XXII : 301.
— tenuis Schubert sp. nov., XXII : 305.
— tenuis Schubert var. laxa Schubert var. nov., XXII : 306.
— Van-Meelii Schubert sp. nov., XXII : 303.
— velutina Schubert sp. nov., XXII : 300.

Drosera Bequaertii Taton sp. nov., XVII : 308.
— congolana Taton sp. nov., XVII : 310.
— insolita Taton sp. nov., XVII : 307.
— katangensis Taton sp. nov., XVII : 309.
Dryopteris Filix-mas (L.) Schott f. affinis (Fisch. et Mey.) Lawalrée comb. nov., XIX : 238.
— pseudogueintziana R. Bonaparte sp. nov., IV : 32.
Duboscia Brieyi De Wild. sp. nov., V : 65.
Duvernoya Bequaerti De Wild. nom. nov., IV : 429.
— Claessensi De Wild. nom. nov., V : 11.
— latibracteata De Wild. nom. nov., V : 13.

Ehretia breviflora De Wild. sp. nov., V : 62.
Elaeophorbia grandifolia (Haw.) Croizat comb. nov., XV : 109.
Emilia Humbertii Robyns sp. nov., XVII : 102.
— Humbertii Robyns var. angustifolia Robyns var. nov., XVII : 103.
— juncea Robyns sp. nov., XVII :104.
— Vanmeeli Lawalrée sp. nov., XIX : 225.
— violacea Cronquist sp. nov., XXII : 309.
Emiliomarcelia Braunii (Engl.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 115.
— Brieyi De Wild. nom. nov., IV : 369.
— congoensis (Engl.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 115.
— Laurentii (De Wild.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 115.
— Lescrauwaeti De Wild. nom. nov., IV : 368.
— Oddoni (De Wild.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 115.
— Redingi De Wild. nom. nov., IV : 369.
— Reygaerti De Wild. nom. nov., IV : 368.
Eminia polyadenia Hauman sp. nov., XXV : 123.
— polyadenia Hauman var. intermedia Hauman var. nov., XXV : 124.
Enantia atrocyanescens Robyns et Ghesq. sp. nov., IX : 312.
— kwiluensis Robyns et Ghesq. sp. nov., IX : 315.
— Lebrunii Robyns et Ghesq. sp. nov., IX : 311.
— olivacea Robyns et Ghesq. sp. nov., IX : 314.
Enneastemon biglandulosus Boutique sp. nov., XXI : 125.
Entada Claessensi De Wild. sp. nov., VII : 254.
Entadopsis leptostachya (Harms) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 210.
Epinetrum apiculatum Troupin sp. nov., XXV : 131.
— Exellianum Troupin sp. nov., XXV : 132.

Epithele interrupta Bresadola sp. nov., IV : 25.

Eragrostis articulata De Wild. sp. nov., VI : 58.
— atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. var. congesta Robyns et Tournay var. nov., XXV : 243.
— Bequaerti De Wild. sp. nov., VI : 59.
— densa De Wild. sp. nov., VI : 61.
— elongato-compressa De Wild. sp. nov., VI : 62.
— Flamignii De Wild. sp. nov., VI : 63.
— Hocki De Wild. sp. nov., VI : 64.
— Homblei De Wild. sp. nov., VI : 66.
— longepaniculata De Wild. sp. nov., VI : 67.
— manikensis De Wild. sp. nov., VI : 68.
— purpureo-pedicellata De Wild. sp. nov., VI : 70.
— Vanderysti De Wild. sp. nov., VI : 71.

Eremospatha Laurenti De Wild., sp. nov., V : 147.
— Sapini De Wild., sp. nov., V : 147.

Eriosema bianoense Hauman sp. nov., XXV : 110.
— chrysadenium Taub. var. intermedium Hauman var. nov., XXV : 119.
— chrysadenium Taub. var. macrorhizum Hauman var. nov., XXV : 118.
— cordifolium Hochst. var. longibracteatum Hauman var. nov., XXV : 119.
— decumbens Hauman sp. nov., XXV : 111.
— humile Hauman sp. nov., XXV : 111.
— Kankolo Hauman sp. nov., XXV : 112.
— kwangoense Hauman sp. nov., XXV : 113.
— longiunguiculatum Hauman sp. nov., XXV : 114.
— montanum Bak. f. var. hirsutum Hauman var. nov., XXV : 120.
— montanum Bak. f. var. latibracteatum Hauman var. nov., XXV : 120.
— shirense Bak. f. var. longibracteatum Hauman var. nov., XXV : 120.
— sparsiflorum Bak. f. var. sessilifolium Hauman var. nov., XXV : 121.
— Stanerianum Hauman sp. nov., XXV : 116.
— Stanerianum Hauman var. flavescens Hauman var. nov., XXV : 117.
— suborbiculare Hauman sp. nov., XXV : 114.
— tenuicaule Hauman sp. nov., XXV : 118.

Eriosema tephrosioides Harms var. salicifolium Hauman var. nov., XXV : 122.
— terniflorum Hiern var. katangense Hauman var. nov., XXV : 121.
— Tisserantii Staner et De Craene var. angustifolium Hauman var. nov., XXV : 122.
— upembae Hauman sp. nov., XXV : 115.
Eriosemopsis Robyns gen. nov., XI : 38.
— subanisophylla Robyns sp. nov., XI : 38.
Erlangea globosa Robyns sp. nov., XVII : 97.
Erythrina L. subgen. Chirocalyx Harv. sect. Merocraspedon Louis sect. nov., XIII : 302.
— orophila Ghesq. sp. nov., XV : 217.
Eugenia Gilletii De Wild. nom. nov., IV : 375.
— Giorgii De Wild. nom nov., IV : 376.
Eulophia angustilabellata De Wild. sp. nov., VI : 109.
— Debeersti De Wild. sp. nov., VI : 111.
— Descampsii De Wild. nom. nov., VI : 81.
— elamellata De Wild. sp. nov., VI : 112.
— faradjensis De Wild. nom. nov., VI : 83.
— gumbariensis De Wild. sp. nov., VI : 117.
— Hocki De Wild. sp. nov., VI : 120.
— katangensis (De Wild.) De Wild. comb. nov., VI : 121.
— kisanfuensis De Wild. nom. nov., VI : 93.
— paucisquamata De Wild. sp. nov., VI : 125.
— sankisiensis De Wild. sp. nov., VI : 126.
— Sapini De Wild. nom. nov., VI : 103.
— trilamellata De Wild. sp. nov., VI : 127.
— vermiculata De Wild. nom. nov., VI : 107.
Eupatorium africanum Oliv. et Hiern var. Vanmeelii Lawalrée var. nov., XIX : 220.
Euphorbia L. sect. Tekeanae Croizat sect. nov., XV : 119.
— Hockii De Wild. sp. nov., III : 265.
Eureiandra congolensis Cogn. sp. nov., V : 113.
Exellia Boutique gen. nov., XXI : 117.
— scamnopetala (Exell) Boutique comb. nov., XXI : 118.
Exomiocarpon Lawalrée gen. nov., XVII : 62.
— madagascariensis (Humbert) Lawalrée comb. nov., XVII : 63.

Fadogia Schweinf. sect. Lobatae Robyns sect. nov., XI : 85.
— sect. Subulatae Robyns sect. nov., XI : 62.

Fadogia Schweinf. sect. Subulatae Robyns subsect. Imparisepalae Robyns subsect. nov., XI : 62.
— sect. Subulatae Robyns subsect. Imparisepalae Robyns ser. Epapillosae Robyns ser. nov., XI : 62.
— sect. Subulatae Robyns subsect. Imparisepalae Robyns ser. Papillosae Robyns ser. nov., XI : 69.
— sect. Subulatae Robyns subsect. Imparisepalae Robyns ser. Papilloso-tomentosae Robyns ser. nov., XI : 76.
— sect. Subulatae Robyns subsect. Imparisepalae Robyns subsect. nov., XI : 82.
— sect. Truncatae Robyns sect. nov., XI : 48.
— Andersonii Robyns sp. nov., XI : 86.
— brachytricha (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 54.
— Cienkowskii Schweinf. var. lanceolata K. Schum. ex Robyns var. nov., XI : 81.
— cinerascens Robyns sp. nov., XI : 88.
— coriacea Robyns sp. nov., XI : 49.
— Dalzielii Robyns sp. nov., XI : 66.
— djalonensis A. Chev. ex Robyns sp. nov., XI : 88.
— fragrans Robyns sp. nov., XI : 75.
— glauca Robyns sp. nov., XI : 62.
— graminea Wernham var. pubescens Robyns var. nov., XI : 69.
— grandiflora Robyns sp. nov., XI : 65.
— latifolia A. Chev. ex Robyns sp. nov., XI : 87.
— monantha Robyns sp. nov., XI : 53.
— monticola Robyns sp. nov., XI : 70.
— mucronulata Robyns sp. nov., XI : 67.
— obscura A. Chev. ex Robyns sp. nov., XI : 91.
— oleoides Robyns sp. nov., XI : 73.
— rostrata Robyns sp. nov., XI : 78.
— Schumanniana Robyns nom. nov., XI : 84.
— tristis (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 76.
— variabilis Robyns sp. nov., XI : 63.
Fadogiella Robyns gen. nov., XI : 94.
— cana (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 96.
— manikensis (De Wild.) Robyns comb. nov., XI : 97.
— stigmatoloba (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 96.
— verticillata Robyns sp. nov., XI : 95.
Fagara Homblei De Wild. sp. nov., IV : 390.
— Mortehani De Wild. sp. nov., IV : 390.

Farsetia stenoptera Hochst. var. angustipetala (Engl.) Cuf. comb. nov., XXIV : suppl. 157.
Favolus Vanderystii Beeli sp. nov., VIII : 247.
Ferdinandia Mortehani De Wild. sp. nov., V : 53.
Festuca gigantea (L.) Vill. var. africana Robyns et Tournay var. nov., XXV : 245.
Ficus Jansii Boutique sp. nov., XIX : 211.
— Louisii Boutique et J. Léonard sp. nov., XIX : 215.
— Michelsonii Boutique et J. Léonard sp. nov., XIX : 217.
— Sereiti Lebrun et Boutique sp. nov., XIX : 213.
Fissidens Gomae P. de la V. et Leroy sp. nov., XVIII : 156.
Flabellariopsis R. Wilczek gen. nov., XXV : 303.
— acuminata (Engl.) R. Wilczek comb. nov., XXV : 304.
Fomes Allardi Bresadola sp. nov., IV : 19.
— pectinatus Kl. var. congoanus Bresadola var. nov., IV : 19.
— versicolor Bresadola sp. nov., VIII : 91.
— wombaliensis Beeli sp. nov., VIII : 258.
Frullania angulata Mitt. var. Goetzeana (Steph.) Demaret et Vanden Berghen comb. nov., XX : 9.
— angulata Mitt. var. laciniata Demaret et Vanden Berghen var. nov., XX : 10.
Funtumia Gilleti (De Wild.) De Wild. comb. nov., II : 350.
— longistipula Steph. var. apiculata Demaret et Vanden Berghen var. nov., XX : 4.

Garcinia bullata Staner sp. nov., XIII : 157.
Geissaspis apiculata De Wild. sp. nov., IV : 104.
— Bakeriana De Wild. sp. nov., IV : 105.
— Chevalieri De Wild. sp. nov., IV : 107.
— ciliato-denticulata De Wild. sp. nov., IV : 108.
— Clevei Harms ex De Wild. sp. nov., IV : 109.
— kapandensis De Wild. sp. nov., IV : 111.
— Kassneri De Wild. sp. nov., IV : 112.
— katangensis De Wild. sp. nov., IV : 113.
— Keili De Wild. sp. nov., IV : 114.
— Ledermanni De Wild. sp. nov., IV : 115.
— luentensis De Wild. sp. nov., IV : 116.
— Maclouniei De Wild. sp. nov., IV : 117.
— Meyeri-Johannis Harms ex De Wild. sp. nov., IV : 119.
— Princei De Wild. sp. nov., IV : 120.

Geissaspis Scott-Ellioti De Wild., IV : 122.
— subscabra De Wild. sp. nov., IV : 123.
— Welwitschii (Taub.) Baker var. kapirensis De Wild. var. nov., IV : 124.
Genyorchis elongata Robyns et Tournay sp. nov., XXV : 257.
Geocardia obvallata (F. Didr.) Brem. comb. nov., XXII : 103.
Gilbertiella Boutique gen. nov., XXI : 124.
— congolana Boutique sp. nov., XXI : 124.
Gilbertiodendron J. Léonard gen. nov., XXII : 188.
— Aylmeri (Hutch. et Dalz.) J. Léonard comb. nov., XXIV : 57.
— barbulatum (Pellegr.) J. Léonard comb. nov., XXIV : 57.
— bilineatum (Hutch. et Dalz.) J. Léonard comb. nov., XXIV : 58.
— brachystegioides (Harms) J. Léonard comb. nov., XXIV : 58.
— demonstrans (Baill.) J. Léonard comb. nov., XXII : 190.
— Dewevrei (De Wild.) J. Léonard comb. nov., XXII : 190.
— Dinklagei (Harms) J. Léonard comb. nov., XXIV : 58.
— grandiflorum (De Wild.) J. Léonard comb. nov., XXII : 190.
— grandistipulatum (De Wild.) J. Léonard comb. nov., XXII : 191.
— imenoense (Pellegr.) J. Léonard comb. nov., XXIV : 58.
— ivorense (A. Chev.) J. Léonard comb. nov., XXIV : 58.
— Klainei (Pierre ex Pellegr.) J. Léonard comb. nov., XXIV : 58.
— limba (Scott Elliot) J. Léonard comb. nov., XXIV : 59.
— limosum (Pellegr.) J. Léonard comb. nov., XXIV : 59.
— mayombense (Pellegr.) J. Léonard comb. nov., XXII : 191.
— ngouniense (Pellegr.) J. Léonard comb. nov., XXIV : 59.
— obliquum (Stapf) J. Léonard comb. nov., XXIV : 59.
— ogoouense (Pellegr.) J. Léonard comb. nov., XXII : 191.
— pachyanthum (Harms) J. Léonard comb. nov., XXIV : 59.
— Preussii (Harms) J. Léonard comb. nov., XXIV : 59.
— quadrifolium (Harms) J. Léonard comb. nov., XXIV : 59.
— splendidum (A. Chev. ex Hutch. et Dalz.) J. Léonard comb. nov., XXIV : 59.
— stipulaceum (Benth.) J. Léonard comb. nov., XXIV : 60.
— Straussianum (Harms) J. Léonard comb. nov., XXIV : 60.
— unijugum (Pellegr.) J. Léonard comb. nov., XXIV : 60.
— Zenkeri (Harms) J. Léonard comb. nov., XXIV : 60.
Gilletia Torrend. gen. nov., IV : 12.
— cinnabarina Torrend sp. nov., IV : 13.

Gilletiodendron Escherichii (Harms) J. Léonard comb. nov., XXI : 408.
— glandulosum (Port.) J. Léonard comb. nov., XXI : 404.
— kisantuense (Verm. apud De Wild.) J. Léonard comb. nov., XXI : 405.
— Pierreanum (Harms) J. Léonard comb. nov., XXI : 406.
Girardinia heterophylla (Vahl) Decne subsp. adoënsis (Hochst. ex Steud.) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 19.
Gisekia africana (Lour.) O. Kuntze var. decagyna Hauman var. nov., XIX : 444.
— paniculata Hauman sp. nov., XIX : 443.
Gladiolus Hockii De Wild. sp. nov., III : 264.
— luembensis De Wild. sp. nov., III : 264.
Glinus microphyllus Hauman sp. nov., XIX : 445.
— oppositifolius (L.) A. DC. var. lanatus Hauman var. nov., XIX : 446.
— oppositifolius (L.) A. DC. var. parvifolius Hauman sp. nov., XIX : 446.
Glycine javanica L. var. paniculata Hauman var. nov., XXV : 94.
— Schliebenii Harms var. enneaneura Hauman var. nov., XXV : 95.
— Schliebenii Harms var. rufescens Hauman var. nov., XXV : 95.
— upembae Hauman sp. nov., XXV : 94.
Gnidia Claessensii Staner sp. nov., XIII : 355.
— Goetzeana Gilg var. marunguensis (Staner) Staner comb. nov., XIII : 352.
Gonatopus Bowini (Decne) Hook. f. var. angustifoliolatus (De Wild.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 588.
Grewia Claessensi De Wild. sp. nov., V : 67.
— Homblei De Wild. sp. nov., V : 68.
— kapiriensis De Wild. sp. nov., V : 69.
— Mortehani De Wild. sp. nov., V : 66.
— trinervia De Wild. sp. nov., V : 67.
Grewiella Dewevrei (De Wild. et Th. Dur.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 70.
— Dewevrei (De Wild. et Th. Dur.) Th. et H. Dur. var. subintegrifolia (De Wild. et Th. Dur.) Th. et H. Dur. var. nov., II : 70.
— globosa (De Wild. et Th. Dur.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 70.

Grimmia perichetialis P. de la V. var. pilifera Demaret var. nov., XXIV : 454.
Grossera Pax sect. Eglandulosae J. Léonard sect. nov., XXV : 318.
— glomeratospicata J. Léonard sp. nov., XXV : 319.
— multinervis J. Léonard sp. nov., XXV : 317.
Grumilea albiflora De Wild. sp. nov., IX : 25.
— aruwimiensis De Wild. sp. nov., IX : 27.
— Bequaerti De Wild. sp. nov., IX : 28.
— Bequaerti De Wild. var. pubescens Robyns var. nov., XVII : 96.
— Chevalieri De Wild. sp. nov., IX : 31.
— ealaensis (De Wild.) De Wild. comb. nov., IX : 33.
— globuloso-baccata De Wild. sp. nov., IX : 35.
— Ileka De Wild. sp. nov., IX : 36.
— ivorensis De Wild. sp. nov., IX : 38.
— Laurentii (De Wild.) De Wild. comb. nov., IX : 40.
— lomamiensis Brem. sp. nov., XXII : 101.
— longipetiolata De Wild. sp. nov., IX : 41.
— quadrangularis De Wild. sp. nov., IX : 45.
— Vermoeseni De Wild. sp. nov., IX : 57.
Guarea Claessensi De Wild. sp. nov., IV : 376.
Guibourtia J. J. Benn. subgen. Gorskia (Bolle) J. Léonard comb. nov., XX : 279.
— subgen. Guibourtia J. Léonard subgen. nov., XX : 278.
— subgen. Pseudocopaiva (Britton et Wilson) J. Léonard comb. nov., XX : 279.
— Arnoldiana (De Wild. et Th. Dur.) J. Léonard comb. nov., XIX : 403.
— Carrissoana (M. A. Exell) J. Léonard comb. nov., XIX : 404.
— Carrissoana (M. A. Exell) J. Léonard var. Gossweileri (M. A. Exell) J. Léonard comb. nov., XIX : 404.
— Chodatiana (Hassler) J. Léonard comb. nov., XIX : 401.
— Chodatiana (Hassler) J. Léonard var. fruticosa (Hassler) J. Léonard comb. nov., XIX : 401.
— coleosperma (Benth.) J. Léonard comb. nov., XIX : 403.
— confertiflora (Benth.) J. Léonard comb. nov., XIX : 401.
— conjugata (Bolle) J. Léonard comb. nov., XIX : 402.
— Demeusei (Harms) J. Léonard comb. nov., XIX : 403.
— Dinklagei (Harms)J. Léonard comb. nov., XIX : 403.
— Ehie (A. Chev.) J. Léonard comb. nov., XIX : 404.
— fissicuspis (Pittier) J. Léonard comb. nov., XIX : 402.
— hymenaefolia (Moric.) J. Léonard comb. nov., XIX : 401.

Guibourtia leonensis J. Léonard sp. nov., XX : 271.
— liberiensis J. Léonard sp. nov., XX : 276.
— Pellegriniana J. Léonard sp. nov., XIX : 405.
— Schliebenii (Harms) J. Léonard comb. nov., XIX : 404.
— Sousae J. Léonard sp. nov., XX : 270.
— Tessmannii (Harms) J. Léonard comb. nov., XIX : 404.
Guignardia perpusilla (Desm.) Verplancke comb. nov., XV : 340.
Gymnosporia beniensis Robyns et Lawalrée sp. nov., XVIII : 269.
Gyrodon kivuensis Heinemann et Goossens sp. nov., XXV : 169.
— lignicola (Kallenbach) Heinemann comb. nov., XXI : 238.
Gyrodontaceae (Singer) Heinemann comb. nov., XXI : 228.
Gyroporus castaneus (Fries) Quélet var. congolensis Heinemann var. nov., XXI : 230.
— castaneus (Fries) Quélet var. microsporus Heinemann var. nov., XXI : 232.
— heterosporus Heinemann sp. nov., XXI : 230.
— laetus Heinemann sp. nov., XXI : 235.
— luteopurpureus (Beeli) Heinemann comb. nov., XXI : 236.
— reticulatus Heinemann sp. nov., XXI : 234.

Hagenia abyssinica (Bruce) Gmel. var. viridifolia Hauman var. nov., XXII : 90.
Hapalosiphon intricatus W. et G. S. West. f. fuscescens Frémy f. nov., IX : 126.
Haplaria lateritia Torrend sp. nov., IV : 11.
Haplosporella Vanderystii Bresadola sp. nov., IV : 9.
Hassallia Rechingeri (Wille) Fremy comb. nov., IX : 122.
Hasskarlia didymostemon Baill. var. dentata De Wild. var. nov., III : 261.
— didymostemon Baill. var. dentata De Wild. f. variabilis De Wild. f. nov., III : 262.
Haumania J. Léonard gen. nov., XIX : 453.
— Liebrechtsiana (De Wild. et Th. Dur.) J. Léonard comb. nov., XIX : 454.
Haydonia Wilczek gen. nov., XXIV : 405.
— monophylla (Taub.) Wilczek comb. nov., XXIV : 406.
— triphylla Wilczek sp. nov., XXIV : 408.
Heckeldora Staudtii (Harms) Staner comb. nov., XVI : 207.
Hedwigia ciliata (Hedw.) Br. et Schpr f. gracilis (Boul.) Demaret comb. nov., XVII : 356.

Heeria abyssinica (Hochst.) O. Kuntze var. lanceolata (Engl.) Th. et H. Dur. var. nov., II : 116.
Helichrysum fulgens Humbert et Staner sp. nov., XIV : 103.
Hendrickxia Duvign. gen. nov., XVI : 357.
— alcicornis Duvign. sp. nov., XVI : 362.
— pseudoreticulata Duvign. sp. nov., XVI : 359.
Herberta Doggeltiana (St.) Demaret comb. nov., XVI : 289.
— lobata (St.) Demaret comb. nov., XVI : 289.
— Stuhlmannii (St.) Demaret comb. nov., XVI : 289.
Hesperhodos mirificus (Greene) Bouleng. comb. nov., XIV : 236.
— stellatus (Woot.) Bouleng. comb. nov., XIV : 234.
— Vernoni (Greene) Bouleng. comb. nov., XIV : 237.
Heteranthaecia guineensis (Franch.) Robyns comb. nov., IX : 201.
Hexalobus Lujai De Wild. sp. nov., IV : 389.
Hibiscus Bequaerti De Wild., sp. nov., V : 35.
— bukamensis De Wild. sp. nov., V : 38.
— diversifolius Jacq. var. Witteanus Hochr. var. nov., XVIII : 276.
— Eetveldeanus De Wild. et Th. Dur. var. asperata De Wild. var. nov., III : 279.
— Hocki De Wild. sp. nov., V : 36.
— Homblei De Wild. sp. nov., V : 37.
— katangensis De Wild. sp. nov., V : 33.
— pycnostemon Hochr. sp. nov., XVIII : 274.
— Vanderysti De Wild. sp. nov., V : 35.
Hildegardia Barteri (Mast.) Kosterm. comb. nov., XXIV: 337.
— erythrosiphon (Baill.) Kosterm. comb. nov., XXIV : 338.
— major (Hand.-Maz.) Kosterm. comb. nov., XXIV : 338.
— Merrittii (Merr.) Kosterm. comb. nov., XXIV : 338
— Migeodii (Exell) Kosterm. comb. nov., XXIV : 337.
Hippocratea semlikiensis Robyns et Tournay sp. nov., XIX : 89.
Hirtella L. subgen. Afrohirtella Hauman subgen. nov., XXI : 178.
— subgen. Euhirtella Hauman subgen. nov., XXI : 177.
— — subgen. Euhirtella Hauman ser. Digitibracteatae Hauman ser. nov., XXI : 177.
— — subgen. Euhirtella Hauman ser. Integribracteatae Hauman ser. nov., XXI : 177.
— bangweolensis (R. E. Fries) Greenway var. glabriuscula Hauman var. nov., XXI : 183.
— Butayei (De Wild.) Brenan var. Greenwayi (Brenan) Hauman comb. nov., XXI : 179.
— fruticulosa Hauman sp. nov., XXI : 182.

Hirtella katangensis Hauman sp. nov., XXI : 179.
— montana Hauman sp. nov., XXI : 180.
Hoffmanniella Schlecht. ex Lawalrée gen. nov., XVII : 59.
— silvatica Schlecht. ex Lawalrée sp. nov., XVII : 60.
Hoslundia opposita Vahl var. velutina De Wild. var. nov., III : 280.
Hugonia Planchonii Hook. f. var. congolensis R. Wilczek var. nov., XXV : 310.
— spicata Oliv. var. grandifolia R. Wilczek var. nov., XXV : 311.
Hunteria densiflora M. Pichon sp. nov., XXIII : 392.
Hutchinsonia Robyns gen. nov., XI : 24.
— barbata Robyns sp. nov., XI : 25.
— cymigera Brem. sp. nov., XXII : 97.
— glabrescens Robyns sp. nov., XI : 28.
Hyalosepalum Troupin nom. nov., XIX : 430.
— caffrum (Miers) Troupin comb. nov., XIX : 431.
— mossambicense (Engl.) Troupin comb. nov., XIX : 430.
— oblongifolium (Engl.) Troupin comb. nov., XIX : 431.
— pallido-aurantiacum (Engl. et Gilg) Troupin comb. nov., XIX : 432.
— penninervifolium Troupin sp. nov., XIX : 432.
— scytophyllum (Diels) Troupin comb. nov., XIX : 431.
— tenerum (Miers) Troupin comb. nov., XIX : 431.
— uviforme (Baill.) Troupin comb. nov., XIX : 431.
Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Dix. f. spinifolium (Schpr) Demaret comb. nov., XVII : 363.
Hygrophila Thonneri De Wild. var. angustifolia De Wild. var. nov., V : 14.
Hymenachne wombaliensis Vanderyst ex Robyns sp. nov., IX : 183.
Hymenostegia brachyura (Harms) J. Léonard comb. nov., XXI : 442.
— Felicis (A. Chev.) J. Léonard comb. nov., XXI : 444.
— Gilleti De Wild. sp. nov., VII : 239.
— mundungu (Pellegr.) J. Léonard comb. nov., XXI : 443.
— neo-aubrevillei J. Léonard sp. nov., XXI : 444.
— Pellegrinii (A. Chev.) J. Léonard comb. nov., XXI : 443.
Hyparrhenia acutispathacea (De Wild.) Robyns var. pilosa Bamps var. nov., XXV : 392.
— parvispiculata Bamps sp. nov., XXV : 391.
Hypericum afropalustre Lebrun et Taton sp. nov., XVIII : 279.
— Humbertii Staner sp. nov., XIII : 69.

Hypholoma murinacea Beeli sp. nov., XV : 41.
Hypocrea rubro-nigrescens Torrend sp. nov., VIII : 76.
Hypoxis luzuloides Robyns et Tournay sp. nov., XXV : 254.
Hysterographium Vanderystii Bresadola sp. nov., IV : 9.

Impatiens Homblei De Wild. sp. nov., V : 39.
— purpureo-violacea Gilg var. longicalcarata G. M. Schulze var. nov., XVIII : 270.
— Wittei G. M. Schulze sp. nov., XVIII : 270.
Indigofera affinis De Wild. sp. nov., VIII : 144.
— Baumiana Harms var. Hocki De Wild. var. nov., VIII : 146.
— Baumiana Harms var. roseo-violacea De Wild. var. nov., VIII : 145.
— carinata De Wild. sp. nov., VIII : 147.
— chirensis Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 263.
— Colutea (Burm.) Merrill var. dembianensis (Chiov.) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 263.
— Colutea (Burm.) Merrill var. somalensis (Baker) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 263.
— condensata De Wild. sp. nov., VIII : 148.
— divaricata De Wild. sp. nov., VIII : 149.
— erythrogramma Welw. var. pauciflora Bak. f. et Martin var. nov., VIII : 151.
— glaucifolia Cronquist sp. nov., XXII : 219.
— gloriosa Cronquist, XXII : 219.
— Homblei Baker f. et Martin sp. nov., VIII : 151.
— kengeleensis De Wild. sp. nov., VIII : 152.
— malongensis Cronquist sp. nov., XXII : 220.
— pauciflora De Wild. sp. nov., VIII : 153.
— petiolata Cronquist sp. nov., XXII : 221.
— podocarpa Baker f. et Martin sp. nov., VIII : 154.
— Quarrei Cronquist sp. nov., XXII : 222.
— radicifera Cronquist sp. nov., XXII : 223.
— ramosa Cronquist sp. nov., XXII : 224.
— repens Cronquist sp. nov., XXII : 225.
— rutshuruensis De Wild. sp. nov., VIII : 155.
— secundiflora Poir. var. rubripilosa De Wild. var. nov., VIII : 156.
— setosissima Harms var. major Cronquist var. nov., XXII : 226.
— subargentea De Wild. sp. nov., VIII : 157.
— wauensis Cronquist sp. nov., XXII : 226.

Indigofera Zenkeri Harms ex Baker f. var. brevifoliolata De Wild. var. nov., VIII : 158.
Inversodicraea congolana Hauman sp. nov., XVII : 179.
— tenuissima Hauman sp. nov., XVII : 180.
Ipomoea Delpierrei De Wild. sp. nov., III : 261.
— Homblei De Wild. sp. nov., V : 39.
Isachne kiyalaensis (Vanderyst) Robyns comb. nov., IX : 199.
Isoglossa cyclophylla Mildbr. sp. nov., XIV : 357.
— Humberti Mildbr. sp. nov., XIV : 358.
— vulcanicola Mildbr. sp. nov., XVII : 88.
— vulcanicola Mildbr. var. eglandulosa Mildbr. var. nov., XVII : 89.

Jasminum Hockii De Wild. sp. nov., III : 279.
Jaumea speciosa Lawalrée sp. nov., XIX : 224.
Julbernardia Baumii (Harms) Troupin comb. nov., XX : 318.
— bifoliolata (Harms) Troupin comb. nov., XX : 319.
— Brieyi (De Wild.) Troupin comb. nov., XX : 311.
— globiflora (Benth.) Troupin comb. nov., XX : 314.
— magnistipulata (Harms) Troupin comb. nov., XX : 314.
— microphylla Troupin sp. nov., XX : 320.
— paniculata (Benth.) Troupin comb. nov., XX : 316.
— Pellegriniana Troupin nom. nov., XX : 311.
— polyphylla (Harms) Troupin comb. nov., XX : 320.
— Seretii (De Wild.) Troupin comb. nov., XX : 312.
Juncus laxus Robyns et Tournay sp. nov., XXV : 252.
Justicia Bequaerti De Wild. sp. nov., IV : 429.
— Claessensi De Wild. sp. nov., V : 11.
— Homblei De Wild. sp. nov., IV : 428.
— kapiriensis De Wild. sp. nov., V : 12.
— latibracteata De Wild. sp. nov., V : 13.
— latibracteata De Wild. var. velutina De Wild. var. nov., V : 14.
— phlomoides Mildbr. sp. nov., XIV : 359.
— pseudoruellia Mildbr. sp. nov., XVII : 91.
— Scaettae Mildbr. sp. nov., XIV : 361.
— Wittei Mildbr. sp. nov., XVII : 92.

Kalanchoë Figuereidoi Croizat sp. nov., XIV : 366.
— Robynsiana Raymond-Hamet sp. nov., XIX : 438.
Kaoue Germainii Wilczek sp. nov., XXI : 353.
Khaya canaliculata De Wild. sp. nov., IV : 377.

Kniphofia Homblei De Wild. sp. nov., V : 3.
Kolobopetalum Chevalieri (Hutch. et Dalz.) Troupin comb. nov., XIX : 423.
Krombholzia excedens Heinemann et Goossens sp. nov., XXI : 327.
— porphyreus Heinemann sp. nov., XXI : 330.

Lablab niger Medic. subsp. bengalensis (Jacq.) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 340.
— niger Medic. var. crenatifructus (Steud. ex Rivals) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 339.
— niger Medic. var. uncinatus (Br. ex Rich.) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 339.
Lachnocladium Vanderystii Bresadola sp. nov., IV : 25.
Lactarius acutus Heim sp. nov., XXV : 73.
— angustus Heim et Goossens sp. nov., XXV : 67.
— caperatus Heim et Goossens sp. nov., XXV : 36.
— chamaeleontinus Heim sp. nov., XXV : 87.
— cinnamomeus Goossens et Heim sp. nov., XXV : 32.
— Corbula Heim et Goossens sp. nov., XXV : 64.
— craterelloides Heim et Goossens sp. nov., XXV : 52.
— fulgens Heim var. africanus Heim var. nov., XXV : 70.
— hispidus Heim sp. nov., XXV : 75.
— inversus Goossens et Heim sp. nov., XXV : 78.
— latifolius Goossens et Heim sp. nov., XXV : 82.
— melanodermus Heim et Goossens sp. nov., XXV : 50.
— nudus Heim sp. nov., XXV : 53.
— Pandani Heim f. aurantiacus Heim f. nov., XXV : 18.
— Pandani Heim f. intermedius Heim f. nov., XXV : 20.
— pellicularis Heim sp. nov., XXV : 85.
— pellucidus Goossens et Heim sp. nov., XXV : 61.
— phlebonemus Heim et Goossens sp. nov., XXV : 38.
— pseudolignyotus Heim sp. nov., XXV : 56.
— unicolor Goossens et Heim sp. nov., XXV : 77.
— velutinus Bresadola sp. nov., IV : 15.
Lactuca attenuata Stebbins sp. nov., XIV : 346.
— attenuatissima Robyns sp. nov., XVII : 106.
— elgonensis Stebbins sp. nov., XIV : 345.
— kenyaensis Stebbins sp. nov., XIV : 224.
— Lebrunii Robyns sp. nov., XVII : 105.
— leptocephala Stebbins sp. nov., XIV : 223.
— semibarbata Stebbins sp. nov., XIV : 348.

Lactuca stipulata Stebbins sp. nov., XIV : 342.
— Vanderysti De Wild. sp. nov., V : 87.
— Wildemaniana Stebbins nom. nov., XIV : 349.
Lagerheimia carbonicola Torrend sp. nov., IV : 29.
Laggera appendiculata Robyns sp. nov., XVII : 100.
Lagynias dryadum (S. Moore) Robyns comb. nov., XI : 315.
Landolphia Claessensi De Wild. sp. nov., V : 104.
Lasiodiscus Gillardini Staner, sp. nov., XV : 409.
— Sereti De Wild. sp. nov., III : 271.
Lasiosphaeria araneosa Torrend sp. nov., IV : 7.
Lastrea Dryopteris (L.) Bory var. robertiana (Hoffm.) Lawalrée comb. nov., XIX : 238.
— Oreopteris (Ehrh.) Bory f. tripinnata (Crépin) Lawalrée comb. nov., XIX : 239.
Lebrunia Staner gen. nov., XIII : 105.
— bushaie Staner sp. nov., XIII : 105.
Lebruniodendron J. Léonard gen. nov., XXI : 421.
— leptanthum (Harms) J. Léonard comb. nov., XXI : 421.
Lejeunea compressistipula (Pears.) Demaret comb. nov., XVI : 301.
Leonotis africana (P. Beauv.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 452.
Lepidobotryaceae J. Léonard fam. nov., XX : 38.
Lepiota minutissima Beeli sp. nov., XV : 28.
Leplaea mayombensis (Pellegrin) Staner comb. nov., XVI : 204.
— mayombensis (Pellegrin) Staner var. coalescens (Vermoesen) Staner comb. nov., XVI : 204.
Leptoderris Claessensi De Wild. sp. nov., VII : 225.
— congolensis (De Wild.) Dunn var. quinquefoliolata De Wild. var. nov., VII : 226.
— coriacea De Wild. sp. nov., VII : 227.
— cylindrica De Wild. sp. nov., VII : 228.
— Dewevrei De Wild. sp. nov., VII : 229.
— ferrugina De Wild. sp. nov., VII : 231.
— Gilleti De Wild. sp. nov., VII : 232.
— Giorgii (De Wild.) De Wild. comb. nov., VII : 233.
— glabrata (Welw.) Dunn var. glaberrima Hauman var. nov., XXIV : 227.
— Klaineana (Pierre) De Wild. comb. nov., VII : 234.
— Laurenti De Wild. sp. nov., VII : 235.
— nobilis (Welw.) Dunn var. latifoliolata Hauman var. nov., XXIV : 227.
— Pynaerti De Wild. sp. nov., VII : 237.

Leptoderris Reygaerti De Wild. sp. nov., VII : 238.
— rutshuruensis Hauman sp. nov., XXIV : 226.
Leptoterantha Louis ex Troupin gen. nov., XIX : 426.
— mayumbensis (Exell) Troupin comb. nov., XIX : 428.
Leucas biglomerulata Lebrun et Toussaint sp. nov., XVII : 68.
Levierella perserrata P. de la V. et Leroy sp. nov., XVIII : 191.
Limeum katangense Hauman sp. nov., XIX : 446.
Lindernia Boutiqueana Germain sp. nov., XXII : 74.
— purpurea (Lebrun et Toussaint) Germain comb. nov., XXII : 75.
Linum Holstii Engl. ex R. Wilczek sp. nov., XXV : 311.
Lipocarpha senegalensis (Lam.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 619.
Lissochilus Corbisieri De Wild. sp. nov., VI : 80.
— Descampsii De Wild. sp. nov., VI : 81.
— faradjensis De Wild. sp. nov., VI : 83.
— Homblei De Wild. sp. nov., VI : 88.
— kapandensis De Wild. sp. nov., VI : 90.
— katentaniensis De Wild. sp. nov., VI : 91.
— kisanfuensis De Wild. sp. nov., VI : 93.
— Laurenti De Wild. sp. nov., VI : 94.
— Sapini De Wild. sp. nov., VI : 103.
— subintegrus De Wild. sp. nov., VI : 106.
— vermiculatus De Wild. sp. nov., VI : 107.
Listrostachys angustifolia De Wild. nom. nov., V : 181.
— canaliculata De Wild. nom. nov., V : 183.
— cordatiglandula De Wild. nom. nov., V : 184.
— ealaensis De Wild. nom. nov., V : 185.
— injoloensis De Wild. nom. nov., V : 187.
— latibracteata De Wild. nom. nov., V : 188.
— Sereti De Wild. nom. nov., V : 191.
— Solheidi De Wild. nom. nov., V : 191.
— subcylindrifolia De Wild. nom. nov., V : 192.
Lobelia Sapini De Wild. sp. nov., III : 261.
Loesenera Walkeri (A. Chev.) J. Léonard comb. nov., XXI : 433.
Lonchocarpus Goossensii Hauman sp. nov., XXIV : 223.
Lopholejeunea Jonesii Vanden Berghen sp. nov., XX : 178.
— obtusilacera Herz. sp. nov., XX : 172.
Loranthus Albizziae De Wild. var. glabrescentiflorus Balle var. nov., XVII : 233.
— Albizziae De Wild. var. ternatus Balle var. nov., XVII : 234.
— Becquetii Balle sp. nov., XVII : 241.

Loranthus Boonei De Wild. sp. nov., IV : 412.
— Brideliae Balle sp. nov., XVII : 242.
— Brideliae Balle var. oblongifolius Balle var. nov., XVII : 243.
— Brieyi De Wild. sp. nov., IV : 410.
— Callewaertii Balle sp. nov., XVII : 234.
— Edouardii Balle sp. nov., XVII : 235.
— elegantiflorus Balle sp. nov., XVII : 231.
— Eminii Engl. f. cinereus Balle f. nov., XVII : 236.
— Eminii Engl. f. rufescens Balle f. nov., XVII : 236.
— falcifolius Sprague var. katangensis Balle var. nov., XVII : 235.
— Flamignii De Wild. sp. nov., IV : 413.
— gibbosulus Balle sp. nov., XVII : 238.
— gibbosulus Balle var. grandiflorus Balle var. nov., XVII : 239.
— Giorgii Balle sp. nov., XVII : 239.
— glomeratus Engl. var. grandiflorus Balle var. nov., XVII : 236.
— ikelembensis De Wild. sp. nov., III : 256.
— ituriensis De Wild. var. coriaceifolius Balle var. nov., XVII : 237.
— ituriensis De Wild. var. desquamatus Balle var. nov., XVII : 238.
— kapiriensis Balle sp. nov., XVII : 243.
— kisantuensis De Wild. var. erectilobi Balle var. nov., XVII : 240.
— Lamborayi De Wild. sp. nov., IV : 422.
— luteoflorus De Wild. sp. nov., IV : 410.
— marginatus De Wild. sp. nov., IV : 419.
— mayombensis De Wild. var. acutifolius Balle var. nov., XVII : 232.
— melanocarpus Balle sp. nov., XVII : 230.
— Mortehani De Wild. sp. nov., IV : 423.
— mweroensis Bak. var. kivuensis Balle var. nov., XVII : 232.
— myrsinifolius Engl. et Krause var. Humbertii Balle var. nov., XVII : 244.
— petiolatus De Wild., sp. nov., IV : 416.
— quinquenervius De Wild. sp. nov., IV : 416.
— Redingi De Wild. sp. nov., IV : 412.
— regularis Steud. ex Schwfth var. pilosus (Pax) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 31.
— Reygaerti De Wild. sp. nov., IV : 420.
— sankuruensis De Wild. sp. nov., IV : 418.
— Sapini De Wild. sp. nov., IV : 415.

Loranthus Sereti De Wild. sp. nov., IV : 411.
— sphaerico-compressus De Wild. sp. nov., IV : 418.
— subquadrangularis De Wild. sp. nov., IV : 424.
— uelensis Balle sp. nov., XVII : 237.
— Vanderysti De Wild. sp. nov., IV : 421.
— Verschuereni De Wild. sp. nov., IV : 421.
Lotus Becquetii Boutique sp. nov., XXIII : 234.
— brachycarpus Hochst. et Steud. ex Rich. var. montanus (Rich.) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 257.
— Lebrunii Boutique sp. nov., XXIII : 233.
— subdigitatus Boutique sp. nov., XXIII : 234.
Louisiella C. E. Hubbard et J. Léonard gen. nov., XXII : 316.
— fluitans C. E. Hubbard et J. Léonard sp. nov., XXII : 317.
Ludwigia Humbertii Robyns et Lawalrée sp. nov., XVIII : 291.

Maba Laurenti De Wild. sp. nov., V : 64.
Macrolobium Bonnivairi De Wild. sp. nov., VII : 256.
— crassifolium (Baill.) J. Léonard comb. nov., XXIV : 61.
— isopetalum Harms var. macranthum J. Léonard var. nov., XXII : 186.
— Lebrunii J. Léonard sp. nov., XXII : 186.
— Malchairi De Wild. sp. nov., VII : 255.
Macrosphyra Redingi De Wild. sp. nov., V : 25.
Maerua angolensis DC. var. subtomentosa Wilczek var. nov., XX : 186.
— Becquetii Wilczek sp. nov., XX : 187.
— elegans Wilczek sp. nov., XX : 186.
— Robynsii Wilczek sp. nov., XX : 188.
— virgata Gilg var. glabra Wilczek var. nov., XX : 187.
Maesobotrya Benth. sect. Isandrion (Baill.) J. Léonard comb. nov., XVII : 256.
— — sect. Staphysora (Pierre) J. Léonard comb. nov., XVII : 256.
— cordulata J. Léonard sp. nov., XVII : 259.
— floribunda Benth. var. Vermeuleni (De Wild.) J. Léonard comb. nov., XVII : 258.
— floribunda Benth. var. villosa J. Léonard var. nov., XVII : 257.
Magnistipula cuneatifolia Hauman sp. nov., XXI : 175.
— Fleuryana (A. Chev.) Hauman comb. nov., XXI : 175.
— Sapini De Wild. sp. nov., III : 262.
Malouetia sect. Dialylepis M. Pichon sect. nov., XXII : 121.

Malouetia sect. Phalacrogyne M. Pichon sect. nov., XXII : 118.
— sect. Tomaiosperma A. DC. ser. Africanae M. Pichon ser. nov., XXII : 120.
— sect. Tomaiosperma A. DC. ser. Exsertae M. Pichon ser. nov., XXII : 120.
— sect. Tomaiosperma A. DC. ser. Inclusae M. Pichon ser. nov., XXII : 119.
— sect. Tomaiosperma A. DC. ser. Tamaquarinae (Woodson) M. Pichon stat. nov., XXII : 120.
— sect. Woodsonia M. Pichon sect. nov., XXII : 121.
— brachyloba M. Pichon sp. nov., XXII : 129.
Malouetiella M. Pichon gen. nov., XXII : 131.
— Mildbraedii (Gilg et Stapf) M. Pichon comb. nov., XXIV : 219.
— parviflora M. Pichon sp. nov., XXII : 133.
Mammea Gilletii De Wild. sp. nov., IV : 168.
— Giorgiana De Wild. sp. nov., IV : 169.
Manotes lomamiensis Troupin sp. nov., XXI : 366.
Marasmius njalaensis Beeli sp. nov., XV : 35.
— sierraleonis Beeli sp. nov., XV : 36.
— subrotula Beeli sp. nov., XV : 36.
Mareya micrantha (Benth.) Müll.-Arg. subsp. congolensis J. Léonard subsp. nov., XXV : 292.
Mariscus Bequaerti Cherm. sp. nov., XIV : 329.
— ligularis (L.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 597.
— Quarrei Cherm. sp. nov., XIII : 277.
Medinilla afromontana Lebrun et Taton sp. nov., XVIII : 290.
Megaclinium bambiliense De Wild. nom. nov., V : 174.
— Brixhei De Wild. nom. nov., V : 174.
— ealaense De Wild. nom. nov., V : 175.
— injoloense De Wild. nom. nov., V : 175.
— intermedium De Wild. nom. nov., V : 176.
— Jesperseni De Wild. nom. nov., V : 176.
— minutum Rolfe var. purpureum De Wild. var. nov., III : 255.
— Sereti De Wild. nom. nov., V : 177.
— Solheidi De Wild. nom. nov., V : 178.
— zobiaense De Wild. nom. nov., V : 178.
Megalonectria nigra Torrend sp. nov., IV : 8.
Melinis Maitlandii Stapf et Hubbard f. mutica (Chiov.) Robyns comb. nov., IX : 197.
Meliola bicornis var. Milletiae Beeli var. nov., VII : 94.

Meliola bicornis var. Tephrosiae Beeli var. nov., VIII : 1.
— densa var. Convolvuli Beeli var. nov., VIII : 2.
— desmodiicola Beeli sp. nov., VII : 94.
— Funtumiae Beeli sp. nov., VII : 95.
— Henningsii Beeli nom. nov., VII : 100.
— hyptidicola var. wombalensis Beeli var. nov., VII : 95.
— intricata var. major Beeli var. nov., VII : 96.
— ipomoeicola Beeli sp. nov., VII : 96.
— malacotricha var. major Beeli var. nov., VII : 96.
— perpusilla var. congoensis Beeli var. nov., VII : 97.
— sakawensis var. longispora Beeli var. nov., VII : 98.
— Stevensii Beeli sp. nov., VII : 98.
— Trichiliae Beeli sp. nov., VII : 99.
— Triumfettae var. Vanderystii Beeli var. nov., VII : 100.
— Zollingeri Gail. var. minor Beeli var. nov., VII : 100.
Meliolinopsis Beeli gen. nov., VII : 101.
— megalospora (Rehm) Beeli stat. nov., VII : 101.
Melothria Gilletii De Wild. var. hirtella Cogn. var. nov., IV : 219.
— Louisii Robyns sp. nov., XVII : 96.
Memecylon acutifolium De Wild. sp. nov., V : 76.
— Boonei De Wild. sp. nov., IV : 425.
— Claessensi De Wild. sp. nov., IV : 426.
— Reygaerti De Wild. sp. nov., IV : 425.
Merremia Sapini De Wild. sp. nov., III : 260.
— umbellata (G. Meyer) Hall. f. var. minor De Wild. var. nov., III : 260.
Metzgeria propagulifera Vanden Berghen sp. nov., XIX : 194.
Meyna comorensis Robyns sp. nov., XI : 233.
— grisea (King et Gamble) Robyns comb. nov., XI : 240.
— laxiflora Robyns sp. nov., XI : 228.
— parviflora Robyns sp. nov., XI : 232.
— peltata Robyns sp. nov., XI : 240.
— Pierrei Robyns sp. nov., XI : 236.
— pubescens (Kurz) Robyns comb. nov., XI : 235.
— spinosa Roxb. var. pubescens Robyns var. nov., XI : 231.
— tetraphylla (Schweinf.) Robyns comb. nov., XI : 233.
— velutina Robyns sp. nov., XI : 237.
Micropeltis congoensis Beeli sp. nov., VIII : 4.
— dubia Beeli sp. nov., VIII : 5.
— Wildemani Beeli sp. nov., VIII : 4.

Microstegium aristulatum Robyns et Tournay sp. nov., XXV : 240.
Microthyrium longisporum var. congoensis Beeli var. nov., VIII, 3.
Mimulopsis dasyphylla Mildbr. sp. nov., XIV : 355.
— velutinella Mildbr. sp. nov., XVII : 86.
— violacea Lindau var. kivuensis Mildbr. var. nov., XVII : 88.
— violacea Lindau var. mikenica Mildbr. var. nov., XVII : 87.
Mittenothamnium glabrifolium (C. Müll.) Demaret comb. nov., XVIII : 56.
Mniobryum delicatulum (Hedw.) Demaret comb. nov., XVII : 346.
Moghania rhodocarpa (Bak.) Hauman var. glabrescens Hauman var. nov., XXV : 124.
Momordica multicrenulata Cogn. sp. nov., V : 110.
— parvifolia Cogn. sp. nov., V : 110.
— Wildemaniana Cogn. sp. nov., IV : 220.
Monodora Claessensii De Wild. sp. nov., III : 263.
— Louisii Boutique sp. nov., XXI : 97.
Monopetalanthus Trapnellii J. Léonard sp. nov., XXI : 133.
Monotes Gilleti De Wild. sp. nov., V : 56.
— Homblei De Wild. sp. nov., V : 55.
Mostuea Vankerckhoveni De Wild. sp. nov., V : 15.
Mucuna coriacea Baker var. glabrialata Hauman var. nov., XXV : 99.
— longipedicellata Hauman sp. nov., XXV : 98.
— Pesa De Wild. var. glabrescens Hauman var. nov., XXV : 99.
Musa ruandensis De Wild. sp. nov., VIII : 111.
— rubronervata De Wild. sp. nov., VIII : 112.
Mussaenda angolensis Wernham var. Redheadii Petit var. nov., XXV : 163.
— leucophylla Petit sp. nov., XXV : 156.
— paludosa Petit sp. nov., XXV : 164.
Mycena Deightonii Beeli sp. nov., XV : 33.
— sierraleonis Beeli sp. nov., XV : 34.
Myrianthus scandens Louis ex Hauman sp. nov., XIX : 62.

Naucoria glaucospora Beeli sp. nov., XV : 39.
Nelmesia Van der Veken gen. nov., XXV : 143.
— melanostachya Van der Veken sp. nov., XXV : 143.
Neochevalierodendron J. Léonard gen. nov., XXI : 428.
— Stephanii (A. Chev.) J. Léonard comb. nov., XXI : 429.

Neorautanenia pseudopachyrhiza (Harms) Milne-Redh. var. Ellenbeckii (Harms) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 315.
Neostachyanthus occidentalis Kray et Miège sp. nov., XXV : 271.
Nidorella spartioides (Hoffm.) Cronquist comb. nov., XXII : 310.
Nuxia Gilletii De Wild. sp. nov., V : 15.

Ochna bracteosa Robyns et Lawalrée sp. nov., XVIII : 278.
— Hackarsii Robyns et Lawalrée sp. nov., XVIII : 277.
Ochthocosmus africanus Hook. f. var. puberulus R. Wilczek var. nov., XXV : 310.
— glaber R. Wilczek sp. nov., XXV : 308.
Ocotea angustitepala (Krause) Robyns et Wilczek comb. nov., XX : 213.
— kenyensis (Chiov.) Robyns et Wilczek comb. nov., XX : 212.
— Michelsonii Robyns et Wilczek sp. nov., XIX : 457.
— viridis Kosterm. nom. nov., XV : 83.
Octoknema Hulstaertiana Germain sp. nov., XXV : 261.
Octomeron Robyns gen. nov., XVII : 28.
— montanum Robyns sp. nov., XVII : 29.
Okoubaka Aubrevillei Pellegr. et Normand var. glabrescentifolia J. Léonard var. nov., XVIII : 150.
— Michelsonii J. Léonard et Troupin sp. nov., XX : 12.
Oligotrichum africanum P. de la V. sp. nov., XXIV : 235.
Oncinotis Malchairi De Wild. sp. nov., V : 104.
— nigra M. Pichon sp. nov., XXIV : 19.
— obovata De Wild. sp. nov., V : 103.
— Pontyi Dubard var. (?) breviloba M. Pichon var. nov., XXIV : 28.
Oncocalamus Djodu De Wild. sp. nov., V : 146.
Ophioglossum Louisii Taton sp. nov., XVII : 118.
Ophionectria palmarum Torrend sp. nov., IV : 8.
Opilia Bruneeli De Wild. sp. nov., IV : 366.
Ormocarpum pubescens (Hochst.) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 294.
— sennoides (Willd.) DC. subsp. hispidum (Willd.) Brenan et Léonard comb. nov., XXIV : 104.
— verrucosum P. Beauv. var. wombaliense J. Léonard var. nov., XXIV : 103.
Orthantera Butayei (De Wild.) Werd. comb. nov., XV : 240.
Orthosiphon Welwitschii Rolfe var. oblongifolius (Briq.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 447.

Orthotrichum fallax Bruch var. commune (Vent.) Demaret comb. nov., XVII : 353.
— octoblephare Brid. var. fastigiatum (Bruch) C. Jens. f. appendiculatum (Schpr) Demaret comb. nov., XVII : 354.
— striatum Hedw. f. densum (Vent.) Demaret comb. nov., XVII : 354.
Osbeckia elegans Robyns et Lawalrée sp. nov., XVIII : 289.
— Homblei De Wild. sp. nov., V : 77.
— Lebrunii Robyns et Lawalrée sp. nov., XVIII : 288.
Ostryoderris lucida (Welw.) Bak. f. var. intermedia Hauman var. nov., XXIV : 228.
Otiophora Burttii Milne-Redhead sp. nov., XVIII : 103.
Otomeria Benth. subgen. Neotomeria Verdcourt subgen. nov., XXIII : 17.
— subgen. Neotomeria Verdcourt sect. Dimorphi Verdcourt sect. nov., XXIII : 24.
— subgen. Neotomeria Verdcourt sect. Monomorphi Verdcourt sect. nov., XXIII : 18.
— subgen. Volubiles Verdcourt subgen. nov., XXIII : 26.
— elatior (A. Rich. ex DC.) Verdcourt comb. nov., XXIII : 18.
— elatior (A. Rich. ex DC.) Verdcourt f. speciosa (Baker) Verdcourt comb. nov., XXIII : 23.
Oubanguia Laurentii (De Wild.) De Wild. ex Th. et H. Dur. comb. nov., II : 67.
Ouratea Dupuisii (Van Tiegh.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 87.
— longipes (Van Tiegh.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 88.
Oxygonum Callensii Robyns et Petit sp. nov., XXIV : 6.
— Humbertii Robyns sp. nov., XVII : 160.
— ovalifolium Robyns et Petit sp. nov., XXIV : 7.
— Overlaetii Robyns sp. nov., XVII : 162.
— Vanderystii Robyns sp. nov., XVII : 161.
Oxymitra grandiflora Boutique sp. nov., XXI : 116.
Oxyrrhynchium porothamnioides P. de la V. et Leroy sp. nov., XVIII : 186.
Oxystigma Mafuta De Wild. sp. nov., VII : 245.
— Mortehani De Wild. sp. nov., VII : 246.

Pachystigma Hochst. subgen. Eupachystigma Robyns subgen. nov., XI : 120.
— subgen. Pseudopachystigma Robyns subgen. nov., XI : 119.
— Bowkeri Robyns sp. nov., XI : 128.

Pachystigma caffrum (Sim) Robyns comb. nov., XI : 120.
— coeruleum Robyns sp. nov., XI : 129.
— cymosum Robyns sp. nov., XI : 127.
— macrocalyx (Sond.) Robyns comb. nov., XI : 130.
— pygmaeum (Schlecht.) Robyns comb. nov., XI : 122.
— rhodesianum (S. Moore) Robyns sp. nov., XI : 119.
— Thamnus Robyns sp. nov., XI : 121.

Pancovia Lujai De Wild. sp. nov., IV : 372.
— Mortehani De Wild. sp. nov., IV : 373.

Pandiaka aristata Suessenguth sp. nov., XV : 64.
— glabra (Suessenguth) Hauman comb. nov., XVIII : 113.
— Heudelotii Hook. f. var. spicata Suessenguth var. nov., XV : 65.
— Heudelotii Hook. f. var. subglobosa Suessenguth var. nov., XV : 66.
— Heudelotii Hook. f. var. subglobosa Suessenguth f. rubella Suessenguth f. nov., XV : 66.
— Kassneri Suessenguth sp. nov., XV : 66.
— lanata (Schinz) Hauman comb. nov., XVIII : 113.
— obovata Suessenguth sp. nov., XV : 67.
— polystachya Suessenguth sp. nov., XV : 67.
— Schweinfurthii Clarke var. glabra Schinz ex Suessenguth var. nov., XV : 68.
— trichinioides Suessenguth sp. nov., XV : 68.

Paraknoxia Brem. gen. nov., XXII : 77.
— ruziziensis Brem. sp. nov., XXII : 77.

Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske var. subalpinum (Milde) Demaret comb. nov., XVII : 328.
— longifolium (Hedw.) Loeske f. hamatum (Jur.) Demaret comb. nov., XVII : 328.

Paramacrolobium J. Léonard gen. nov., XXIV : 348.
— coeruleum (Taub.) J. Léonard comb. nov., XXIV : 348.

Parapentas Battiscombei Verdcourt sp. nov., XXIII : 54.
— procurrens (K. Schum.) Verdcourt comb. nov., XXIII : 55.
— setigera (Hiern) Verdcourt comb. nov., XXIII : 57.

Parinari Aublet subgen. Euparinari Hauman subgen. nov., XXI : 190.
— subgen. Neocarya (DC.) Hauman stat. nov., XXI : 189.
— subgen. Pellegriniella Hauman subgen. nov., XXI : 188.
— subgen. Sarcostegia (Benth.) Hauman stat. nov., XXI : 18.5

Parinari Bequaerti De Wild. var. longistaminea Hauman var. nov., XXI : 188.
— robusta Oliv. var. glabrifolia Hauman var. nov., XXI : 187.
Parinarium congolanum Th. et H. Dur. nom. nov., II : 189.
— gabonense Engl. var. mayombense De Wild. var. nov., IV : 79.
Parkia Clappertoniana Keay sp. nov., XXV : 209.
Paropsia grewioides Welw. ex Mast. var. condensata (De Wild.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 222.
Pavetta L. subgen. Dizygoon Brem. subgen. nov., XIV : 306.
— Boonei De Wild. sp. nov., V : 26.
— Claessensi De Wild. sp. nov., V : 27.
— esculenta De Wild. sp. nov., V : 27.
— kabarensis Brem. sp. nov., XIV : 310.
— Lebrunii Brem. sp. nov., XIV : 309.
— lomamiensis Brem. sp. nov., XXII : 99.
— Malchairi De Wild. sp. nov., V : 28.
— orthanthera Brem. sp. nov., XIV : 307.
— virungensis Brem. sp. nov., XIV : 307.
Pellegriniodendron J. Léonard gen. nov., XXV : 203.
— diphyllum (Harms) J. Léonard comb. nov., XXV : 203.
Pennisetum Scaettae Robyns sp. nov., XIII : 3.
Pentadesma Exelliana Staner sp. nov., XIII : 151.
— Lebrunii Staner sp. nov., XIII : 149.
Pentanisia Harv. subgen. Holocarpa (Baker) Verdcourt stat. nov., XXII : 265.
— subgen. Micropentanisia Verdcourt subgen. nov., XXII : 263.
— subgen. Ouranogyne Verdcourt subgen. nov., XXII : 274.
— sect. Axillares Verdcourt sect. nov., XXII : 259.
— sect. Repentes Verdcourt sect. nov., XXII : 262.
— confertifolia (Baker) Verdcourt f. glabrifolia Verdcourt f. nov., XXII : 273.
— longepedunculata Verdcourt sp. nov., XXII : 278.
— prunelloides Walp. subsp. latifolia (Hochst.) Verdcourt stat. nov., XXII : 250.
— renifolia Verdcourt sp. nov., XXII : 271.
— Schweinfurthii Hiern var. puberula Verdcourt var. nov., XXII : 258.
— Sykesii Hutch. subsp. otomerioides Verdcourt subsp. nov., XXII : 268.
Pentas Benth. subgen. Chamaepentadoides Verdcourt subgen. nov., XXIII : 277.

Pentas subgen. Longiflora VERDCOURT subgen. nov., XXIII : 281.
— subgen. Megapentas VERDCOURT subgen. nov., XXIII : 269.
— subgen. Phyllopentas VERDCOURT subgen. nov., XXIII : 254.
— subgen. Vignaldiopsis VERDCOURT subgen. nov., XXIII : 261.
— subgen. Pentas sect. Coccineae VERDCOURT sect. nov., XXIII : 296.
— subgen. Pentas sect. Hirtistylus VERDCOURT sect. nov., XXIII : 315.
— subgen. Pentas sect. Monomorphi VERDCOURT sect. nov., XXIII : 307.
— subgen. Pentas sect. Papillopilosa VERDCOURT sect. nov., XXIII : 316.
— angustifolia (A. RICH. ex DC.) VERDCOURT comb. nov., XXIII : 312.
— austroörientalis HOMOLLE et VERDCOURT sp. nov., XXIII : 261.
— Bussei KRAUSE f. brevituba VERDCOURT f. nov., XXIII : 302.
— Bussei KRAUSE f. glabra VERDCOURT f. nov., XXIII : 302.
— Bussei KRAUSE f. minor VERDCOURT f. nov., XXIII : 302.
— Decaryana HOMOLLE ex VERDCOURT sp. nov., XXIII : 353.
— decora S. MOORE var. lasiocarpa VERDCOURT var. nov., XXIII : 293.
— decora S. MOORE var. triangularis (DE WILD.) VERDCOURT comb. nov., XXIII : 291.
— decora S. MOORE f. opposita VERDCOURT f. nov., XXIII : 290.
— geophila VERDCOURT sp. nov., XXIII : 293.
— hindoioides K. SCHUM. var. glabrescens VERDCOURT var. nov., XXIII : 281.
— hindoioides K. SCHUM. var. parensis A. PETER ex VERDCOURT var. nov., XXIII : 281.
— hindoioides K. SCHUM. var. Williamsii VERDCOURT var. nov., XXIII : 279.
— ionolaena K. SCHUM. subsp. madagascariensis VERDCOURT subsp. nov., XXIII : 257.
— ionolaena K. SCHUM. subsp. Schumanniana (K. KRAUSE) VERDCOURT comb. nov., XXIII : 256.
— lanceolata (FORSK.) DEFLERS subsp. cymosa (KLOTZSCH) VERDCOURT comb. nov., XXIII : 345.
— lanceolata (FORSK.) DEFLERS subsp. cymosa (KLOTZSCH) VERDCOURT var. cult. carnea (BENTH.) VERDCOURT comb. nov., XXIII : 345.

Pentas lanceolata (Forsk.) Deflers subsp. longituba Verdcourt subsp. nov., XXIII : 344.
— lanceolata (Forsk.) Deflers subsp. Quartiniana (A. Rich.) Verdcourt comb. nov., XXIII : 346.
— lanceolata (Forsk.) Deflers subsp. Quartiniana (A. Rich.) Verdcourt var. alba Verdcourt var. nov., XXIII : 349.
— lanceolata (Forsk.) Deflers subsp. Quartiniana (A. Rich.) Verdcourt var. leucaster (Krause) Verdcourt comb. nov., XXIII : 347.
— lanceolata (Forsk.) Deflers subsp. Quartiniana (A. Rich.) Verdcourt var. nemerosa (Chiov.) Verdcourt comb. nov., XXIII : 349.
— lanceolata (Forsk.) Deflers subsp. Quartiniana (A. Rich.) Verdcourt var. oncostipula (K. Schum.) Verdcourt comb. nov., XXIII : 351.
— lanceolata (Forsk.) Deflers subsp. Quartiniana (A. Rich.) Verdcourt var. oncostipula (K. Schum.) Verdcourt f. velutina Verdcourt f. nov., XXIII : 353.
— lanceolata (Forsk.) Deflers subsp. Quartiniana (A. Rich.) Verdcourt var. usambarica Verdcourt var. nov., XXIII : 351.
— lanceolata (Forsk.) Deflers var. membranacea Verdcourt var. nov., XXIII : 344.
— lanceolata (Forsk.) Deflers f. velutina Verdcourt f. nov., XXIII : 344.
— longiflora Oliv. f. glabrescens Verdcourt f. nov., XXIII : 286.
— micrantha Baker subsp. Wyliei (N. E. Brown) Verdcourt comb. nov., XXIII : 308.
— nobilis S. Moore var. grandifolia Verdcourt var. nov., XXIII : 275.
— parvifolia Hiern f. intermedia Verdcourt f. nov., XXIII : 305.
— parvifolia Hiern f. spicata Verdcourt f. nov., XXIII : 306.
— pubiflora S. Moore subsp. bamendensis Verdcourt subsp. nov., XXIII : 329.
— purpurea Oliv. subsp. Mechowiana (K. Schum.) Verdcourt comb. nov., XXIII : 334.
— Purseglovei Verdcourt sp. nov., XXIII : 329.
— Schimperiana (A. Rich.) Vatke subsp. occidentalis (Hook. f.) Verdcourt comb. nov., XXIII : 266.
— zanzibarica (Klotzsch) Vatke var. intermedia Verdcourt var. nov., XXIII : 324.

Pentas zanzibarica (Klotzsch) Vatke var. latifolia Verdcourt var. nov., XXIII : 326.
— zanzibarica (Klotzsch) Vatke var. membranacea Verdcourt var. nov., XXIII : 323.
— zanzibarica (Klotzsch) Vatke var. milangiana Verdcourt var. nov., XXIII : 326.
— zanzibarica (Klotzsch) Vatke var. pembensis Verdcourt var. nov., XXIII : 324.
— zanzibarica (Klotzsch) Vatke var. rubra Verdcourt var. nov., XXIII : 322.

Peperomia dubia Balle sp. nov., XVI : 400.
— ulugurensis Engl. var. acutifolia Balle var. nov., XVI : 391.
— ulugurensis Engl. var. diversifolia Balle var. nov., XVI : 391.
— ulugurensis Engl. var. ukingensis (Engl.) Balle comb. nov., XVI : 391.

Peponia grandiflora Cogn. sp. nov., IV : 223.

Perotis patens Gandoger var. parvispicula Hubbard var. nov., XXV : 241.
— spicata (L.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 628.

Pestalotia aeruginea Steyaert sp. nov., XIX : 186.
— carbonacea Steyaert sp. nov., XIX : 183.
— mayumbensis Steyaert sp. nov., XIX : 176.
— Theae Saw. var. minor Steyaert var. nov., XIX : 184.

Pestalotiopsis Steyaert gen. nov., XIX : 300.
— — sect. Bisetulatae Steyaert sect. nov., XIX : 301.
— — sect. Monosetulatae Steyaert sect. nov., XIX : 301.
— — sect. Monosetulatae Steyaert subsect. Ramulosae Steyaert subsect. nov., XIX : 301.
— — sect. Monosetulatae Steyaert subsect. Simplices Steyaert subsect. nov., XIX : 301.
— — sect. Multisetulatae Steyaert sect. nov., XIX : 302.
— — sect. Trisetulatae Steyaert sect. nov., XIX : 301.
— — sect. Trisetulatae Steyaert subsect. Concolores Steyaert subsect. nov., XIX : 301.
— — sect. Trisetulatae Steyaert subsect. Concolores Steyaert groupe Fusiformes Steyaert groupe nouv., XIX : 301.
— — sect. Trisetulatae Steyaert subsect. Concolores Steyaert groupe Fusiformes Steyaert sous-groupe Non-Spathulatae Steyaert sous-groupe nouv., XIX : 301.

Pestalotiopsis Steyaert sect. Trisetulatae Steyaert subsect. Concolores Steyaert groupe Fusiformes Steyaert sous-groupe Spathulatae Steyaert sous-groupe nouv., XIX : 301.
— — sect. Trisetulatae Steyaert subsect. Versicolores Steyaert subsect. nov., XIX : 301.
— — sect. Trisetulatae Steyaert subsect. Versicolores Steyaert groupe Claviformes Steyaert groupe nouv., XIX : 302.
— — sect. Trisetulatae Steyaert subsect. Versicolores Steyaert groupe Claviformes Steyaert sous-groupe Non-Spathulatae Steyaert sous-groupe nouv., XIX : 302.
— — sect. Trisetulatae Steyaert subsect. Versicolores Steyaert groupe Claviformes Steyaert sous-groupe Spathulatae Steyaert sous-groupe nouv., XIX : 302.
— — sect. Trisetulatae Steyaert groupe Claviformes Steyaert groupe nouv., XIX : 301.
— — sect. Trisetulatae Steyaert subsect. Versicolores Steyaert groupe Fusiformes Steyaert groupe nouv., XIX : 301.
— — sect. Trisetulatae Steyaert subsect. Versicolores Steyaert groupe Fusiformes Steyaert sous-groupe Non-Spathulatae Steyaert sous-groupe nouv., XIX : 301.
— — sect. Trisetulatae Steyaert subsect. Versicolores Steyaert groupe Fusiformes Steyaert sous-groupe Spathulatae Steyaert sous-groupe nouv., XIX : 302.
— aeruginea (Steyaert) Steyaert comb. nouv., XIX : 322.
— annulata (Berk. et Curt.) Steyaert comb. nov., XIX : 316.
— aquatica (Ell. et Ev.) Steyaert comb. nov., XIX : 334.
— baarnensis Steyaert sp. nov., XIX : 342.
— breviseta (Sacc.) Steyaert comb. nov., XIX : 316.
— Calabae (West.) Steyaert comb. nov., XIX : 308.
— carbonacea (Steyaert) Steyaert comb. nov., XIX : 335.
— clavispora (Atk.) Steyaert comb. nov., XIX : 335.
— crassiuscula Steyaert sp. nov., XIX : 338.
— cruenta (Syd.) Steyaert comb. nov., XIX : 318.
— dichaeta (Speg.) Steyaert comb. nov., XIX : 308.
— disseminata (Thuem.) Steyaert comb. nov., XIX : 319.
— Fici Steyaert sp. nov., XIX : 324.
— foedans (Sacc. et Ell.) Steyaert comb. nov., XIX : 329.
— funerea (Desm.) Steyaert comb. nov., XIX : 340.
— funerioides Steyaert sp. nov., XIX : 345.
— gallica Steyaert sp. nov., XIX : 308.
— glandicola (Cast.) Steyaert comb. nov., XIX : 330.

Pestalotiopsis gracilis (Kleb.) Steyaert comb. nov., XIX : 310.
— Guepini (Desm.) Steyaert comb. nov., XIX : 312.
— hypodermia (Niessl.) Steyaert comb. nov., XIX : 328.
— Ilicis (West.) Steyaert comb. nov., XIX : 340.
— japonica (Syd.) Steyaert comb. nov., XIX : 335.
— Karstenii (Sacc. et Syd.) Steyaert comb. nov., XIX : 305.
— Leucothoes (White) Steyaert comb. nov., XIX : 319.
— macrospora (Ces.) Steyaert comb. nov., XIX : 344.
— maculiformans (Guba et Zeller) Steyaert comb. nov., XIX : 329.
— Mangiferae (P. Henn.) Steyaert comb. nov., XIX : 320.
— mayumbensis (Steyaert) Steyaert comb. nov., XIX : 320.
— monochaetioides (Doyer) Steyaert comb. nov., XIX : 309.
— natalensis (Van Beyma) Steyaert comb. nov., XIX : 344.
— oxyanthi (Thuem.) Steyaert comb. nov., XIX : 329.
— Paeoniae (Servazzi) Steyaert comb. nov., XIX : 312.
— Palmarum (Cke) Steyaert comb. nov., XIX : 322.
— papposa Steyaert sp. nov., XIX : 325.
— Planimi (Vize) Steyaert comb. nov., XIX : 325.
— Royenae (Guba) Steyaert comb. nov., XIX : 320.
— sonsensis (P. Henn.) Steyaert comb. nov., XIX : 336.
— stictica (Berk. et Curt.) Steyaert comb. nov., XIX : 328.
— Theae (Saw.) Steyaert comb. nov., XIX : 327.
— Theae (Saw.) Steyaert var. minor Steyaert comb. nov., XIX : 327.
— triseta (M. et M^me F. Moreau) Steyaert comb. nov., XIX : 337.
— versicolor (Speg.) Steyaert comb. nov., XIX : 336.
— virgatula (Kleb.) Steyaert comb. nov., XIX : 336.
— Westerdijkii Steyaert sp. nov., XIX : 329.
Phaeosphaerella sentina (Fries) Verplancke comb. nov., XV : 343.
Phialodiscus Mortehani De Wild. sp. nov., IV : 361.
— Verschuereni De Wild. sp. nov., IV : 361.
Phlebopus Braunii (Bresadola) Heinemann comb. nov., XXI : 243.
— Braunii (Bresadola) Heinemann var. brunneoruber (Beeli) Heinemann comb. nov., XXI : 243.
— silvaticus Heinemann sp. nov., XXI : 245.
— sudanicus (Har. et Pat.) Heinemann comb. nov., XXIV : 113.
Pholiota njalaensis Beeli sp. nov., XV : 40.
Phyllanthus Bequaertii Robyns et Lawalrée sp. nov., XVIII : 265.
— Lebrunii Robyns et Lawalrée sp. nov., XVIII : 264.

Phyllanthus Wittei Robyns et Lawalrée sp. nov., XVIII : 266.
Phylloclinium brevipetiolatum Germain sp. nov., XXV : 262.
Phyllocosmus congolensis (De Wild. et Th. Dur.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 76.
— Lemaireanus (De Wild. et Th. Dur.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 76.
Phylloporus albocarnosus Heinemann sp. nov., XXV : 177.
— ater (Beeli) Heinemann comb. nov., XXI : 260.
— carmineus Heinemann sp. nov., XXI : 263.
— depressus Heinemann sp. nov., XXIII : 73.
— purpureus (Beeli) Heinemann comb. nov., XXI : 250.
— purpureus (Beeli) Heinemann var. ambiguus Heinemann var. nov., XXI : 253.
— rhodoxanthus (Schweinitz) Bresadola subsp. congolensis Heinemann subsp. nov., XXV : 174.
— testaceus Heinemann et Goossens sp. nov., XXI : 254.
— testaceus Heinemann et Goossens var. bisporus Heinemann var. nov., XXI : 258.
— tubipes Heinemann sp. nov., XXI : 261.
Picralima nitida (Stapf) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 338.
Pilea divaricata Hauman sp. nov., XVII : 177.
— elatostematifolia Hauman sp. nov., XVII : 178.
Pinacopodium gabonense (Cavaco et Normand) Normand et Cavaco comb. nov., XXI : 456.
Piper brachyrhachis C. H. Wright var. glabra Balle var. nov., XVI : 373.
Piptadenia Claessensi De Wild. sp. nov., VII : 257.
Piptostigma Mortehani De Wild. var. nov., IV : 383.
Pittosporum ripicolum J. Léonard sp. nov., XX : 47.
— ripicolum J. Léonard subsp. katangense J. Léonard subsp. nov., XX : 227.
Placodiscus Pynaerti De Wild. sp. nov., IV : 371.
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. et Dalz.) J. Léonard comb. nov., XXI : 426.
— gabonensis (A. Chev.) J. Léonard comb. nov., XXI : 426.
— longitubus (Harms) J. Léonard comb. nov., XXI : 427.
— multijugus (Harms) J. Léonard comb. nov., XXI : 427.
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Br. et Schpr var. laetum (Schpr) Lindb. f. densum (Schpr) Demaret comb. nov., XVII : 376.

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Br. et Schpr var. laetum (Schpr) Lindb. f. tenellum (Br. et Schpr) Demaret comb. nov., XVII : 376.
Platostoma denticulatum Robyns sp. nov., XVII : 22.
— denticulatum Robyns var. minimum Robyns var. nov., XVII : 25.
— leptochilon Robyns sp. nov., XVII : 20.
— leptochilon Robyns var. Louisii Robyns var. nov., XVII : 22.
Platysepalum Vanderysti De Wild. sp. nov., V : 18.
Plectranthus fragans Lebrun et Toussaint sp. nov., XVII : 70.
— janthinothryx Lebrun et Toussaint sp. nov., XVII : 69.
Plectronia acuminata De Wild. sp. nov., V : 28.
— angustiflora De Wild. sp. nov., V : 30.
— congensis (Hiern) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 268.
— hispido-nervosa De Wild. sp. nov., V : 29.
— obovata De Wild. sp. nov., V : 30.
— Vanderysti De Wild. sp. nov., V : 31.
Plectroniella Robyns gen. nov., XI : 243.
— armata (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 243.
Pleurotus luminosus Beeli sp. nov., VIII : 259.
— palmicola Beeli sp. nov., XV : 38.
Pluchea Bequaertii Robyns sp. nov., XVII : 101.
Poa muhavurensis Hubbard sp. nov., XXV : 244.
Pogonatum semilamellatum Leroy sp. nov., XVIII : 197.
Polyalthia Mortehani De Wild. sp. nov., IV : 384.
Polyceratocarpus Germainii Boutique sp. nov., XXI : 118.
Polygala capillaris E. Meyer ex Harv. var. tukpwoensis Petit var. nov., XXV : 333.
— Dewevrei Exell var. Schmitzii Petit var. nov., XXV : 333.
— Exelleana Troupin sp. nov., XIX : 206.
— Gilletiana Petit sp. nov., XXV : 334.
— septentrionalis Troupin sp. nov., XIX : 205.
— tanganyikensis Troupin sp. nov., XIX : 208.
Polygonum convolvuloides Brügger f. intermedium Lawalrée f. nov., XXII : 211.
— convolvuloides Brügger f. pterocarpum Lawalrée f. nov. XXII : 212.
Polyporus durississimus Beeli sp. nov., VIII : 256.
— loreus Beeli sp. nov., VIII : 255.
— Quarrei Beeli sp. nov., VIII : 250.
— subcolossus Beeli sp. nov., VIII : 252.

Polystichum aculeatum (L.) Roth var. aristatum (Christ) Lawalrée comb. nov., XIX : 237.
Polystictus kwiluensis Beeli sp. nov., VIII : 250.
Polytrichum hirsutum Leroy sp. nov., XVIII : 199.
Popowia argentea De Wild. sp. nov., IV : 383.
— bicornis Boutique sp. nov., XXI : 115.
— Germainii Boutique sp. nov., XXI : 113.
— Louisii Boutique sp. nov., XXI : 114.
— Louisii Boutique var. grandifolia Boutique var. nov., XXI : 115.
— Mortehani De Wild. sp. nov., IV : 381.
— orophila Boutique sp. nov., XXI : 112.
— Pynaerti De Wild. sp. nov., IV : 382.
Porphyrellus niger Heinemann et Goossens sp. nov., XXI : 333.
Portulaca guineensis Lindl. ap. Ker-Gawl. var. nitidissima (V. Poelln.) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 90.
Premna angolensis Guerke var. minor De Wild. var. nov., III : 263.
Prenanthes subpeltata Stebbins sp. nov., XIV : 340.
Prevostea Mortehani De Wild. sp. nov., IV : 389.
Prosthemiella africana Torrend sp. nov., IV : 10.
Protea angustimarginata Hauman sp. nov., XIX : 55.
— argyrea Hauman sp. nov., XIX : 51.
— bella Hauman sp. nov., XVII : 170.
— Heckmanniana Engl. var. angustifolia Hauman var. nov., XIX : 56.
— kibarensis Hauman sp. nov., XIX : 53.
— Lynesii Hauman sp. nov., XVII : 168.
— minima Hauman sp. nov., XVII : 169.
— ramosa Hauman sp. nov., XIX : 54.
— secundifolia Hauman sp. nov., XVII : 167.
— urundinensis Hauman sp. nov., XVII : 166.
— vernicosa Hauman sp. nov., XVII : 166.
Pseudephemerum nitidum (Hedw.) C. Jens. var. bulbilliferum (Besch.) Demaret comb. nov., XVII : 325.
Pseudoeriosema Hauman gen. nov., XXV : 96.
— andongense (Welw.) Hauman comb. nov., XXV : 97.
— Bequaertii (De Wild.) Hauman comb. nov., XXV : 97.
— Boranii (Schweinf.) Hauman comb. nov., XXV : 98.
— Homblei (De Wild.) Hauman comb. nov., XXV : 97.
— Homblei (De Wild.) Hauman var. latispulatum Hauman var. nov., XXV : 97.

Pseudoeriosema longipes (Harms) Hauman comb. nov., XXV : 98.
— moeroense (De Wild.) Hauman comb. nov., XXV : 98.
Pseudomussaenda angustifolia Troupin et Petit sp. nov., XXIII : 230.
— stenocarpa (Hiern) Petit comb. nov., XXIV : 342.
Psilocybe albobrunnea Beeli sp. nov., XV : 42.
Psilotrichum axilliflorum Suessenguth sp. nov., XV : 69.
— camporum Lebrun et Toussaint ex Hauman sp. nov., XVIII : 110.
Psophocarpus Neck. subgen. Eupsophocarpus Wilczek subgen. nov., XXIV : 414.
— subgen. Vignopsis (De Wild.) Wilczek comb. nov., XXIV : 414.
— grandiflorus Wilczek sp. nov., XXIV : 414.
Pterocarpus albopubescens Hauman sp. nov., XXIV : 224.
— Casteelsii De Wild. var. ealaensis Hauman var. nov., XXIV : 225.
— Gilletii De Wild. var. angustifoliolatus Hauman var. nov., XXIV : 225.
Ptychocoleus Orchidae (Pears.) Demaret comb. nov., XVI : 304.
Pulveroboletus aberrans Heinemann et Goossens sp. nov., XXI : 310.
— annulatus Heinemann sp. nov., XXI : 302.
— carminiporus Heinemann sp. nov., XXI : 307.
— cavipes Heinemann sp. nov., XXI : 313.
— croceus Heinemann sp. nov., XXI : 303.
— trinitensis Heinemann sp. nov., XXIV : 120.
— viridis Heinemann et Goossens sp. nov., XXI : 306.
Pupalia micrantha Hauman sp. nov., XVIII : 109.
Pycnocoma elua J. Léonard sp. nov., XXV : 295.
— insularum J. Léonard sp. nov., XXV : 297.
— macrophylla Benth. var. longicornuta J. Léonard var. nov., XXV : 299.
Pycnostachys vulcanicola Lebrun et Toussaint sp. nov., XVII : 71.
Pycreus sanguineo-squamatus Van der Veken sp. nov., XXV : 145.
— Scaettae Cherm. sp. nov., XIII : 278.
— Scaettae Cherm. var. katangensis Cherm. var. nov., XIII : 279.
— Vanderysti Cherm. sp. nov., XIII : 279.
Pygeum crassifolium Hauman sp. nov., XXII : 93.

Pygmaeothamnus Robyns gen. nov., XI : 29.
— Chamaedendrum (O. Kuntze) Robyns comb. nov., XI : 35.
— Chamaedendrum (O. Kuntze) Robyns var. setulosus Robyns var. nov., XI : 35.
— longipes (Conrath) Robyns comb. nov., XI : 37.
— pilosus Robyns sp. nov., XI : 36.
— Zeyheri (Sond.) Robyns comb. nov., XI : 30.
— Zeyheri (Sond.) Robyns var. Livingstonianus Robyns var. nov., XI : 34.
— Zeyheri (Sond.) Robyns var. Oatesii (Rolfe) Robyns stat. nov., XI : 31.
— Zeyheri (Sond.) Robyns var. Rogersii Robyns var. nov., XI : 34.
Pynaertiodendron De Wild. gen. nov., V : 19.
— congolanum De Wild. sp. nov., V : 19.
— Pellegrinianum J. Léonard sp. nov., XXI : 138.

Ranunculus vulcanicolus Staner sp. nov., XV : 314.
Raphia Matombe De Wild. sp. nov., V : 144.
— monbuttorum Drude var. macrocarpa Robyns et Tournay var. nov., XXV : 250.
— Mortehani De Wild. sp. nov., V : 145.
— sankuruensis De Wild. sp. nov., V : 145.
Raphionacme Wilczekiana Germain sp. nov., XXI : 74.
Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Br. et Schpr f. subdenticulata (Boul.) Demaret comb. nov., XVII : 328.
Rhacomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. subsp. sudeticum (Funck) Dix. f. tenellum (Boul.) Demaret comb. nov., XVII : 343.
Rhamphicarpa brevifolia (De Wild.) Staner comb. nov., XV : 149.
— Claessensi (De Wild.) Staner comb. nov., XV : 150.
Rhegmatodon brevicuspes P. de la V. et Leroy sp. nov., XVIII : 182.
Rhopalopila pallens Pierre var. glabriflora J. Léonard var. nov., XVIII : 147.
Rhus Bequaertii Robyns et Lawalrée sp. nov., XVIII : 268.
Rhynchelytrum Bequaertii Robyns sp. nov., IX : 193.
Rhychocarpidium P. de la V. et Leroy gen. nov., XVIII : 188.
— katalense P. de la V. et Leroy sp. nov., XVIII : 189.
Rhynchosia aureovillosa Hauman sp. nov., XXV : 99.

Rhynchosia aureovillosa Hauman var. Humberti Hauman var. nov., XXV : 100.
— axilliflora Hauman sp. nov., XXV : 101.
— breviracemosa Hauman sp. nov., XXV : 102.
— clivorum S. Moore var. adjoensis Hauman var. nov., XXV : 108.
— heterophylla Hauman sp. nov., XXV : 103.
— Hockii De Wild. var. grandifolia Hauman var. nov., XXV : 109.
— Klotzschii Cuf. nom. nov., XXV : suppl. 323.
— longissima Hauman sp. nov., XXV : 104.
— macrantha Hauman sp. nov., XXV : 105.
— oblongifoliolata Hauman sp. nov., XXV : 105.
— pseudoteramnoides Hauman sp. nov., XXV : 106.
— resinosa Hochst. var. latisepala Hauman var. nov., XXV : 109.
— salicifolia Hauman sp. nov., XXV : 107.
— sennaarensis Hochst. ex Schwfth var. macrocalyx (Chiov.) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 325.
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) C. Jens. var. laminatum (Boul.) Demaret comb. nov., XVII : 373.
— riparioides (Hedw.) C. Jens. f. squarrosum (Boul.) Demaret comb. nov., XVII : 373.
— riparioides (Hedw.) C. Jens. f. vulgare (Boul.) Demaret comb. nov., XVII : 374.
Riccardia congoana (St.) Demaret comb. nov., XVI : 306.
— Laurentiana (St.) Demaret comb. nov., XVI : 306.
Rinorea affinis Robyns et Lawalrée sp. nov., XVIII : 280.
— bondoensis De Wild. sp. nov., VI : 152.
— Brandti De Wild. nom. nov., VI : 154.
— Brieyi De Wild. sp. nov., VI : 154.
— Claessensi De Wild. sp. nov., VI : 156.
— crassifolia (Bak. f.) De Wild. comb. nov., VI : 158.
— dubia De Wild. sp. nov., VI : 160.
— Gilleti De Wild. sp. nov., VI : 162.
— Giorgii De Wild. sp. nov., VI : 164.
— Kerkhoveni De Wild. sp. nov., VI : 167.
— kionzoensis De Wild. sp. nov., VI : 169.
— Laurenti De Wild. sp. nov., VI : 170.
— longifolia De Wild. sp. nov., VI : 173.
— Lujai De Wild. sp. nov., VI : 174.
— moandensis De Wild. sp. nov., VI : 176.

Rinorea obanensis (Bak. f.) De Wild. comb. nov., VI : 179.
— pallidiviridis De Wild. sp. nov., VI : 179.
— pallidiviridis De Wild. var. lembaensis De Wild. var. nov., VI : 180.
— Sapini De Wild. sp. nov., VI : 182.
— seleensis De Wild. sp. nov., VI : 183.
— Sereti De Wild. sp. nov., VI : 185.
— subglandulosa De Wild sp. nov., VI : 186.
— Talbotii (Bak. f.) De Wild. comb. nov., VI : 188.
— variifolia De Wild. sp. nov., VI : 189.
— Verschuereni De Wild. sp. nov., VI : 190.

Ritchiea fragariodora Gilg. var plurinervis Wilczek var. nov., XX : 181.
— Jansii Wilczek sp. nov., XX : 185.
— littoralis Wilczek sp. nov., XX : 182.
— ovata Wilczek sp. nov., XX : 181.
— Quarrei Wilczek sp. nov., XX : 184.
— Wittei Wilczek sp. nov., XX : 183.

Robynsiella Suessenguth gen. nov., XV : 70.
— fastigiata Suessenguth sp. nov., XV : 70.

Robynsiophyton Wilczek gen. nov., XXIII : 126.
— Vanderystii Wilczek sp. nov., XXIII : 128.

Romulea congolensis Beguinot sp. nov., XV : 215.

Rosa acicularis Lindl. var. Schrenkiana (Crép.) Bouleng. stat. nov., XIV : 135.
— acicularis Lindl. var. subalpina (Bunge) Bouleng. comb. nov., XIV : 136.
— alpina L. var. macrophylla (Lindl.) Bouleng. stat. nov., XIII : 248.
— alpina L. var. oxyodon (Boiss.) Bouleng. stat. nov., XIII : 244.
— alticola Bouleng. sp. nov., XIII : 220.
— arvensis Huds. var. conspicua (Boreau) Bouleng. comb. nov., XII : 235.
— arvensis Huds. var. pervirens (Gren.) Bouleng. comb. nov., XII : 228.
— arvensis Huds. var. seperina (Sauzé et Maill.) Bouleng. comb. nov., XII : 237.
— calva (Franch. et Savat.) Bouleng. stat. nov., IX : 268.
— calva (Franch. et Savat.) Bouleng. var. cathayensis (Redh. et Wils.) Bouleng. comb. nov., IX : 271.

Rosa calva (Franch. et Savat.) Bouleng. var. formosana (Card.) Bouleng. comb. nov., IX : 270.
— calva (Franch. et Savat.) Bouleng. var. mokanensis (Lév.) Bouleng. stat. nov., IX : 270.
— canina L. var. abietina (Gren.) Bouleng. comb. nov., XII : 181.
— canina L. var. leucochroa (Desv.) Bouleng. comb. nov., XII : 111.
— canina L. var. occulta (Crép.) Bouleng. comb. nov., XII : 134.
— canina L. var. Roffavieri (Chab.) Bouleng. comb. nov., XII : 178.
— crocacantha Bouleng. sp. nov., XIV : 276.
— Davidi Crép. var. Fangii Bouleng. var. nov., XIII : 256.
— Davidi Crép. var. persetosa (Rolfe) Bouleng. stat. nov., XIII : 254.
— Delavayana Bouleng. sp. nov., XIV : 193.
— dumalis Bechst. var. Acharii (Billb.) Bouleng. comb. nov., XII : 45.
— dumalis Bechst. var. Afzeliana (Fries) Bouleng. comb. nov., XII : 22.
— dumalis Bechst. var. Barclayana Bouleng. var. nov., XII : 71.
— dumalis Bechst. var. caballicensis (Puget) Bouleng. comb. nov., XII : 29.
— dumalis Bechst. var. caesia (Smith) Bouleng. comb. nov., XII : 61.
— dumalis Bechst. var. cinerea (Rapin) Bouleng. comb. nov., XII : 66.
— dumalis Bechst. var. coriifolia (Fries) Bouleng. comb. nov., XII : 53.
— dumalis Bechst. var. Favrati (Christ) Bouleng. comb. nov., XII : 72.
— dumalis Bechst. var. Watsoni (Baker) Bouleng. comb. nov., XII : 59.
— Fargesiana Bouleng. sp. nov., XIV : 182.
— Forrestiana Bouleng. sp. nov., XIV : 126.
— inodora Fries var. Cornazi (Gremli) Bouleng. comb. nov., X : 139.
— Korschinskiana Bouleng. sp. nov., XIII : 213.
— latibracteata Bouleng. sp. nov., XIV : 124.
— Luciae Franch. et Rochebr. var. nakaiana (Lév.) Bouleng. stat. nov., IX : 267.

Rosa Luciae Rranch. et Rochebr. var. Taquetiana Bouleng. var. nov., IX : 267.
— micrantha Sm. var. dimorphacantha (Martinis) Bouleng. comb. nov., X : 183.
— micrantha Sm. var. flagellaris (Christ) Bouleng. stat. nov., X : 188.
— Mulligani Bouleng. sp. nov., XIV : 274.
— multiflora Thunb. var. momienensis Bouleng. var. nov., IX : 275.
— nanothamnus Bouleng. sp. nov., XIII : 206.
— nanothamnus Bouleng. var. Litvinovii Bouleng. var. nov., XIII : 209.
— primula Bouleng. sp. nov., XIV : 121.
— rubiginosa L. var. Lintoni (Scheutz) Bouleng. comb. nov., X : 104.
— Sherardi Davies var. collivaga (Cottet) Bouleng. comb. nov., X : 276.
— Sherardi Davies var. glabrata (Fries) Bouleng. comb. nov., X : 279.
— villosa L. var. anoplantha (Christ) Bouleng. stat. nov., X : 247.
— villosa L. var. engadinensis (Christ) Bouleng. comb. nov., X : 242.
— villosa L. var. Franzonii (Christ) Bouleng. stat. nov., X : 253.
— villosa L. var. Murithii (Puget) Bouleng. stat. nov., X : 250.
— Webbiana Wall. var. Winterbottomii (Crép.) Bouleng. stat. nov., XIII : 204.
— xanthina Lindl. var. Ecae (Aitchis.) Bouleng. stat. nov., XIII : 181.
— xanthina Lindl. var. kokanica (Regel) Bouleng. comb. nov., VIII : 182.
— yunnanensis (Crép.) Bouleng. stat. nov., IX : 235.
Rourea Claessensii De Wild. sp. nov., III : 258.
— coriacea De Wild. sp. nov., III : 258.
Rubus apetalus Poir. var. grossoserratus Hauman var. nov., XXII : 92.
— Ledermannii Engl. var. serrulatus C. E. Gust. var. nov., XIII : 270.
— pinnatus Willd. var. afrotropicus Engl. subvar. concolor Hauman subvar. nov., XXII : 93.
— rigidus Smith var. discolor Hauman var. nov., XXII : 93.
— subspicatus Hauman sp. nov., XXII : 91.

Rubus transvaliensis C. E. Gust. var. kyimbilensis C. E. Gust. var. nov., XIII : 275.
Rumex abyssinicus Jacq. var. calystegifolius Rech. f. ex Cuf. var. nov. (nom. nud.), XXIII : suppl. 38.
— abyssinicus Jacq. var. retrorsilobatus Rech. f. ex Cuf. var. nov. (nom. nud.), XXII : suppl. 39.
— tenuifolius (Wallr.) Löve var. turfosus Lawalrée var. nov., XXII : 86.
Russula annulatoangustifolia Beeli sp. nov., XIV : 87.
— annulatobadia Beeli sp. nov., XIV : 88.
— annulatolutea Beeli sp. nov., XIV : 86.
— annulatosquamosa Beeli sp. nov., XIV : 84.
— xylophila Beeli sp. nov., XIV : 84.
Rutidea lomamiensis Brem. sp. nov., XXII : 100.
Rytigynia Blume sect. Pluriflorae Robyns sect. nov., XI : 155.
— sect. Pluriflorae Robyns subsect. Fasciculatae Robyns subsect. nov., XI : 158.
— sect. Pluriflorae Robyns subsect. Pedunculatae Robyns subsect. nov., XI : 158.
— sect. Pluriflorae Robyns subsect. Pedunculatae Robyns ser. Laxiflorae Robyns ser. nov., XI : 158.
— sect. Pluriflorae Robyns subsect. Pedunculatae Robyns ser. Laxiflorae Robyns subser. Appendiculatae Robyns subser. nov., XI : 191.
— sect. Pluriflorae Robyns subsect. Pedunculatae Robyns ser. Laxiflorae Robyns subser. Exappendiculatae Robyns subser. nov., XI : 158.
— sect. Pluriflorae Robyns subsect. Pedunculatae Robyns ser. Umbellatae Robyns ser. nov., XI : 210.
— sect. Uniflorae Robyns sect. nov., XI : 145.
— acuminatissima (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 169.
— adenodonta (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 148.
— argentea (Wernham) Robyns comb. nov., XI : 205.
— Bagshawei (S. Moore) Robyns comb. nov., XI : 152.
— beniensis (De Wild.) Robyns comb. nov., XI : 170.
— biflora Robyns sp. nov., XI : 178.
— binata (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 202.
— bomiliensis (De Wild.) Robyns comb. nov., XI : 210.
— butaguensis (De Wild.) Robyns comb. nov., XI : 145.
— canthioides (Benth.) Robyns comb. nov., XI : 188.
— Claessensii (De Wild.) Robyns comb. nov., XI : 211.

Rytiginia claviflora Robyns sp. nov., XI : 187.
— concolor (Hiern) Robyns comb. nov., XI : 190.
— congesta (K. Krause) Robyns comb. nov., XI : 214.
— constricta Robyns sp. nov., XI : 186.
— dasyothamnus (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 199.
— decussata (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 195.
— Demeusei (De Wild.) Robyns comb. nov., XI : 221.
— Dewevrei (De Wild. et Th. Dur.) Robyns comb. nov., XI : 168.
— dubiosa (De Wild.) Robyns comb. nov., XI : 216.
— euclioides Robyns sp. nov., XI : 146.
— ferruginea Robyns sp. nov., XI : 177.
— flavida Robyns sp. nov., XI : 198.
— glabra (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 174.
— glabrifolia (De Wild.) Robyns comb. nov., XI : 201.
— gracilipetiolata (De Wild.) Robyns comb. nov., XI : 176.
— Junodii (Schinz) Robyns comb. nov., XI : 179.
— kiwuensis (K. Krause) Robyns comb. nov., XI : 156.
— Krauseana Robyns sp. nov., XI : 223.
— Laurentii (De Wild.) Robyns comb. nov., XI : 192.
— Lebrunii Robyns sp. nov., XVII : 92.
— Lecomtei Robyns sp. nov., XI : 160.
— lenticellata Robyns sp. nov., XI : 181.
— leonensis (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 205.
— liberica Robyns sp. nov., XI : 182.
— lichenoxenos (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 156.
— loranthifolia (K. Schum.) Robyns com. nov., XI : 204.
— macrostipulata Robyns sp. nov., XI : 215.
— membranacea (Hiern) Robyns comb. nov., XI : 217.
— microphylla (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 171.
— monantha (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 153.
— mutabilis Robyns sp. nov., XI : 219.
— neglecta (Hiern) Robyns comb. nov., XI : 183.
— nigerica (S. Moore) Robyns comb. nov., XI : 208.
— nodulosa (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 155.
— obscura Robyns sp. nov., XI : 149.
— oligacantha (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 172.
— orbicularis (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 151.
— pauciflora (Schweinf.) Robyns comb. nov., XI : 197.
— perlucidula Robyns sp. nov., XI : 175.
— reticulata Robyns sp. nov., XI : 147.
— rhamnoides Robyns sp. nov., XI : 207.

Rytigynia rubiginosa (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 209.
— rubra Robyns sp. nov., XI : 162.
— ruwenzoriensis (De Wild.) Robyns comb. nov., XI : 166.
— ruwenzoriensis (De Wild.) Robyns var. breviflora (De Wild.) Robyns comb. nov., XI : 167.
— Schumannii Robyns nom. nov., XI : 158.
— Schumannii Robyns var. puberula (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 159.
— Schumannii Robyns var. Uhligii Robyns var. nov., XI : 159.
— senegalensis Blume var. Ledermannii Robyns var. nov., XI : 166.
— sessilifolia Robyns sp. nov., XI : 191.
— setosa Robyns sp. nov., XI : 189.
— sparsifolia (S. Moore) Robyns comb. nov., XI : 180.
— squamata (De Wild.) Robyns comb. nov., XI : 212.
— Stolzii Robyns sp. nov., XI : 224.
— subbiflora (Mildbr.) Robyns comb. nov., XI : 200.
— tomentosa (K. Schum. Robyns comb. nov., XI : 150.
— umbellulata (Hiern) Robyns comb. nov., XI : 184.
— undulata Robyns sp. nov., XI : 159.
— verruculosa (K. Krause) Robyns comb. nov., XI : 218.
— viridissima (Wernham) Robyns comb. nov., XI : 213.
— Welwitschii Robyns sp. nov., XI : 193.

Sabicea Homblei De Wild. sp. nov., V : 32.
Saccolepis kimpasaensis Vanderyst ex Robyns sp. nov., IX : 186.
— Lebrunii Robyns sp. nov., IX : 185.
— Wittei Robyns sp. nov., IX : 188.
Saintpauliopsis Staner gen. nov., XIII : 8.
— Lebrunii Staner sp. nov., XIII : 8.
— Lebrunii Staner var. obtusa Staner var. nov., XIII : 9.
Salix subserrata Willd. var. cyathipoda (Anders.) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 4.
Schefflera sycidiifolia Lebrun sp. nov., XIII : 19.
Schistidium apocarpum (Hedw.) Br. et Schpr var. sublaevipilum (Card.) Demaret comb. nov., XVII : 342.
Schizachyrium yangambiense Germain sp. nov., XXII : 139.
Schizoglossum vulcanorum Lebrun et Taton sp. nov., XVII : 66.
Schizothyrium congoensis Beeli sp. nov., VIII : 3.
Schulzeria sierraleonis Beeli sp. nov., XV : 30.
— striata Beeli sp. nov., XV : 29.
Scilla Verdickii De Wild. sp. nov., III : 265.

Scleria Rehmanni Clarke var. ornata Cherm. var. nov., XIII : 283.
Scleroderma Bovonei Mattirolo VIII : 30.
— pantherinum Mattirolo sp. nov., IX : 97.
Scorodophloeus Fischeri (Taub.) J. Léonard comb. nov., XXI : 419.
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. f. gracilescens (San.) Demaret comb. nov., XVII : 369.
Sedum Churchillianum Robyns et Boutique sp. nov., XVII : 313.
Senecio afromontanus (R. E. Fries) Humbert et Staner comb. nov., XIV : 104.
— Claessensii (De Wild.) Humbert et Staner comb. nov., XIV : 105.
— crassorhizus De Wild. sp. nov., V : 54.
— Homblei De Wild. sp. nov., V : 54.
— irregularibracteatus De Wild. sp. nov., V : 85.
— kanzibiensis Humbert et Staner sp. nov., XIV : 108.
— semiamplexifolius De Wild. sp. nov., V : 86.
Sesamum biapiculatum De Wild. sp. nov., V : 58.
Sesbania bispinosa (Jacq.) Fawc. et Rendle var. micrantha (Chiov.) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 286.
— hirticalyx Cronquist sp. nov., XXII : 228.
— kapangensis Cronquist sp. nov., XXII : 229.
Setaria Bequaertii Robyns sp. nov., IX : 190.
Sida Devredii Steyaert sp. nov., XXII : 106.
— serratifolia Wilczek et Steyaert sp. nov., XXII : 105.
Siphonanthus cava De Wild. nom. nov., VII : 164.
Solanum albidum De Wild. sp. nov., IV : 396.
— angustispinosum De Wild. sp. nov., IV : 397.
— Brieyi De Wild. sp. nov., IV : 404.
— cultum De Wild. sp. nov., IV : 406.
— Delpierrei De Wild. sp. nov., IV : 398.
— Elskensi De Wild. sp. nov., IV : 403.
— Flamignii De Wild. sp. nov., IV : 399.
— Giorgii De Wild. sp. nov., IV : 401.
— Jesperseni De Wild. sp. nov., IV : 407.
— sparsespinosum De Wild. sp. nov., IV : 399.
— subcoriaceum Th. et H. Dur. nom. nov., II : 394.
— subsessile De Wild. sp. nov., IV : 407.
— ueleensis De Wild. sp. nov., IV : 400.
— Wittei Robyns sp. nov., XVII : 82.
— yangambiense De Wild. sp. nov., IV : 402.

Sonchus Bipontini Aschers. var. Louisii Robyns var. nov., XVII : 105.
Sorindeia Claessensi De Wild. sp. nov., IV : 370.
— Lemairei De Wild. sp. nov., IV : 370.
— Sparanoi De Wild. sp. nov., IV : 371.
Sorosporium Aristidae-amplissimae Beeli sp. nov., VIII : 7.
— chloridicola Beeli sp. nov., VIII : 7.
— Panici Beeli sp. nov., VIII : 7.
— Panici Beeli var. kinshasaensis Beeli var. nov., VIII : 8.
Sphaerostilbe Vanderystii P. Henn. sp. nov., VIII : 77.
Sphenostylis stenocarpa (Hochst.) Harms var. latifoliolata (De Wild.) De Wild. comb. nov., II : 154.
Sporobolus africanus (Poir.) Robyns et Tournay comb. nov., XXV : 242.
Stathmostelma Wildemanianum Th. et H. Dur. nom. nov., II : 361.
Staudtia gabonensis Warb. var. macrocarpa Gilbert et Troupin var. nov., XXI : 142.
Staurogyne Humberti Mildbr. sp. nov., XIV : 353.
Stephania Dinklagei (Engl.) Diels var. axillaris Troupin var. nov., XIX : 434.
Sterculia Derumieri De Wild. sp. nov., IV : 392.
— tragacantha Lindl. var. stipitata Germain var. nov., XXII : 73.
Stictolejeunea africana Vanden Berghen sp. nov., XX : 15.
Stilbella cinera Torrend sp. nov., IV : 13.
Strephonema Gilleti De Wild. sp. nov., VIII : 119.
Strombosia glaucescens Engl. var. lucida J. Léonard var. nov., XVIII : 148.
— nigropunctata J. Louis et J. Léonard sp. nov., XVIII : 148.
Strophanthus Bequaertii Staner et Michotte sp. nov., XIII : 53.
— Eminii Aschers. et Pax var. Wittei (Staner) Staner et Michotte comb. nov., XIII : 34.
— kombe Oliv. var. Ledienii (Stein) Staner et Michotte comb. nov., XIII : 34.
— Mortehani De Wild. sp. nov., V : 102.
— sarmentosus P. DC. var. pubescens Staner et Michotte var. nov., XIII : 52.
Struthiola Scaettae Staner sp. nov., XIII : 368.
Strychnos Bequaerti De Wild. sp. nov., V : 42.
— Boonei De Wild. sp. nov., V : 45.
— Dale De Wild. sp. nov., V : 47.
— dundusanensis De Wild. sp. nov., V : 48.

Strychnos hirsutostylosa De Wild. sp. nov., V : 43.
— kasengaensis De Wild. sp. nov., V : 46.
— likimiensis De Wild. sp. nov., V : 48.
— Malchairi De Wild. sp. nov., V : 44.
— Mongonda De Wild. sp. nov., V : 50.
— Mortehani De Wild. sp. nov., V : 50.
— subaquatica De Wild. sp. nov., V : 43.
— Vanderysti De Wild. sp. nov., V : 46.
Swartzia madagascariensis (Taub.) Desv. f. glabrescens Gilbert et Boutique f. nov., XXII : 184.
— madagascariensis (Taub.) Desv. f. grandifoliolata Gilbert et Boutique f. nov., XXII : 183.
Syrrhopodon armatus Mitt. f. rubrotomentosus (Card.) Demaret et Leroy comb. nov., XVIII : 221.
— brevivaginans Demaret et Leroy sp. nov., XVIII : 224.
Syzygium Gilletii De Wild. sp. nov., IV : 375.
— Giorgii De Wild. sp. nov., IV : 376.

Tannodia congolensis J. Léonard sp. nov., XXV : 300.
Tapinopentas latifolia Verdcourt sp. nov., XXIII : 60.
— ulugurica Verdcourt sp. nov., XXIII : 61.
Tapiphyllum Robyns gen. nov., XI : 101.
— cinerascens (Welw.) Robyns comb. nov., XI : 107.
— cistifolium (Welw.) Robyns comb. nov., XI : 108.
— confertiflorum Robyns sp. nov., XI : 103.
— discolor (De Wild.) Robyns comb. nov., XI : 105.
— herbaceum Robyns sp. nov., XI : 104.
— Kaessneri (S. Moore) Robyns comb. nov., XI : 106.
— obtusifolium (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 115.
— parvifolium (Sond.) Robyns comb. nov., XI : 110.
— psammophilum (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 106.
— Schumannianum Robyns sp. nov., XI : 109.
— velutinum (Hiern) Robyns comb. nov., XI : 111.
— velutinum (Hiern) Robyns var. laevius (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 114.
— vestitum Robyns sp. nov., XI : 114.
Tapura Lujai De Wild. sp. nov., V : 101.
Tayloria orthodonta (P. Beauv.) Demaret comb. nov., XVIII : 24.
Temnocalyx Robyns gen. nov., XI : 317.
— ancylanthus (Schweinf.) Robyns comb. nov., XI : 323.

Temnocalyx ancylanthus (Schweinf.) Robyns var. puberulus Robyns var. nov., XI : 323.
— fuchsioides (Welw.) Robyns comb. nov., XI : 319.
— nodulosus Robyns sp. nov., XI : 318.
— obovatus (N. E. Brown) Robyns comb. nov., XI : 320.
— Verdickii (De Wild. et Th. Dur.) Robyns comb. nov., XI : 319.
Tephrosia kazibensis Cronquist sp. nov., XXII : 229.
— Lebrunii Staner ex Cronquist sp. nov., XXII : 230.
— Quartiniana Cuf. nom. nov., XXV : suppl. 283.
— Quartiniana Cuf. var. inflexa (Chiov.) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 283.
Teramnus micans (Welw.) Bak. f. var. fagifolius Hauman var. nov., XXV : 95.
Termitomyces clypeatus Heim nom. nov., XXI : 207.
— globulus Heim et Goossens sp. nov., XXI : 216.
Tessmannia anomala (Micheli) Harms var. Flamignii J. Léonard var. nov., XIX : 384.
— Dawei J. Léonard sp. nov., XIX : 386.
— yangambiensis Louis ex J. Léonard sp. nov., XIX : 385.
Tetracera alnifolia Willd. var. podotricha (Gilg) Staner comb. nov., XV : 304.
— Claessensii De Wild. sp. nov., III : 269.
Thalictrum Boivinianum Staner et J. Léonard sp. nov., XIX : 450.
Thecacoris latistipula J. Léonard sp. nov., XVII : 254.
— lenifolia J. Léonard sp. nov., XVII : 253.
Thesium Bequaertii Robyns et Lawalrée sp. nov., XVII : 147.
— Hockii Robyns et Lawalrée sp. nov., XVII : 141.
— katangense Robyns et Lawalrée sp. nov., XX : 157.
— laetum Robyns et Lawalrée sp. nov., XX : 159.
— luembense Robyns et Lawalrée sp. nov., XVII : 146.
— Lynesii Robyns et Lawalrée sp. nov., XVII : 143.
— manikense Robyns et Lawalrée sp. nov., XVII : 147.
— nutans Robyns et Lawalrée sp. nov., XX : 158.
— Quarrei Robyns et Lawalrée sp. nov., XVII : 142.
Thespesia Hockii De Wild. sp. nov., III : 266.
Thomandersia laurifolia (T. Anders.) Baill. var. latifolia (De Wild.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 427.
— laurifolia (T. Anders.) Baill. var. longipetiolata (De Wild.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 427.
Thunbergia Humberti Mildbr. sp. nov., XIV : 354.

Thunbergia kamatembica Mildbr. sp. nov., XVII : 84.
— Mestdaghi De Wild. sp. nov., V : 9.
— Mildbraediana Lebrun et Toussaint sp. nov., XVII : 85.
— Pynaerti De Wild. sp. nov., IV : 197.
Thyridium Le Testui Thér. et P. de la V. var. scalariforme Demaret et Leroy var. nov., XVIII : 228.
Tiliacora ealaensis Troupin sp. nov., XIX : 410.
— Gilletii De Wild. sp. nov., III : 255.
— insularis Louis ex Troupin sp. nov., XIX : 410.
— kenyensis Troupin sp. nov., XXV : 133.
— latifolia Troupin sp. nov., XXV : 133.
— Laurentii De Wild. sp. nov., III : 255.
— Leonardii Troupin sp. nov., XIX : 411.
— Louisii Troupin sp. nov., XIX : 412.
Tinnea apiculata Robyns et Lebrun sp. nov., VIII : 190.
— Gossweileri Robyns et Lebrun sp. nov., VIII : 188.
— gracilipedicellata Robyns et Lebrun sp. nov., VIII : 174.
— lanuginosa Robyns et Lebrun sp. nov., VIII : 197.
— obovata Robyns et Lebrun sp. nov., VIII : 191.
— Pearsonii Robyns et Lebrun sp. nov., VIII : 177.
— Rogersii Robyns et Lebrun sp. nov., VIII : 178.
— Stolzii Robyns et Lebrun sp. nov., VIII : 179.
Tinospora Miers subgen. africana Troupin subgen. nov., XXV : 136.
— caffra (Miers) Troupin comb. nov., XXV : 137.
— oblongifolia (Engl.) Troupin comb. nov., XXV : 137.
Toussaintia Boutiquë gen. nov., XXI : 97.
— congolensis Boutique sp. nov., XXI : 98.
Treculia africana Decne var. mollis (Engl.) J. Léonard comb. nov., XVIII : 145.
Trema guineensis (Schum.) Ficalho var. asperata (Solms) Cuf. comb. nov., XXIII : suppl. 6.
— guineensis (Schum.) Ficalho var. paucinervia Hauman var. nov., XVI : 412.
Trematodon congolensis Leroy sp. nov., XVIII : 159.
Triaspis emarginata De Wild. sp. nov., V : 59.
— emarginata De Wild. var. discolor R. Wilczek var. nov., XXV : 307.
— Gilleti De Wild. sp. nov., V : 59.
— lukombensis De Wild. sp. nov., V : 61.
— Sapini De Wild. sp. nov., V : 60.

Trichilia Derumieri De Wild. sp. nov., IV : 379.
— Kisoko De Wild. sp. nov., IV : 377.
— Montchali De Wild. sp. nov., IV : 378.
— Oddoni De Wild. sp. nov., IV : 379.
Trichodesma tinctorium Brand sp. nov., IV : 393.
— Verdickii Brand sp. nov., IV : 392.
Trichoscypha Brieyi De Wild. sp. nov., IV : 369.
— Lescrauwaeti De Wild., sp. nov., IV : 368.
— Redingi De Wild. sp. nov., IV : 369.
— Reygaerti De Wild. sp. nov., IV : 368.
Trichosphaerella similis Bresadola sp. nov., IV : 7.
Trichosporium chartaceum (Pers.) Sacc. var. calosporum Bresadola var. nov., VIII : 100.
Triclisia lanceolata Troupin sp. nov., XIX : 413.
— Louisii Troupin sp. nov., XIX : 415.
— riparia Troupin sp. nov., XIX : 414.
— Sacleuxii (Pierre) Diels var. ovalifolia Troupin var. nov., XXV : 134.
Trifolium marginatum (Hochst. et Steud. ex Bak.) comb. nov., XXV : suppl. 251.
Triphragmium graminicola Beeli sp. nov., VIII : 5.
Tristachya Bequaerti De Wild. sp. nov., VI : 45.
— Bequaerti De Wild. var. Vanderysti De Wild. var. nov., VI : 46.
— Hocki De Wild. sp. nov., VI : 47.
— Homblei De Wild. sp. nov., VI : 49.
— leucothrix Trin. ex Nees var. Bolusi De Wild., var. nov., VI : 51.
— leucothrix Trin. ex Nees var. longearistata De Wild. var. nov., VI : 52.
— leucothrix Trin. ex Nees var. Sapini De Wild. var. nov., III : 278.
— Ringoeti De Wild. sp. nov., VI : 55.
— Vanderysti De Wild. sp. nov., VI : 56.
Tristemma quadriannulatum De Wild. sp. nov., V : 80.
Triumfetta Bequaerti De Wild. sp. nov., V : 73.
— Claessensi De Wild. sp. nov., V : 70.
— glechomoides Welw. var. glabra De Wild. var. nov., V : 72.
— patulo-pilosa De Wild. sp. nov., V : 74.
— pedunculata De Wild. sp. nov., V : 71.
Trogia Ghesquierei Beeli sp. nov., VIII : 259.

Truncatella Steyaert gen. nov., XIX : 293.
— — sect. Bisetulatae Steyaert sect. nov., XIX : 294.
— — sect. Monosetulatae Steyaert sect. nov., XIX : 293.
— — sect. Monosetulatae Steyaert subsect. Ramulosae Steyaert subsect. nov., XIX : 293.
— — sect. Monosetulatae Steyaert subsect. Ramulosae Steyaert groupe Brunneae Steyaert groupe nouv., XIX : 293.
— — sect. Monosetulatae Steyaert subsect. Ramulosae Steyaert groupe Brunneae Steyaert sous-groupe Fuliginosae Steyaert sous-groupe nouv., XIX : 294.
— — sect. Monosetulatae Steyaert subsect. Ramulosae Steyaert groupe Brunneae Steyaert sous-groupe Pallidae Steyaert sous-groupe nouv., XIX : 293.
— — sect. Monosetulatae Steyaert subsect. Ramulosae Steyaert groupe Virescentes Steyaert groupe nouv., XIX : 293.
— — sect. Monosetulatae Steyaert subsect. Simplices Steyaert subsect. nov., XIX : 293.
— — sect. Multisetulatae Steyaert sect. nov., XIX : 294.
— — sect. Trisetulatae Steyaert sect. nov., XIX : 294.
— conorum-piceae (Tubeuf) Steyaert comb. nov., XIX : 299.
— Hartigii (Tubeuf) Steyaert comb. nov., XIX : 298.
— lauro-cerasi (West.) Steyaert comb. nov., XIX : 298.
— ramulosa (V. Beyma) Steyaert comb. nov., XIX : 296.
— truncata (Lév.) Steyaert comb. nov., XIX : 295.

Tryphostemma foetidum Lebrun et Taton sp. nov., XVIII : 283.

Tylopilus Beelii Heinemann et Goossens sp. nov., XXI : 324.
— striatulus Heinemann sp. nov., XXI : 320.
— suavissimus Heinemann et Goossens sp. nov., XXI : 315.
— tenuis Heinemann sp. nov., XXI : 317.
— tenuis Heinemann var. purpureobadius Heinemann var. nov., XXI : 318.
— violaceus (Beeli) Heinemann comb. nov., XXI : 322.

Uapaca Brieyi De Wild. sp. nov., IV : 362.

Ulmus hollandica Mill. f. tricuspidata Lawalrée f. nov., XXII : 70.

Ustilago Hyparrheniae Beeli sp. nov., VIII : 6.
— ugandensis var. macrospora Beeli var. nov., VIII : 6.

Uvaria Dacremontii Boutique sp. nov., XXI : 103.
— pulchra Louis ex Boutique sp. nov., XXI : 100.

Uvaria rivularis Louis ex Boutique sp. nov., XXI : 101.
— suaveolens Louis ex Boutique sp. nov., XXI : 102.
Uvariastrum Germainii Boutique sp. nov., XXI : 120.

Vangueria Juss. sect. Edules Robyns sect. nov., XI : 278.
— sect. Infaustae Robyns sect. nov., XI : 291.
— acutiloba Robyns sp. nov., XI : 286.
— beniensis De Wild. sp. nov., VIII : 43.
— Bequaerti De Wild. sp. nov., VIII : 44.
— bomiliensis De Wild. sp. nov., VIII : 46.
— butaguensis De Wild. sp. nov., VIII : 47.
— campanulata Robyns sp. nov., XI : 293.
— chariensis A. Chev. ex Robyns sp. nov., XI : 299.
— chartacea Robyns sp. nov., XI : 280.
— Claessensi De Wild. sp. nov., VIII : 49.
— cyanescens Robyns sp. nov., XI : 284.
— floribunda Robyns sp. nov., XI : 285.
— Fyffei Robyns sp. nov., XI : 295.
— glabrifolia De Wild. sp. nov., VIII : 53.
— gracilipetiolata De Wild. sp. nov., VIII : 54.
— ituriensis De Wild. sp. nov., VIII : 56.
— Kerstingii Robyns sp. nov., XI : 305.
— kyimbilensis Robyns sp. nov., XI : 294.
— longicalyx Robyns sp. nov., XI : 278.
— rotundata Robyns sp. nov., XI : 300.
— rupicola Robyns sp. nov., XI : 310.
— ruwenzoriensis De Wild. sp. nov., VIII : 61.
— ruwenzoriensis De Wild. var. breviflora De Wild. var. nov., VIII : 62.
— squamata De Wild. sp. nov., VIII : 64.
Vangueriopsis Robyns gen. nov., XI : 248.
— subgen. Brachyanthus Robyns subgen. nov., XI : 255.
— subgen. Brachyanthus Robyns sect. Calycophylla Robyns sect. nov., XI : 255.
— subgen. Brachyanthus Robyns sect. Stenosepalae Robyns sect. nov., XI : 266.
— subgen. Rostranthus Robyns subgen. nov., XI : 252.
— calycophila (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 256.
— castaneae Robyns sp. nov., XI : 258.
— chlorantha (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 255.
— coriacea Robyns sp. nov., XXII : 319.

Vangueriopsis decidua (K. Schum.) Robyns comb. nov., XI : 267.
— discolor (Benth.) Robyns comb. nov., XI : 264.
— glabrescens Robyns sp. nov., XI : 269.
— lanceolata Robyns sp. nov., XI : 264.
— lanciflora (Hiern) Robyns comb. nov., XI : 252.
— membranacea Robyns sp. nov., XI : 271.
— nigerica Robyns sp. nov., XI : 261.
— nigricans Robyns sp. nov., XI : 257.
— olacifolia Robyns sp. nov., XI : 259.
— rubiginosa Robyns sp. nov., XI : 254.
— rufa Robyns sp. nov., XI : 266.
— setosa Robyns sp. nov., XI : 268.
— subulata Robyns sp. nov., XI : 268.
— vanguerioides (Hiern) Robyns comb. nov., XI : 260.
— violacea Robyns sp. nov., XI : 270.
Vanilla Sereti De Wild. sp. nov., V : 180.
Vatica Gilletii De Wild. nom. nov., V : 56.
— Homblei De Wild. nom. nov., V : 55.
Vernonia acuta De Wild. sp. nov., V : 90.
— bukamaensis De Wild. sp. nov., V : 95.
— densecapitulata De Wild. sp. nov., V : 92.
— Descampsi De Wild. sp. nov., V : 97.
— Giorgii De Wild. sp. nov., V : 92.
— kivuensis Humbert et Staner sp. nov., XIV : 100.
— Laurenti De Wild. sp. nov., V : 94.
— Lescrauwaeti De Wild. sp. nov., IV : 228.
— lualabaensis De Wild. sp. nov., V : 93.
— manikensis De Wild. sp. nov., V : 99.
— punctulata De Wild. sp. nov., V : 100.
— roseo-violacea De Wild. sp. nov., V : 98.
—rugosifolia De Wild. sp. nov., V : 89.
— Sapini De Wild. sp. nov., IV : 230.
— Scaettae Humbert et Staner sp. nov., XIV : 102.
— towaensis De Wild. sp. nov., V : 96.
— Verschuereni De Wild. sp. nov., V : 94.
— violaceo-papposa De Wild. sp. nov., V : 89.
Vigna Bequaertii Wilczek sp. nov., XXIV : 436.
— desmodioides Wilczek sp. nov., XXIV : 438.
— dolomitica Wilczek sp. nov., XXIV : 441.
— esculenta (De Wild.) De Wild. ex Th. et H. Dur. comb. nov., II : 151.

Vigna Haumaniana Wilczek sp. nov., XXIV : 434.
— Haumaniana Wilczek var. pedunculata Wilczek var. nov., XXIV : 436.
— heterophylla A. Rich. var. lanceolata Wilczek var. nov., XXIV : 440.
— Kassneri Wilczek sp. nov., XXIV : 439.
— katangensis (De Wild.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 151.
— macrodon Robyns et Boutique sp. nov., XVIII : 262.
— membranaceoides Robyns et Boutique sp. nov., XVIII : 263.
— pubescens Wilczek sp. nov., XXIV : 442.
— scabra (De Wild.) De Wild. ex Th. et H. Dur. comb. nov., II : 152.
— villosa Savi f. violacea (Moench) Cuf. comb. nov., XXV : suppl. 338.
Vinticena rugosifolia (De Wild.) Robyns et Lawalrée comb. nov., XVIII : 272.
Virectaria angustifolia (Hiern) Brem. var. Schlechteri Verdcourt var. nov., XXIII : 48.
— major (K. Schum.) Verdcourt comb. nov., XXIII : 42.
— major (K. Schum.) Verdcourt var. spathulata Verdcourt var. nov., XXIII : 46.
Volutellopsis Torrend gen. nov., IV : 11.
— sulfurea Torrend sp. nov., IV : 12.

Walleria Hocki De Wild. sp. nov., V : 8.
Whitfieldia elongata (P. Beauv.) De Wild. et Th. Dur. var. abbreviata Mildbr. var. nov., XVII : 88.
Wurmbea Homblei De Wild. sp. nov., V : 8.

Xanthodactylon Duvign. gen. nov., XVI : 260.
— perforatum Duvign. sp. nov., XVI : 261.
Xerocomus albobrunneus Heinemann et Goossens sp. nov., XXI : 271.
— alliaceus (Beeli) Heinemann comb. nov., XXI : 266.
— boletiformis (Beeli) Heinemann comb. nov., XXI : 274.
— njalaensis (Beeli) Heinemann comb. nov., XXIV : 119.
— pallidiporus Heinemann sp. nov., XXI : 273.
— phlebophoides Heinemann sp. nov., XXIV : 116.
— pseudotristis Heinemann et Goossens sp. nov., XXI : 278.
— spinulosus Heinemann et Goossens sp. nov., XXI : 268.
— sulcatipes Heinemann et Goossens sp. nov., XXI : 276.

Xylopia Brieyi De Wild. sp. nov., IV : 385.
— chrysophylla Louis ex Boutique sp. nov., XXI : 108.
— Flamignii Boutique sp. nov., XXI : 110.
— Gilbertii Boutique sp. nov., XXI : 110.
— katangensis De Wild. var. Gillardinii Boutique var. nov., XXI : 109.
— mayombensis De Wild. sp. nov., IV : 386.
— Toussaintii Boutique sp. nov., XXI : 111.
Xysmalobium tricorniculatum (K. Schum.) Th. et H. Dur. comb. nov., II : 358.
Zenkerella capparidacea (Taub.) J. Léonard comb. nov., XXI : 413.
— egregia J. Léonard sp. nov., XXI : 414.
— Grotei (Harms) J. Léonard comb. nov., XXI : 413.
— Schliebenii (Harms) J. Léonard comb. nov., XXI : 413.
Zornia pratensis Milne-Redh. sp. nov., XXIV : 127.
— pratensis Milne-Redh. subsp. barbata J. Léonard et Milne-Redh. subsp. nov., XXIV : 127.
Zygodon Reinwardtii (Hornsch.) Al. Braun var. ruwenzorensis (Thér. et Nav.) Demaret comb. nov., XVI : 66.

Table alphabétique des groupements végétaux
Alphabetische tafel van de plantengemeenschappen

Sont seuls repris ci-dessous les groupements auxquels un nom a été donné dans la Nomenclature latine (noms terminés en : -etea, -etalia, -ion, -etum, -etosum, -osum).

Zijn alleen hieronder opgenomen de gemeenschappen aan dewelke een naam is gegeven in de latijnse Nomenclatuur (namen eindigend op : -etea, -etalia, -ion, -etum, -etosum, -osum).

Adiantetalia, XXII : 38.
Agropyretum boreo-atlanticum Br.-Bl. et de Leeuw, XXIII : 92.
Alchemilletum, XVI : 320.
Alchorneetum, XVIII : 74, 80, 81; XXV : 372.
Alnetum, XV : 186, 206.
Alnion, XV : 205.
Ammophiletalia, XVI : 419.
Ammophiletum arenariae, XXIV : 389.
Ammophilion Br.-Bl., XXIII : 92, 93, 95.
Armerieto-Festucetum Br.-Bl. et de Leeuw, XXIII : 92
Armerion maritimae Br.-Bl. et de Leeuw, XXIII : 92, 96, 99 ; XXIV : 395, 396.
Arrhenatheretalia, XVI : 423; XXII : 49.
Artemisietum maritimae Br.-Bl. et de Leeuw, XXIII : 92, 99.

Bambusetum, XIX : 196.
Brachypodietum phaenicioidis, XVI : 426.
Brachythecietum glareosi Demar., XVII : 193, 197, 206, 209, 212, 215, 216, 220.

Brachythecietum glareosi Neckeretosum crispae Demar. subass. nov., XVII : 196, 197, 207, 209, 212, 215, 216, 218, 220.
Brometalia, XVI : 423; XXIII : 95.

Calamagrostidetum epigeios, XXIV : 392.
Calletum palustris Vanden Berghen ass. nov., XXII : 32, 57, 59.
Calletum palustris Sphagnetosum Vanden Berghen subass. nov., XXII : 35.
Calluneto-Genistetum, XIX : 134.
Cardamineto-Montion, XXV : 208.
Caricetalia Davallianae, XXII : 36.
Caricetalia fuscae Koch, XXII : 5, 6, 7, 9, 22, 33, 34, 35, 36, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 59.
Cariceto canescentis — Agrostidetum caninae Tüxen, XXII : 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 57, 58.
Cariceto canescentis — Agrostidetum caninae Caricetosum paniceae Tüxen, XXII : 48.
Cariceto canescentis — Agrostidetum caninae Juncetosum, XXII : 48.
Cariceto canescentis — Agrostidetum caninae Sphagnetosum Schwickerath, XXII : 47.
Cariceto-Drepanocladetum, XXIV : 394.
Cariceto-Fraxinetum, XV : 186, 192, 199, 202, 206, 207, 208, 210.
Cariceto remotae — Fraxinetum Caricetosum pendulae, XV : 202, 207, 209, 210.
Caricetum canescentis-fuscae (Br.-Bl.) Vlieger, XXII : 41.
Caricetum diandrae Jonas, XXII : 21.
Caricetum diandro-lasiocarpae basiclinum Duvigneaud, XXII : 21.
Caricetum fuscae Br.-Bl., XXII : 50.
Caricetum fuscae Hypnosum Schwickerath, XXII : 41.
Caricetum Goodenoughii Jonas, XXII : 41.
Caricetum lasiocarpae Koch, XXII : 10, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 52, 55, 58, 59.
Caricetum lasiocarpae acidoclinum Duvigneaud, XXII : 21.
Caricetum lasiocarpae Caricetosum limosae Koch, XXII : 30.
Caricetum lasiocarpae Droseretosum Vanden Berghen subass. nov., XXII : 30.
Caricetum lasiocarpae Equisetosum limosi Vollmar, XXII : 30.
Caricetum lasiocarpae eutrophicum Duvigneaud et Vanden Berghen, XXII : 21.

Caricetum lasiocarpae Littorelletosum Vanden Berghen, XXII : 30.
Caricetum lasiocarpae Menyanthedosum Koch, XXII : 30.
Caricetum lasiocarpae Molinietosum Vanden Berghen subass. nov., XXII : 31.
Caricetum lasiocarpae oligomesotrophicum Duvigneaud et Vanden Berghen, XXII : 21.
Caricetum lasiocarpae Scorpidietosum Vanden Berghen, XXII : 27, 28.
Caricetum lasiocarpae Sphagnetosum Schwickerath, XXII : 31.
Caricetum limosae Koch, XXII : 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 30, 53, 55, 56, 57, 58, 59.
Caricetum limosae eutrophicum Duvigneaud, XXII : 8.
Caricetum limosae Hypnetosum Vanden Berghen, XXII : 11.
Caricetum limosae Sphagnetosum cuspidati (Osvald) Vanden Berghen subass. nov., XXII : 10, 11, 15.
Caricetum limosae Sphagnetosum recurvi (Osvald) Vanden Berghen subass. nov., XXII : 11.
Caricetum rostratae Rübel, XXII : 21, 52.
Caricetum rostratae sphagnosum Jonas, XXII : 8.
Caricetum runssorensis, XVI : 321.
Caricetum vulgaris Schwickerath, XXII : 41.
Caricion canescentis-fuscae Tüxen, XXII : 40.
Caricion canescentis — Goodenoughii Nordhagen, XXII : 6, 7, 20, 41, 53, 55, 57.
Caricion Davallianae Klika, XXII : 6, 7, 20, 35, 36, 38, 53, 56.
Caricion fuscae Klika non Koch, XXII : 6, 40.
Caricion fuscae Koch, XXII : 5, 35; XXIV : 396.
Caricion lasiocarpae Vanden Berghen, XXII : 7, 20, 34, 46, 50, 54, 56.
Carpinion, XV : 192.
Centaurieto-Saginetum, XXIV : 394, 395.
Centaurieto-Saginetum moniliformis, XXIV : 392.
Ciciendietum filiformis, XXIV : 395.
Cicuteto-Caricetum pseudocyperus Boer, XXII : 35.
Corylo-Quercetum, XIII : 58.
Corynephoretum, XXII : 52.
Corynephorion, XXIII : 95.
Cratoneuretum commutati, XVII : 202, 220.

Cratoneurion commutati Koch, XVII : 203.
Ctenidion Stefureac, XVII : 193, 208, 209, 215, 218.

Drepanocladeto-Caricetum trinervis Duvigneaud, XXII : 39.

Elymeto-Ammophiletum Br.-Bl. et de Leeuw, XXIII : 92.
Elymeto-Ammophiletum Br.-Bl. et de Leeuw festucetosum (Hueck) Tüxen, XXIII : 92, 93.
Elymeto-Ammophiletum Br.-Bl. et de Leeuw typicum (Tüxen) Westhoff, XXIII : 92, 93.
Endymieto-Quercetum, XV : 197.
Endymieto-Quercetum bretonicum, XV : 196.
Epipacto-Schoenion ferruginei Duvigneaud, XXII : 35.
Ericeto-Ledetalia palustris, XXII : 6.
Ericeto-Sphagnetalia, XXII : 11, 30.
Ericetum, XVI : 38; XVIII : 266; XIX : 134; XXII : 14, 18, 51, 52, 57.
Ericetum tetralicis boreoatlanticum, XXII : 19.
Eriophorion latifoliae Br.-Bl. et Tüxen, XXII : 35.

Fagetalia, XV : 196, 197, 198, 205, 207, 210, 211.
Fagetum silvaticae, XVIII : 86.
Fagion, XV : 197.
Fraxino-Carpinion, XV : 176, 185, 189, 196, 205, 207, 210, 211.

Grimmietalia, XVII : 202.
Grimmietum orbicularis Allorge, XVII : 200, 202, 212, 218, 220.

Hippophaeto-Ligustretum Meltzer, XXII : 200; XXIII : 92, 94.
Hyparrhenietum diplandrae, XVI : 416.

Junceto-Caricetum extensae Br.-Bl. et de Leeuw, XXIII : 92.
Juncetum filiformis Tüxen, XXII : 48.
Juncetum filiformis Bellisetosum Tüxen et Preising, XXII : 49.
Juncetum filiformis Caricetosum gracilis Duvigneaud et Vanden Berghen, XXII : 49.

Koelerion albescentis (Br.-Bl.) Weevers, XXIII : 92, 95.
Littorelletalia, XXII : 30.
Littorellion, XXII : 16.

Lolieto-Cynosuretum cristati, XXIV : 390.
Loudetio-Orchetum Berlinietosum, XXII : 103.
Lycopodieto-Rhynchosporetum albo-fuscae Duvigneaud, XXII: 15.

Magnocaricion, XXII : 49.
Mesophylletum nigrellae Allorge, XVII : 220.
Molinietalia, XXII : 6, 31, 36, 48.
Molinion coeruleae, XXII : 36; XXIV : 391, 392.
Molino-Caricetalia fuscae, XXII : 6.
Myriophylleto-Nupharetum Koch, XVII : 51.

Nanocyperion flavescentis, XXIV : 396.
Nardeto-Juncetum, XXII : 19.
Narthecietum ossifragi, XXII : 14, 17.

Parvocaricetum Goodenoughii Duvigneaud et Vanden Berghen, XXII : 41, 50.
Parvocaricetum Goodenoughii boreoatlanticum Duvigneaud, XXII : 41.
Parvocaricetum Goodenoughii montanum Duvigneaud, XXII : 50.
Parvocaricion canescentis-fuscae Duvigneaud et Vanden Berghen, XXII : 40.
Phragmitetalia, XXII : 20, 35, 38, 41, 46.
Phragmitetum, XIX : 106.
Phragmition Koch, XVII : 52; XXII : 34.
Potamion eurosibiricum Koch, XVII : 51.
Puccinellietum maritimae (Rankin) Christiansen, XXIII : 92, 98, 99.
Puccinellion maritimae (Christiansen) Tüxen, XXIII : 92, 96.

Quercetalia, XV : 198.
Quercetalia pubescentis-sessiliflorae (Tüxen) Malcuit, XXII : 200.
Querceto-Betuletum, XV : 180, 184, 185, 186, 189, 191, 192, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 206, 212, 214; XIX : 102, 119, 123.
Querceto-Betuletum Molinietosum, XV : 199.
Querceto-Carpinetum, XV : 176, 192, 196, 197, 199, 201, 202, 204, 206, 209, 211, 214.
Querceto-Carpinetum atlanticum, XV : 197.
Querceto-Carpinetum Filipendulëtosum, XV : 194, 209.
Querceto-Carpinetum Luzuletosum, XIX : 120.

Querceto-Carpinetum Stachyetosum, XV : 196, 209.
Querceto-Lithospermetum (Br.-Bl.) Tüxen, XXII : 200.
Querceto roboris-Betuletum, XV : 192.
Querceto sessiliflorae-Betuletum, XV : 178, 180, 183, 184, 189, 191, 192, 193, 200, 202, 209, 212; XIX : 120.
Querceto sessiliflorae-Betuletum Molinietosum, XV : 179, 180, 186, 189, 193, 206, 209.
Quercion, XV : 181, 193, 205.

Rhynchosporetum albae Koch, XXII : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 51, 52, 57, 58, 59.
Rhynchosporetum albae Caricetosum paniceae Diemont et Tüxen, XXII : 17, 18, 19, 51, 57, 58.
Rhynchosporetum albae Sphagnetosum cuspidati Diemont et Tüxen, XXII : 16, 58, 59.
Rhynchosporetum fuscae Louis et Lebrun, XXII : 15.
Rhynchosporion albae Koch, XXII : 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 20, 54.
Ruderetalia, XVI : 423.

Salicornieto-Spartinetum Br.-Bl. et De Leeuw, XXIII : 92, 96, 97, 98, 99.
Scheuchzerietalia palustris, XXII : 6.
Scheuchzerietum palustris Tüxen, XXII : 8.
Scheuchzerion palustris Nordh., XXII : 6, 7.
Scheuchzerio-Rhynchosporion albae Duvigneaud, XXII : 7.
Schoenetum, XXII : 37, 38, 57.
Schoenetum nigricantis Koch, XXII : 36, 37, 38, 53, 57.
Schoenetum nigricantis belgicum Duvigneaud et Vanden Berghen, XXII : 38.
Schoenetum nigricantis bohemicum, XXII : 39.
Schoenetum nigricantis Eleocharetosum pauciflorae (Koch) Tüxen, XXII : 37.
Schoenetum nigricantis germanicum, XXII : 39.
Schoenetum nigricantis helveticum, XXII : 39.
Schoenetum nigricantis metuonense Westhoff, XXII : 39.
Schoenetum nigricantis parisiensis, XXII : 39.
Schoenetum nigricantis typique, XXII : 37.
Schoenion ferruginei Nordh., XXII : 6, 35.
Scirpetum pauciflorae Lemée, XXII : 37.
Secalinetalia, XV : 201; XVI : 423.
Secalinion, XV : 200.

Seligerietum pusillae Demar., XVII : 198, 204, 206, 212, 220.
Sphagnetum cuspidati Duvigneaud et Vanden Berghen, XXII : 8, 11, 14, 16, 35, 47, 48.
Sphagnion fusci Louis et Lebrun, XXII : 7.

Thero-Salicornion Br.-Bl., XXIII : 92, 96.
Tortuleto-Phleetum, XXIV : 393, 394.

Umbilicarietum, XVI : 316, 332.

Valerianeto-Filipenduletum Sissingh, XXII : 199.

Table alphabétique des illustrations
Alphabetische tafel van de illustraties

Acalypha Bequaerti Staner (inflorescence de l'), XV : 142, fig. 2.
Acer platanoides, I : 216, fig. 13.
Acer rubrum, I : 216, fig. 13.
Acioa Gilletii De Wild. : A, coupe transversale de la partie médiane du « réceptacle », XXI : 169, fig. 42.
Acioa guianensis Aubl. : F, coupe de la fleur (d'après Engler), XXI : 171, fig. 43.
Adinandra intermedia Boutique et Troupin, XX : 64, fig. 10.
Adinandra intermedia Boutique et Troupin : A, fleur; B, corolle étalée avec étamines et gynécée; C, étamine, face interne; D, ovaire, coupe transversale; E, graine, XX : 63, fig. 8.
Adinandra intermedia Boutique et Troupin, XX : 64, fig. 9.
Aegopodium Podagraria, cultivés à diverses profondeurs, I : 181, fig. 5.
Aeschynomene upembensis J. Léonard, XXIV : 77, fig. 10.
Aesculus Hippocastanum, I : 216, fig. 10 et 11.
Aesculus Hippocastanum : rameau cultivé à l'air libre, I : 216, fig. 10.
Afroguatteria Bequaerti (De Wild.) Boutique : A. rameau florifère; B. fleur, coupe longitudinale; C. étamine, face externe; D. carpelle; E. carpelle, coupe longitudinale; F. fruit avec insertion; G. méricarpe; H. méricarpe, coupe longitudinale, XXI : 105, pl. II.
Agropyron junceum (Juslen.) P. Beauv. subsp. boreoatlanticum Simonet et Guinochet, XXIII : 93, fig. 15.
Agropyron littorale (Host) Dum., XXIII : 103, fig. 18.

Aire de distribution générale de Pachystigma pygmaeum, XI : 16, fig. 3.
Aire de distribution de Pachystigma pygmaeum au Transvaal, XI : 17, fig. 4.
Akènes des Ranunculus du Congo belge, XV : 313, pl. XI.
Alafia Barteri, XXIV : 161, pl. III.
Alafia caudata, XXIV : 161, pl. III.
Alafia congolana, XXIV : 196, pl. V.
Alafia conica, XXIV : 161, pl. III.
Alafia d'Afrique (répartition des), XXIV : 147, fig. 15; 163, fig. 17; 173, fig. 18; 183, fig. 19; 211, fig. 20.
Alafia glabriflora, XXIV : 161, pl. III.
Alafia grandis, XXIV : 196, pl. V.
Alafia landolphioides, XXIV : 161, pl. III.
Alafia lucida, XXIV : 180, pl. IV.
Alafia microstylis, XXIV : 180, pl. IV.
Alafia multiflora, XXIV : 207, pl. VI.
Alafia orientalis, XXIV : 207, pl. VI.
Alafia Schumannii, XXIV : 207, pl. VI.
Alafia ugandensis, XXIV : 180, pl. IV.
Alafia Verschuereni, XXIV : 161, pl. III.
Albizzia moluccana. Jeunes rachis pendant verticalement. Folioles appliquant leur face supérieure contre la face inférieure de la foliole suivante, I : 216, fig. 6.
Alchemilla en Abyssinie (distribution des), XIV : 7, fig. 1.
Alchemilla abyssinica Fresen., XIV : 27, fig. 7.
Alchemilla abyssinica Fresen. var. Schimperi Engl., XIV : 25, fig. 6.
Alchemilla andringitrensis De Wild. et Viguier, XIV : 42, fig. 11.
Alchemilla bifurcata Hils et Bojer (Feuille et fleur), XIV : 48, fig. 13.
Alchemilla cryptantha Steud., XIV : 10, fig. 2.
Alchemilla gracilis Pax, XIV : 28, fig. 8.
Alchemilla gunae Schweinf., XIV : 19, fig. 4.
Alchemilla Hendrickxii Hauman, près du sommet du mont Nyamungungu; à l'arrière-plan Bruyères arborescentes, XXII : 89, fig. 8.
Alchemilla Hildebrandtii Engl., XIV : 39, fig. 10.
Alchemilla malgaches (distribution géographique des), XIV : 35, fig. 9.
Alchemilla pedata Hochst., XIV : 21, fig. 5.
Alchemilla Rutenbergii O. Hoffm. (feuilles de), XIV : 43, fig. 12.

Alchemilla schizophila Bak. (feuille et fleur), XIV : 48, fig. 13.
Alchemilla Steudneri T. Fries, XIV : 15, fig. 3.
Aleurites molucana (climax forest of), XV : 257, fig. 14.
Allongement des entrenœuds des bourgeons, I : 117, fig. 1.
Allongement des entrenœuds et localisation des bourgeons, I : 118, fig. 2.
Aloë abyssinica, I : 362-363, schéma I.
Aloë arborescens, I : 362-363, schéma 3, II.
Aloë arborescens var. frutescens, I : 362-363, schéma 3, II.
Aloë brevifolia, I : 362-363, schéma 1, III.
Aloë distans, I : 362-363, schéma 3, II.
Aloë mitriformis, I : 362-363, schéma 4, III.
Aloë variegata, I : 362-363, schéma 9.
Aloë vera, I : 362-363, schéma 3, III.
Alpine Moss-Lichen formation at 9.000 feet on Mauna Loa, in Hawaii National Park, XV : 273, fig. 30.
Alpine Moss-Lichen formation at 9.000 feet elevation on Mauna Loa, Hawaii National Park, XV : 273, fig. 31.
Alysicarpus glumaceus (Vahl) DC., XXIV : 99, fig. 13.
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J. Léonard, XXIV : 89, fig. 11.
Alysicarpus rugosus (Willd.) DC., XXIV : 93, fig. 12.
Amanita Loosii. 2. Amanitopsis pudica. Carpophores, XIV : 89, pl. III.
Anacolosa uncifera Louis et Boutique : A. rameau florifère; B. rameau fructifère; C. bouton; D. fleur; E. fleur, coupe longitudinale; F. étamines; G. disque, coupe longitudinale; H. sommet du fruit, coupe longitudinale; I. fruit, coupe transversale, XVIII : 256, pl. III.
Ancylanthus fulgidus Welw., XI : 327, fig. 33; 328, fig. 34.
Andreaca cucullata Dix. : A, B, C, feuilles; D, mycelium de champignon sur la feuille; E, cellules supérieures de la feuille; F, cellules inférieures de la feuille, XVII : 45, fig. 12.
Andreaea firma C. Müll. : A, cellules supérieures de la feuille ; B, cellules inférieures de la feuille, XVII : 37, fig. 7.
Andreaea firma C. Müll. : XVII : 36, fig. 6.
Andreaea kilimandjarica Par. : A. feuilles; B. mycelium de champignon sur la feuille ,XVII : 42, fig. 10.
Andreaea kilimandjarica Par. : A. cellules supérieures de la feuille; B. cellules inférieures de la feuille; C. cellules supérieures de la feuille; D. cellules inférieures de la feuille, XVII : 43, fig. 11.

Andreaea Mildbraedii Broth. : A. feuilles de rameau ♀ ; B. feuilles de rameau ♂ ; C. feuilles périgoniales; D. anthéridie, XVII : 39, fig. 8.

Andreaea Mildbraedii Broth. : A. cellules supérieures d'une feuille de rameau ♀ ; B. cellules inférieures d'une feuille de rameau ♀ ; C. cellules supérieures d'une feuille de rameau ♂ ; D. cellules inférieures d'une feuille de rameau ♂, XVII : 39, fig. 9.

Andropogon argenteo-pilosa De Wild., VI : 26, pl. XXVIII, fig. 1-9.

Andropogon Bavicchii De Wild., VI : 28, pl. XXIX, fig. 1-14.

Andropogon Brieyi De Wild., VI : 29, pl. XXIX, fig. 15-29 et pl. XXX.

Andropogon Dewevrei De Wild., VI : 32, pl. XXXI, fig. 1-16.

Andropogon emarginatus De Wild., VI : 33, pl. XXXI, fig. 17-26.

Andropogon Homblei De Wild., VI : 35, pl. XXXII, fig. 16-20.

Andropogon Ringoeti De Wild., VI : 36, pl. XXXII, fig. 1-15.

Anona Cherimolia, I : 216, fig. 14, 15, 16.

Antidesma leptobotryum Müll.-Arg. Répartition géographique au Congo belge et au Moyen Congo français, Carte, XVII : 133, fig. 16.

Antidesma meiocarpum J. Léonard : A. feuille vue de la face inférieure et inflorescence ♂ ; B. détail de la nervation de la feuille; C. calice ♀ étalé vu de la face externe; D. fruits à l'état sec vus de face et de profil, XVII : 262, fig. 23.

Antidesma meiocarpum J. Léonard. Répartition géographique au Congo belge, XVII : 265, fig. 24.

Antidesma membranaceum Müll.-Arg. : A. feuille, face inférieure; B. détail de la nervation; C. ovaire avec stigmates terminaux. Antidesma venosum E. Mey. ex Tul.: D. feuille, face inférieure; E. détail de la nervation. Antidesma leptobotryum Müll.-Arg. : F. feuille, face inférieure; G. détail de la nervation; H. ovaire avec stigmates latéraux, XVII : 131, fig. 15.

Apecheau (répartition schématique des groupements végétaux du bois d'), XV : 203, fig. 107.

Aphanocalyx cynometroides Oliv. feuille, XXI : 129, fig. 32.

Aphanocalyx margininervatus J. Léonard : feuille, XXI : 129, fig. 32.

Appendices apicaux et basilaires des anthères des Arctium. — A : subsp. majus. — B : subsp. platylepis. — C : subsp. euminus. — D : subsp. pubens. — E : subsp. atlanticum. — F : subsp. mediterraneum var. eumediterraneum. — G : subsp.

nemorosum var. eunemorosum. — H : subsp. alpestre. — I : A. tomentosum. — J : subsp. balearicum. — K : subsp. corsicum. — L : subsp. Aellenianum. — M : subsp. Chaberti. — N : subsp. Tchihatchefii, XX : 149, fig. 15.

Arctium dans le bassin méditerranéen et les contrées limitrophes (distribution du genre), XX : 135, fig. 14.

Arctium en Belgique, en Hollande et en Corse (distribution du genre), XX : 131, fig. 13.

Arctium. — 1 : limites de l'aire de la sous-espèce majus. — 2 : régions où a été signalé A. tomentosum var. glabrum. — 3 : limites de l'aire d'Arctium tomentosum. — 4 : limite d'extension maximale du glacier scandinave, XX : 77, fig. 11.

Arctium. — 1 : limites de l'aire de la sous-espèce eu-minus. — 2 : limites de l'aire de la sous-espèce nemorosum var. eunemorosum. — 4 : limite d'extension du glacier scandinave vers le XII[e] millénaire avant Jésus-Christ.— 5 : limite d'extension maximale du glacier scandinave, XX : 85, fig. 12.

Arctium (appendices apicaux et basilaires des anthères des), XX : 149, fig. 15.

Arctium Chaberti subsp. corsicum, XX : 79, pl. III.

Arctium minus subsp. alpestre, XX : 87, pl. IV.

Arctium minus subsp. eu-minus, XX : 93, pl. V.

Arctium minus subsp. mediterraneum var. libanum, XX : 95, pl. VI.

Arctium tomentosum, XX : 115, pl. VII.

Aristida Vanderysti De Wild., VI : 40, pl. XXXV, fig. 7-12.

Armerieto-Festucetum, XXIII : 103, fig. 17.

Artemisia maritima L., XXIII : 109, fig. 22.

Artemisietum maritimae, XXIII : 103, fig. 18.

Atopostema Klainii (Pierre) Boutique : A. rameau feuillé; B. inflorescence; C. bouton vu de dessous; D. bouton, coupe longitudinale; E. gynécée et androcée; F. étamines, face interne, externe, de profil; G. carpelle, coupe longitudinale; H. infrutescence ; I. méricarpe, coupe longitudinale, XXI : 122, pl. IV.

Badly overgrazed area in transition zone between transition forest and mountain, Golf Course, Hawaii National Park, XV : 288, fig. 41.

Baikiaea Ghesquiereana J. Léonard, XXI : 131, fig. 33.

Barbula eubryum C. Müll., XXIV : 53, fig. 8.

Batrachospermum en Belgique (répartition des espèces), XV : 321, pl. XII.

Batrachospermum (répartition par provinces des espèces de), XV : 320, fig. 44.

Beilschmiedia alata Robyns et Wilczek : A, fleur épanouie, coupe longitudinale; B, étamine extérieure, face interne; C, étamine du 3e verticille, face externe; D, staminode du 4e verticille, face interne, XIX : 477, fig. 43.

Beilschmiedia auriculata Robyns et Wilczek : A, fleur épanouie, coupe longitudinale; B, étamine extérieure, face externe; C, étamine extérieure, profil; D, étamine du 3e verticille, face externe; E, staminode du 4e verticille, face externe, XIX : 499, fig. 48.

Beilschmiedia barensis (Engl. et Krause) Robyns et Wilczek : A, fleur épanouie, vue de dessus; B, étamine extérieure, face interne; C, étamine du 3e verticille, face externe; D, staminode du 4e verticille, face externe, XX : 211, fig. 21.

Beilschmiedia Dinklagei (Engl.) Robyns et Wilczek : A, fleur épanouie, vue de dessus; B, étamine extérieure, face interne ; C, étamine du 3e verticille, face externe; D, staminode du 4e verticille, face interne, XIX : 495, fig. 47.

Beilschmiedia insularum Robyns et Wilczek : A, fleur épanouie, vue de dessus; B, étamine extérieure, face interne; C, étamine du 3e verticille, face interne; D, staminode du 4e verticille, face interne, XIX : 479, fig. 44.

Beilschmiedia Lebrunii Robyns et Wilczek : A, fleur épanouie, vue de dessus; B, étamine extérieure, face interne; C, étamine du 3e verticille, face externe; D, staminode du 4e verticille, face externe, XIX : 489, fig. 45.

Beilschmiedia Louisii Robyns et Wilczek : A, fleur épanouie, vue de dessus; B, étamine extérieure, face interne; C, étamine du 3e verticille, face externe, entourée de glandes réniformes; D, staminode du 4e verticille, face interne, XIX : 471, fig. 42.

Beilschmiedia olivacea Robyns et Wilczek : A, fleur épanouie, coupe longitudinale; B, étamine extérieure, face interne; C, étamine du 3e verticille, face externe; D, staminode du 4e verticille, face interne, XIX : 491, fig. 46.

Beilschmiedia variabilis Robyns et Wilczek : A, fleur épanouie, vue de dessus; B, étamine extérieure, face interne; C, étamine du 3e verticille, face externe; D, staminode du 4e verticille, face externe, XIX : 503, fig. 49.

Beirnaertia yangambiensis Louis ex Troupin : A, port de la plante; B, cymule de fleurs; C, sépale extérieur; D, sépale intérieur;

E, pétale; F, étamine, face intérieure; G, fruit in vivo; H, coupe longitudinale du fruit, XIX : 421, pl. XVIII.

Berlinia Gilletii De Wild. : A, coupe longitudinale de la fleur montrant la présence du tube réceptaculaire et l'inégalité des pétales; B, diagramme floral. — Isoberlinia angolensis (Welw. ex Benth.) Hoyle et Brenan var. lasiocalyx Hoyle et Brenan; C, coupe longitudinale de la fleur montrant la présence du tube et la subégalité des pétales; D, diagramme floral. — Julbernardia paniculata (Benth.) Troupin : E, coupe longitudinale de la fleur montrant l'absence de tube réceptaculaire et l'inégalité des pétales, XX : 297, fig. 29.

Blighia sapida Koenig : A. fleur épanouie, coupe longitudinale ; B. pétale, face interne; C. pétale de profil, coupe longitudinale; D. fruit, coupe transversale; E. nervure primaire de la foliole, coupe transversale, XXI : 153, fig. 39.

Blighia unijugata Baker : A. fleur épanouie, coupe longitudinale; B. pétale, face interne; C. pétale de profil, coupe longitudinale; D. fruit, coupe transversale; E. nervure primaire de la foliole, coupe transversale, XXI : 161, fig. 41.

Blighia Welwitschii (Hiern.) Radlk. : A. fleur épanouie, coupe longitudinale; B. pétale, face interne; C. pétale de profil, coupe longitudinale; D. fruit, coupe transversale; E. nervure primaire de la foliole, coupe transversale, XXI : 155, fig. 40.

Boletellus lepidospora Gilbert, XXI : 295, fig. 78.

Boletellus longipes Heinemann, XXI : 293, fig. 77.

Boletellus obscurecoccineus (Hoehnel) Singer, XXI : 289, fig. 75.

Boletellus purpurascens Heinemann, XXI : 299, fig. 80.

Boletellus pustulatus (Beeli) Gilbert, XXI : 291, fig. 76.

Boletellus rubroviolaceus Heinemann, XXI : 297, fig. 79.

Boletochaete calocystis Heinemann et Goossens, XXI : 285, fig. 73; 289, fig. 74.

Boletochaete Goossensii (Beeli) Heinemann, XXI : 283, fig. 72.

Boletus congoensis (Beeli) Heinemann, XXI : 332, fig. 95.

Boletus loricaceus, XV : 52, pl. IV, fig. 34.

Boletus njalaensis, XV : 52, pl. IV, fig. 33.

Bommer (Charles), XV : 121, portrait.

Boulenger (Georges Albert), XV : 1, portrait.

Boulenger (G. A.) examinant un buisson de Roses à Wavreille, en 1919, XV : 9, fig. 1.

Bourgeons (courbure des), I : 121, fig. 7.

Bourgeons hivernants (courbure des), I : 124, fig. 11.

Bourgeons (localisation des), I : 119, fig. 3, 4; 120, fig. 5; 123, fig. 9.

Brachiaria ruziziensis Germain et Evrard, XXIII : 375, fig. 36; 377, fig. 37.

Brachiolejeunea camerunensis Jones et Vanden Berghen : A. rameau florifère avec deux innovations; B. amphigastre; C. feuilles; D. bractée involucrale; E. bractéole involucrale; F. périanthe, XXI : 91, fig. 30.

Brachiolejeunea nigra (Steph.) Steph. : G. feuille; H. amphigastre; I. coupe transversale dans le périanthe; J. bractée involucrale; K. bractéole involucrale; L. bractée involucrale; M. bractéole involucrale, XXI : 91, fig. 30.

Brachiolejeunea rhodesica Vanden Berghen : A. rameau florifère; B. feuilles; C. bractées involucrales; D. bractéole involucrale, XXI : 93, fig. 31.

Brachymenium latifolium Leroy : A. feuille supérieure; B. feuille inférieure; C. cellules basilaires, XVIII : 204, fig. 23.

Brachymenium perrevolutum Leroy : A. feuilles; B. cellules supérieures; C. cellules basilaires, XVIII : 205, fig. 24.

Brachystegia Kennedyi Hoyle, XXV : 185, fig. 44.

Brachystegia leonensis Burtt-Davy et Hutch., XXV: 185, fig. 44.

Brachystegia spiciformis Benth. var. Schmitzii Hoyle, XXI : 363, fig. 101.

Brachythecium velutinum (Hedw.) Br. et Schpr. var. validum (C. Jens.) C. Jens. : C. feuilles caulinaires; D. feuilles raméales; E. cellules du bord d'une feuille caulinaire au-dessus des oreillettes, XVIII : 99, pl. II.

Brachythecium velutinum (Hedw.) Br. et Schpr. var. validum (C. Jens.) C. Jens. f. uncinatulum Demar. : A. feuilles caulinaires; B. feuilles raméales; F. cellules du bord d'une feuille caulinaire au-dessus des oreillettes; G. sommet d'une feuille caulinaire; H. capsule munie de son opercule obtus, XVIII : 99, pl. II.

Brachytecium velutinum (Hedw.), Br. et Schpr var. validum (C. Jens.) C. Jens. f. uncinatulum Demr. : habitus, XVIII : 101, fig. 4.

Braine-le-Château (carte des environ de). Bois d'Apecheau et Bois Le Sart, XV : 195, fig. 6.

Bryum albo-pulvinatum C. Müll., XXIV : 55, fig. 9.

Bryum Brotherianum Demaret : D, feuilles; E, sommet d'une feuille; F, bord vers le milieu de la feuille, XIX : 357, fig. 29.

Bryum nigerianum Broth. et Par. var. Germainii P. de la V. et Demaret : A, feuilles; B, sommet d'une feuille; C, bord vers le milieu de la feuille; D, base de la feuille, XIX : 365, fig. 30.

Bryum pseudolimbatum Leroy : A. feuille; B. cellules supérieures; C. cellules basilaires; D. péristome, XVIII : 174, fig. 15.

Bryum usambaricum Broth. : A, feuilles; B, sommet d'une feuille; C, bord vers le milieu de la feuille, XIX : 357, fig. 29.

Caesalpinia glandulosopedicellata Wilczek : A. penne; B. foliolule, face inférieure; C. foliolule, bord serrulé-glanduleux; D. foliolule, dent glanduleuse; E. pédicelle, sommet; F. pétale, face interne; G. gynécée; H. stigmate; J. ovaire, coupe longitudinale, XXI : 84, fig. 29.

Calamagrostidetum epigeios, XXIV : 393, fig. 31.

Callicostella africana Mitt., XXII : 389, fig. 60.

Callicostella applanata Broth. et Bryhn, XXII : 353, fig. 43.

Callicostella attenuata (C. Müll.) Broth., XXII : 379, fig. 56.

Callicostella brevipes (Broth.) Broth., XXII : 373, fig. 53.

Callicostella brevipes (Broth.) Broth., XXII : 375, fig. 54.

Callicostella Chevalieri Broth., XXII : 349, fig. 41.

Callicostella chionophylla (C. Müll.) Broth., XXII : 363, fig. 49.

Callicostella constricta (C. Müll.) Broth., XXII : 393, fig. 61.

Callicostella emarginatula Broth. : A, feuille latérale; B, sommet de feuille latérale, XXII : 335, fig. 35.

Callicostella erosotruncata Card. : A, feuille latérale; B, sommet de feuille latérale, XXII : 339, fig. 37.

Callicostella fissidentella (Besch.) Broth., XXII : 369, fig. 51.

Callicostella gabonensis Broth. et P. de la V., XXII : 347, fig. 40.

Callicostella heterophylla J. Angstr., XXIII : 3, fig. 1.

Callicostella lacerans (C. Müll.) Jaeg., XXII : 381, fig. 57.

Callicostella laeviuscula Mitt., XXII : 357, fig. 45.

Callicostella laeviuscula Mitt. var. latifolia (P. de la V.) Demaret et P. de la V., XXII : 358, fig. 46.

Callicostella leptocladula (C. Müll. ex Broth.) Broth., XXII : 355, fig. 44.

Callicostella Maclaudii (Par. et Broth.) Broth., XXII : 361, fig. 48.

Callicostella papillosula Broth. et P. de la V., XXII : 371, fig. 52.

Callicostella parvocellulata Demaret et P. de la V. : A, feuille latérale; B, sommet de feuille latérale, XXII : 343, fig. 38.

Calicostella perpapillata Broth. et P. de la V. : 383, fig. 58.

Callicostella Perroti (Ren. et Card.) Broth., XXII : 359, fig. 47.

Callicostella pusilla Broth. ex Demaret et P. de la V., XXII : 345, fig. 39.
Callicostella Salaziae (Besch.) Broth., XXII : 377, fig. 55.
Callicostella seychellensis (Besch.) Broth., XXII : 365, fig. 50.
Callicostella subemarginatula Broth. et P. de la V. : A, feuille latérale; B, sommet de feuille latérale, XXII : 337, fig. 36.
Callicostella tristis (Rehm. ex C. Müll.) Broth., XXII : 351, fig. 42.
Callicostella usambarica (Broth.) Broth., XXII : 387, fig. 59.
Calymperes acanthoneuron P. de la. : A. partie supérieure d'une feuille; B. cellules de la base d'une feuille, XVIII : 168, fig. 14.
Calymperes subdiaphanum Leroy : A. coupe transversale d'une feuille; B. cellules basilaires; C. cellules supérieures, XVIII : 165, fig. 13.
Campylopodiella diversifolia Leroy et Thér. : A. feuilles inférieures; B. feuilles moyennes; C. feuille supérieure; D. feuilles perichétiales; E. et F. cellules basilaires, XVIII : 201, fig. 22.
Campylopus Germainii Demar. et Leroy : A, feuille; B, sommet d'une feuille vue de dos; C, bord de la feuille en a; D, bord de la feuille en b; E, coupe transversale de la nervure, XIX : 86, fig. 6.
Campylopus homomallus Leroy et Thér. : A, feuille; B, cellules supérieures; C, cellules basilaires; D, coupe transversale d'une feuille, XVIII : 163, fig. 12.
Campylostemon Laurentii De Wild. : A, réceptacle fructifère, avec un des trois méricarpes au moment de la déhiscence des valves; B, graine isolée, XVIII : 250, fig. 38.
Canavalia (graines de), XVIII : 73, fig. 1.
Carapa grandiflora Spr. : A, rameau feuillu ; B, inflorescence ; C, fleur épanouie; D, calice; E, pétale; F, tube staminal (face interne); G, gynécée et disque; H, coupe longitudinale de l'ovaire; J, coupe transversale de l'ovaire et disque vu du haut, XVI : 121, pl. I.
Carex diandra (coupe schématique dans une prairie flottante avec), XXII : 28, fig. 2.
Carex lasiocarpa (représentation schématique de la localisation topographique de l'association à), XX : 29, fig. 3.
Carex limosa végétant dans un tapis de mousses à croissance rapide, XXII : 60, fig. 5.
Cariceto-Agrostidetum (profils pédologiques notés en Campine sous des individus du), XXII : 53, fig. 4.

Carpinus Betulus, I : 216, fig. 12.

Carte de la région de Nismes-Dourbes, XV : 153, fig. 3.

Carte des environs de Braine-le-Château. Bois d'Apecheau et Bois Le Sart, XV : 195, fig. 6.

Carte des environs de Oisquercq, XV : 177, fig. 4.

Cassia comosa Vog. var. capricornia Steyaert, XX : 262, pl. X.

Cassia Duboisii Steyaert : A, base d'une feuille avec glande en dessous de la dernière paire de folioles; B, glande vue de profil; C, sommet d'une feuille avec petite glande au sommet du canalicule joignant les deuxième et troisième paires de folioles ; D, inflorescences géminées supra-axillaires avec fleur en coupe, XX : 261, fig. 25.

Cassia gracilior (Ghesq.) Steyaert, XX : 262, pl. X.

Cassia kalulensis Steyaert, XX : 262, pl. X.

Cassia katangensis (Ghesq.) Steyaert, XX : 262, pl. X.

Cassia katangensis (Ghesq.) Steyaert var. biensis Steyaert, XX : 262, pl. X.

Cassia Kirkii var. guineensis Steyaert : A, aspect d'une tige et ramifications florifères; B, base et insertion d'une feuille montrant en profil la glande rachidienne ensellée et la pilosité des lèvres des canalicules interfoliaires; C, base d'un rachis, vue de face, montrant la glande elliptique et les canalicules interfoliolaires; D, sommet d'une feuille, vue de face, montrant les petites glandes logées dans les canalicules du sommet du rachis; E, fleur épanouie; F, fleur en coupe; G, étamine déhiscente; H, ovaire en coupe longitudinale; I, gousse approchant de la maturité ; J, graine dans sa loge montrant les ponctuations disposées en ligne du testa et le funicule oblique, XX : 255, pl. IX.

Cassia Kirkii Oliv. var. guineensis Steyaert et var. glabra Steyaert sur le continent africain (distribution de), XX : 259, fig. 24.

Cassia Meelii Steyaert (moitié inférieure droite des feuilles et des glandes rachidiennes de), XX : 262, pl. X.

Cassia mimosoides L. : A, aspect général d'une tige et d'une ramification florifère; B, base et insertion d'une feuille montrant la serrature à dentes aiguës du rachis, caractéristique de C. angustissima Lam.; C, sommet de la feuille, face supérieure; D, serrature du rachis à dents longues et à courbure obtuse que l'on peut tenir pour caractéristique de C. Telfairiana; H, ovaire, coupe longitudinale; I, gousse, XX : 241, pl. VII.

Cassia mimosoides L. sur le continent africain (distribution de), XX : 249, fig. 23.

Cassia Quarrei (Ghesq.) Steyaert : A, entrenœud de la tige montrant les caractéristiques foliaires, florales et de la jeune fructification; B, glande du rachis vue de 3/4, XX : 265, fig. 26.

Cassia Schmitzii Steyaert, XXI : 358, fig. 99.

Cassia sparsa Steyaert, XXI : 359, fig. 100.

Castanea americana, I : 216, fig. 12.

Castanea americana, cultivé sur le clinostat, I : 216, fig. 9.

Castilloa elastica, I : 216, fig. 14, 15, 16.

Cavacoa Quintasii (Pax et K. Hoffm.) J. Léonard, XXV : 321, fig. 54; 322, fig. 53.

Cedrela odorata, I : 216, fig. 14, 15, 16.

Centaurium minus Gars., XXIV : 359, pl. VIII ; 365, fig. 26; 393, fig. 31.

Centaurium minus Gars. (distribution en Belgique de), XXIV : 363, fig. 25.

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, XXIV : 377, pl. X; 380, pl. XI.

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce (distribution en Belgique de), XXIV : 377, fig. 29.

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce var. intermedium (Mérat) Gilmour, XXIV : 380, pl. XI.

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce var. intermedium (Mérat) Gilmour (distribution en Belgique de), XXIV : 385, fig. 30.

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce var. intermedium (Mérat) Gilmour f. contractum (Wittr. ex Corb.) A. Robyns, XXIV : 380, pl. XI.

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce var. intermedium (Mérat) Gilmour f. palustre (Van Hall) A. Robyns, XXIV : 380, pl. XI.

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce var. intermedium (Mérat) Gilmour f. palustre (Van Hall) A. Robyns (distribution en Belgique de), XXIV : 385, fig. 30.

Centaurium vulgare Rafn, XXIV : 365, fig. 27; 369, pl. IX.

Centaurium vulgare Rafn (distribution en Belgique de), XXIV : 373, fig. 28.

Ceratolejeunea beninensis Jones et Vanden Berghen : A, rameau avec inflorescence femelle et innovation; B, rameau stérile ; C, lobule foliaire; D, bractées involucrales, XXI : 65, fig. 23.

Ceratolejeunea beninensis Jones et Vanden Berghen : A, périanthe; B, ocelles, XXI : 67, fig. 24.

Ceratolejeunea calabariensis Steph. : C, ocelles, XXI : 67, fig. 26.

Ceratolejeunea calabariensis Steph. : A, rameau avec inflorescence femelle et innovation; B, périanthe; C, D et E, bractées et bractéole involucrales, XXI : 73, fig. 26.

Ceratolejeunea cornutissima Steph.: D, périanthes, XXI : 67, fig. 24.

Ceratolejeunea cornutissima Steph. : E, rameau avec inflorescence femelle et innovation; F, marge du lobule foliaire; G, bractées et bractéole involucrales, XXI : 65, fig. 23.

Ceratolejeunea diversicornua Steph. : E, périanthe, XXI : 67, fig. 24.

Ceratolejeunea diversicornua Steph. : A, rameau avec inflorescence femelle et innovation, XXI : 69, fig. 25.

Ceratolejeunea floribunda Steph. : D. périanthes; E et F, bractées et bractéole involucrales, XXI : 69, fig. 25.

Ceratolejeunea Jungneri Steph. : F, rameau stérile; G, feuille; H et I, périanthes; J. bractées et bractéole involucrales, XXI : 73, fig. 26.

Ceratolejeunea stictophylla Herz. : A, rameau stérile; B, fragment de lobe foliaire avec ocelles laminaires dispersés; C et D, lobules foliaires; E, tissu cellulaire, XXI : 80, fig. 28.

Ceratolejeunea umbonata Steph. : F, périanthe, XXI : 67, fig. 24.

Ceratolejeunea umbonata Steph. : B, rameau avec inflorescence femelle et innovation, XXI : 69, fig. 25.

Ceratolejeunea Zenkeri Steph. : A, rameau avec inflorescence femelle et innovation; B, périanthe; C, bractées et bractéole involucrales, XXI : 77, fig. 27.

Chenopodium, XV : 291, fig. 42.

Chevalierella Dewildemani (Vanderyst) Van der Veken, XXIV : 401, fig. 33.

Chevalierella Dewildemanii (Vanderyst) Van der Veken (distribution de), XXIV : 403, fig. 34.

Cinnamomum Burmannii Blume : A, feuille; B, Épiderme supérieur de la feuille; C, Épiderme inférieur de la feuille; D, Coupe transversale du stomate, XVII : 269, pl. IV.

Cinnamomum Camphora Nees et Eberm. : A, Feuille; B, Épiderme supérieur de la feuille; C, Épiderme inférieur de la feuille ; D, Coupe transversale du stomate, XVII : 271, pl. V.

Cinnamomum Cassia Blume : A, feuille; B, épiderme supérieur de

la feuille; C, épiderme inférieur de la feuille; D, Coupe transversale du stomate, XVII : 273, pl. VI.

Cinnamomum Cecidodaphne Meissn.: A, Feuille; B, épiderme supérieur de la feuille; C, épiderme inférieur de la feuille; D, coupe transversale du stomate, XVII : 275, pl. VII.

Cinnamomum citriodorum Thwait. : A, feuille; B, épiderme supérieur de la feuille; C, épiderme inférieur de la feuille; D, coupe transversale du stomate, XVII : 277, pl. VIII.

Cinnamomum glanduliferum Meissn. : A, feuille; B, épiderme supérieur de la feuille; C, épiderme inférieur de la feuille; D, coupe transversale du stomate, XVII : 279, pl. IX.

Cinnamomum impressinervium Meissn. : A, feuille; B, épiderme supérieur de la feuille; C, épiderme inférieur de la feuille ; D, coupe transversale du stomate, XVII : 281, pl. X.

Cinnamomum javanicum Blume : A, feuille; B, épiderme supérieur de la feuille; C, épiderme inférieur de la feuille; D, coupe transversale du stomate, XVII : 283, pl. XI.

Cinnamomum litsaeaefolium Thwait. : A, feuille; B, épiderme supérieur de la feuille; C, épiderme inférieur de la feuille; D, coupe transversale du stomate, XVII : 284, pl. XII.

Cinnamomum mercadoi Vidal : A, feuille; B, épiderme supérieur de la feuille; C, épiderme inférieur de la feuille; D, coupe transversale du stomate, XVII : 287, pl. XIII.

Cinnamomum mindanaense Elm. : A, feuille; B, épiderme supérieur de la feuille; C, épiderme inférieur de la feuille; D, coupe transversale, XVII : 289, pl. XIV.

Cinnamomum multiflorum Wight : A, feuille; B, épiderme supérieur de la feuille; C, épiderme inférieur de la feuille; D, coupe transversale du stomate, XVII : 291, pl. XV.

Cinnamomum ovalifolium Wight : A, feuille; B, épiderme inférieur de la feuille; C, épiderme supérieur de la feuille; D, coupe transversale du stomate, XVII : 293, pl. XVI.

Cinnamomum Parthenoxylon Meissn.: A, feuille; B, épiderme supérieur de la feuille; C, épiderme inférieur de la feuille; D, coupe transversale du stomate, XVII : 295, pl. XVII.

Cinnamomum pauciflorum Nees : A, feuille; B, épiderme supérieur de la feuille; C, épiderme inférieur de la feuille; D, coupe transversale du stomate, XVII : 297, pl. XVII.

Cinnamomum pedunculatum Nees : A, feuille; B, épiderme supérieur de la feuille; C, épiderme inférieur de la feuille; D, coupe transversale du stomate, XVII : 298, pl. XIX.

Cinnamomum Wightii Meissn. : A, feuille; B, épiderme supérieur de la feuille; C, épiderme inférieur de la feuille; D, coupe transversale du stomate, XVII : 301, pl. XX.

Cinnamomum zeylanicum Nees : A, feuille; B, épiderme supérieur de la feuille; C, épiderme inférieur de la feuille; D, coupe transversale du stomate, XVII : 303, pl. XXI.

Cladoniaceae, XVII : 153, fig. 17.

Climax forest of Aleurites moluceana, typical of the coastallowland forest, growing in a ravine near Ookala, Hawaii, XV : 257, fig. 14.

Clitoriopsis mollis Wilczek, XXIV : 413, fig. 35.

Coastallowland shrub above Punaluu. Clump of Myoporum sandwicense in center associated with Sida fallax and Argemone glauca. Elevation 400 feet, XV : 269, fig. 27.

Coastallowland shrub on the beach at Punaluu. Clumps of Scaevola coriacea in center, Sida fallax and close cropped grass in foreground, XV : 270, fig. 28.

Coffea Lebruniana Germain et Kesler, XXV : 406, fig. 57.

Cogniaux (Alfred), (1841-1916), V : 1, portrait.

Collybia albofurfuracea, XV : 48, pl. II, fig. 9.

Collybia sierraleonis, XV : 48, pl. II, fig. 10.

Collybia sp., XV : 48, pl. II, fig. 11.

Collybia viridis, XV : 47, pl. I, fig. 8.

Colophospermum Mopane Kirk ex J. Léonard A, feuille; B, graine; C, coupe transversale de la graine, XIX : 389, fig. 35.

Colubrina ferruginosa Brongn., fleur, XV : 407, fig. 50.

Colura digitalis (Mitt.) Steph. : tige feuillée, XXII : 175, fig. 19.

Comarum palustre (coupe schématique dans une prairie flottante avec), XXII : 28, fig. 2.

Congo belge (akènes des Ranunculus du), XV : 313, pl. XI.

Conidies de Pestalotia Mangiferae P. Henn.: B, Conidies de P. disseminata Thuem.; C, Conidies de P. annulata Berk. et Curt.; D, Conidies de P. mayumbensis R. L. Steyaert; E, Conidies de P. maculiformans Guba et Zeller, XIX : 175, pl. III.

Conidies de Pestalotia pezizoides de Not., XIX : 288, pl. VII.

Conidies de Pestalotia pezizoides de Not. sur Vitis aestivalis : A, jeune conidie à pseudo-septa annulaires schématiquement agrandis à côté; B, jeune conidie immature sur conidiophore ramifié; C, conidie à un stade plus avancé; masses globulaires déjà bien individualisées, XIX : 288, pl. VII.

Conidies de Pestalotia pezizoides DE NOT. sur Vitis riparium, XIX : 288, pl. VII.

Conidies de Pestalotia stictica BERK. et CURT.; B, Conidies de P. glandicola (CAST.) GUBA; C, Conidies de P. sonsensis P. HENN. C1, cellule hyaline supérieure, montrant le mode d'insertion des setas; D, Conidies de P. clavispora ATK.; E, Conidies de P. carbonacea R. L. STEYAERT, XIX : 180, pl. V.

Conidies de Pestalotia Theae SAW. var. minor R. L. STEYAERT; B, Conidies de P. aeruginea R. L. STEYAERT, de B_1 à B_8, Conidies anormales, XIX : 185, pl. VI.

Conidies de Pestalotiopsis aquatica (ELL. et EV.) STEYAERT, culture C. B. S., isolée de Cocos nucifera L., P, TAMMES, sub Pestalotia stellata B et C, XIX : 330, pl. XV.

Conidies de Pestalotiopsis baarnensis STEYAERT, culture C. B. S., isolée de Rhododendron sp., VAN HELL, sub Pestalotia Sydowiana BRES., XIX : 342, pl. XVII.

Conidies de Pestalotiopsis breviseta (SACC.) STEYAERT, culture C. B. S., isolée de Cocos nucifera L. P. TAMMES, sub Pestalotia gibberosa SACC., XIX : 316, pl. XII.

Conidies de Pestalotiopsis crassiuscula STEYAERT sp. nov. culture C. B. S., isolée d'Eucalyptus globulus, sub Pestalotio disseminata THUEM., XIX : 338, pl. XVI.

Conidies de Pestalotiopsis cruenta (SYD.) STEYAERT, culture C. B. S., isolée de Delonix regia RAFIN., XIX : 316, pl. XII.

Concidies de Pestalotiopsis dichaeta (SPEG.) STEYAERT, culture C. B. S. isolée de feuilles d'Araucaria sp., XIX : 314, pl. XI.

Conidies de Pestalotiopsis disseminata (THUEM.) STEYAERT, sur Cladium Mariscus R. BR., XIX : 320, pl. XIII.

Conidies de Pestalotiopsis Fici STEYAERT sp. nov., sur feuilles Ficus sp., XIX : 324, fig. 24.

Conidies de Pestalotiopsis foedans (SACC. et ELL.) STEYAERT, sur écorces de Thuya sp., XIX : 320, pl. XIII.

Conidies de Pestalotiopsis funerea (DESM.) STEYAERT, culture C. B. S., isolée de Juniperus sp., XIX : 342, pl. XVII.

Conidies de Pestalotiopsis funerea (DESM.) STEYAERT, culture C. B. S., isolée de « Swedish rapes » (Rapa sp.), XIX : 342, pl. XVII.

Conidies de Pestalotiopsis funerioides STEYAERT sp. nov., culture Sacavem, Portugal, isolée de Cupressus sp., Branquhinho d'Oliveira, sub Pestalotia funerea DESM. var. macrochaeta SPEG., XIX : 346, fig. 28.

Conidies de Pestalotiopsis gallica Steyaert sp. nov., XIX : 306, pl. VIII, IX.

Conidies de Pestalotiopsis glandicola (Cast.) Steyaert, culture C. B. S., isolée de Aucoumea Klaineama Pierre, XIX : 334, fig. 26.

Conidies de Pestalotiopsis glandicola (Cast.) Steyaert, culture C. B. S., isolée de Sapota Achras Mill., XIX : 338, pl. XVI.

Conidies de Pestalotiopsis gracilis (Kleb.) Steyaert, culture C. B. S., isolée de Retinospora sp., XIX : 314, pl. XI.

Conidies de Pestalotiopsis Guepini (Desm.) Steyaert, culture C. B. S.,, isolée d'Erica sp., XIX : 310, pl. X.

Conidies de Pestalotiopsis Guepini (Desm.) Steyaert, sur feuilles de Camellia sp., XIX : 310, pl. X.

Conidies de Pestalotiopsis hypodermia (Niessl.) Steyaert, sur feuilles conifères, XIX : 320, pl. XIII.

Conidies de Pestalotiopsis japonica (Syd.) Steyaert, culture C. B. S., isolée de Mangifera indica L., XIX : 330, pl. XV.

Conidies de Pestalotiopsis japonica (Syd.) Steyaert, sur Ceratonia siliqua L., XIX : 330, pl. XV.

Conidies de Pestalotiopsis Karstenii (Sacc. et Syd.) Steyaert, sur Camellia japonica, XIX : 306, pl. IX.

Conidies de Pestalotiopsis Karstenii (Sacc. et Syd.) Steyaert, sur feuilles de Camellia sp., XIX : 306, pl. IX.

Conidies de Pestalotiopsis Karstenii (Sacc. et Syd.) Steyaert, culture C. B. S., sub Pestalotia inquinans Karst., isolée de feuilles de Camellia japonica par Branquhinho d'Oliveira, XIX : 306, pl. IX.

Conidies de Pestalotiopsis Leucothoes (White) Steyaert, culture C. B. S., isolée de feuilles Leucothoes Catesbaei, XIX : 316, pl. XII.

Conidies de Pestalotiopsis macrospora (Ces.) Steyaert, sur Pteris aquilina L., Saccardo, sub Pestalotia Pteridis Sacc., XIX : 345, fig. 27.

Conidies de Pestalotiopsis Mangiferae (P. Henn.) Steyaert, sur feuilles de Mangifera indica L., XIX : 322, pl. XIV.

Conidies de Pestalotiopsis monochaetioides (Doyer) Steyaert, culture C. B. S., isolée de Chamaecyparis Lawsoniana Parl., XIX : 314, pl. XI.

Conidies de Pestalotiopsis monochaetioides (Doyer) Steyaert, culture C. B. S., isolée de Picea excelsa L., XIX : 310, pl. X.

Conidies de Pestalotiopsis natalensis (V. Beyma) Steyaert, culture C. B. S., isolée d'Acacia (mollissima ?), XIX : 342, pl. XVII.

Conidies de Pestalotiopsis oxyanthi (Thuem.) Steyaert, sur branches de Myrica Gale L., XIX : 320, pl. XIII.

Conidies de Pestalotiopsis Paeoniae (Serv.) Steyaert, culture C. B. S., XIX : 314, pl. XI.

Conidies de Pestalotiopsis Palmarum (Cke) Steyaert, sur feuilles de Cocos nucifera L., XIX : 322, pl. XIV.

Conidies de Pestalotiopsis papposa Steyaert sp. nov., sur feuilles de Cocos nucifera L., XIX : 322, pl. XIV.

Conidies de Pestalotiopsis papposa Steyaert sp. nov., XIX : 322, pl. XIV.

Conidies de Pestalotiopsis Planimi (Vize) Steyaert, sur feuilles en décomposition de Evonymus japonicus L., XIX : 326, fig. 25.

Conidies de Pestalotiopsis Royenae (Guba) Steyaert, culture C. B. S., isolée par Ciferri, sub Pestalotia Canangae Koorders, XIX : 316, pl. XII.

Conidies de Pestalotiopsis sp. sur Quercus pedunculata, Italie, sub Pestalotia monochaeta Desm., XIX : 310, pl. X.

Conidies de Pestalotiopsis sp. sur Quercus Ilicis, sub Monochaetia monochaeta L., XIX : 310, pl. X.

Conidies de Pestalotiopsis Theae (Saw.) Steyaert, sur feuilles Camellia Theae Link., XIX : 324, fig. 24.

Conidies de Pestalotiopsis Theae (Saw.) Steyaert var. minor Steyaert, culture C. B. S., isolée de Camellia Theae Link., XIX : 324, fig. 24.

Conidies de Pestalotiopsis Theae (Saw.) Steyaert var. minor Steyaert, sur feuilles de Klainedoxa regia Pierre, XIX : 322, pl. XIV.

Conidies de Pestalotiopsis triseta (M. et M^me^ F. Moreau) Steyaert, XIX : 338, pl. XVI.

Conidies de Pestalotiopsis versicolor (Speg.) Steyaert, culture C. B. S., isolée de Cocos nucifera L., XIX : 330, pl. XV.

Conidies de Pestalotiopsis virgatula (Kleb.) Steyaert, culture C. B. S., isolée de Caryota sp., XIX : 338, pl. XVI.

Conidies de Pestalotiopsis Westerdijkii Steyaert sp. nov., culture C. B. S., isolée de Cocos nucifera L., XIX : 330, pl. XV.

Conidie dse Truncatella conorum-piceae (Tubeuf) Steyaert, sur cônes d'Abies excelsa DC., XIX : 296, pl. VIII.

Conidies de Truncatella Hartigii (Tubeuf) Steyaert, culture

C. B. S., sub Pestalotia Hartigii Tubeuf, originaire de E. C. Fischer, XIX : 296, pl. VIII.
Conidies de Truncatella ramulosa (V. Beyma) Steyaert, culture C. B. S. sub Pestalotia ramulosa V. Beyma, isolée d'Acacia (mollissima ?) H. Ledeboer, XIX : 296, pl. VIII.
Conidies de Truncatella truncata (Lév.) Steyaert, culture C. B. S. sub Pestalotia truncata Lév., bois de Prunus, Nattrass, XIX : 296, pl. VIII.
Contraction des racines, I : 125, fig. 12.
Copaifera Le-Testui Pellegr., XIX : 393, fig. 36.
Copaifera Mildbraedii Harms, XIX : fig. 36.
Copaifera religiosa J. Léonard, XIX : 399, fig. 37.
Copaifera religiosa J. Léonard : A, section du bois; B, section longitudinale tangentielle, XX : 29, pl. II.
Copaifera salikounda Heckel, XIX : 393, fig. 36.
Coupe longitudinale d'un point végétatif de plante xérophile cultivée dans l'eau depuis un mois, I : 84, fig. 8.
Coupe schématique dans une prairie flottante avec Equisetum limosum, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata et Carex diandra (Gheel : district campinien), XXII : 28, fig. 2.
Coupes transversales à travers de jeunes tiges (de Polygonum amphibium) : A, Accommodat xérophile ; B, Entre-nœud du même, cultivé depuis un mois dans l'eau. — Ph. Phellogène futur; E, Endoderme. — P, Péricycle; F, 1, Faisceau libérien; F, 1, 1, Faisceau libéro-ligneux; M, Moelle, I : 83, fig. 7.
Coupes transversales de feuilles (de Polygonum amphibium) : A, individu xérophile; B, individu aquatique, I : 79, fig. 3.
Coupes transversales de tiges adultes de Polygonum amphibium : A, accommodat xérophile; B, accommodat aquatique, I : 78, fig. 2.
Courbure des bourgeons, I : 121, fig. 7.
Courbure de la souche, I : 121, fig. 6; 123, fig. 10.
Courbure de la tige et localisation; J, courbure des bourgeons hivernants, I : 124, fig. 11.
Crepidotus applanatus, XV : 52, pl. IV, fig. 30.
Crepidotus mollis, XV : 52, pl. IV, fig. 31.
Crépin (François), I : 281, portrait.
Crocus, cultivés à diverses profondeurs, I : 181, fig. 2.
Crotalaria andromedifolia Wilczek, XXIII : 137, pl. II.
Crotalaria Boutiqueana Wilczek, XXIII : 131, fig. 23.
Crotalaria Duboisii Wilczek, XXIII : 201, pl. V.

Crotalaria Exelliana Wilczek, XXIII : 169, fig. 25.
Crotalaria Germainii Wilczek, XXIII : 161, fig. 24.
Crotalaria Lawalreeana Wilczek, XXIII : 163, pl. III.
Crotalaria Mullendersii Wilczek, XXIII : 197, pl. IV.
Crotalaria tamboensis Wilczek, XXIII : 205, pl. VI.
Crudia Michelsonii J. Léonard : foliole, XX : 229, fig. 22.
Cryptocarya angustifolia E. Meyer, XV, 93, pl. V; 95, pl. VI.
Cryptocarya latifolia Sond., XV : 107, pl. IX.
Cryptocarya myrtiflora Stapf, XV : 97, pl. VII.
Cryptocarya Woodii Engl., XV, 101, pl. VIII.
Ctenolophon Englerianus Mildbr., XXI : 461, pl. X.
Cyclodictyon Auberti (P. Beauv.) Broth. : A, feuille latérale; B, sommet de feuille latérale, XXI : 45, fig. 16.
Cyclodictyon bidentatum Demaret : sommets de feuilles latérales, XXII : 159, fig. 15.
Cyclodictyon borbonicum (Besch.) Broth. : A, feuilles latérales ; B, sommet de feuille latérale (type de C. purpurascens Broth.), XXI : 19, fig. 1.
Cyclodictyon brevifolium Broth. : A, feuilles latérales; B, sommet de feuille latérale, XXI : 25, fig. 4.
Cyclodictyon crassicaule Broth. : A et B, feuilles latérales; C, sommet de feuille latérale, XXI : 29, fig. 6.
Cyclodictyon delicatum P. de la V. : A et B, feuilles latérales ; C, sommet de feuille latérale, XXI : 56, fig. 21.
Cyclodictyon Dixonianum Demaret : A, feuille latérale; B, sommet de la feuille latérale, XXII : 163, fig. 16.
Cyclodictyon filicuspes P. de la V. : A et B, feuilles latérales ; C, sommet de feuille latérale, XXI : 38, fig. 12.
Cyclodictyon Hildebrandti (C. Müll.) Broth. : A et B, feuilles latérales; C, sommet de feuille latérale, XXI : 49, fig. 17.
Cyclodictyon immersum Broth. et P de la V. : A, fragment de tige; B, feuille latérale; C, sommet de feuille latérale; D, capsule, XXI : 32, fig. 8.
Cyclodictyon krebedjense Broth. : A, feuilles latérales; B, sommet de feuille latérale; C, marge vers le milieu de la feuille, XXI : 33, fig. 9.
Cyclodictyon krebedjense Broth. var. argutidens P. de la V. : A et B, feuilles latérales; C, sommet de feuille latérale, XXI : 35, fig. 10.
Cyclodictyon laetevirens (Hook. et Tayl.) Mitt. : A, feuilles latérales; B, sommet de feuille latérale, XXI : 24, fig. 3.

Cyclodictyon Lebrunii DEMARET et P. DE LA V. : A, feuille latérale; B, sommet de feuille latérale, XXI : 53, fig. 19.

Cyclodictyon perlimbatum BROTH. : A et B, feuilles latérales ; C, sommet de feuille latérale; D, marge vers le milieu de la feuille, XXI : 23, fig. 2.

Cyclodictyon Perrottetii DEMARET et P. DE LA V. : A, feuilles latérales; B, sommet de feuille latérale; C, marge vers le milieu de la feuille, XXI : 57, fig. 22.

Cyclodictyon Preussii BROTH. : A et B, feuilles latérales; C, sommet de feuille latérale, XXI : 31, fig. 7.

Cyclodictyon recognitum DEMARET et P. DE LA V. : A et B, feuilles; C, sommet de feuille latérale, XXI : 51, fig. 18.

Cyclodictyon spectabile BROTH. : A et B, feuilles latérales; C, sommet de feuille latérale, XXI : 55, fig. 20.

Cyclodictyon subbrevifolium BROTH. : A et B, feuilles latérales ; C, sommet de feuille latérale, XXI : 27, fig. 5.

Cyclodictyon subobtusifolium DIX. : A et B, feuille latérales; C, sommet de feuille latérale, XXI : 36, fig. 11.

Cyclodictyon Vallis Gratiae (HAMP.) BROTH. : A, feuilles latérales; B, sommet de feuille latérale, XXI : 39, fig. 13; 41, fig. 14.

Cyclodictyon Vallis Gratiae (HAMP.) BROTH. f. Breutelianum (HAMP.) DEMARET et P. DE LA V. : A et B, feuilles latérales; C, sommet de feuille latérale, XXI : 43, fig. 15.

Cymbopogon acutispathaceus DE WILD., VI : 6, pl. XXVII, fig. 1-12.

Cymbopogon Bequaerti DE WILD., VI : 8, pl. XXVI, fig. 10-20.

Cymbopogon kapandensis DE WILD., VI : 13, pl. XXVIII, fig. 10-22.

Cymbopogon luembensis DE WILD., VI : 14, pl. XXV, fig. 1-11.

Cymbopogon modicus DE WILD., VI : 16, pl. XXVII, fig. 13-23.

Cymbopogon pilosovaginatus DE WILD., VI : 17, pl. XXIV, fig. 12-20.

Cymbopogon scabrimarginatus DE WILD., VI : 20, pl. XXIV, fig. 1-11.

Cymbopogon subcordatifolius DE WILD., VI : 22, pl. XXVI, fig. 1-9.

Cymbopogon Vanderysti DE WILD., VI : 24, pl. XXV, fig. 12-22.

Cynometra congensis DE WILD. (foliole de), XXI : 383, fig. 102.

Cynometra Gillmanii J. LÉONARD, XXI : 389, fig. 105.

Cynometra Hankei HARMS, XXI : 393, fig. 106.

Cynometra Mannii OLIV. (foliole de), XXI : 383, fig. 102.

Cynometra megalophylla Harms (feuilles de), XXI : 383, fig. 103.
Cynometra megalophylla Harms (foliole de), XXI : 383, fig. 102.
Cynometra palustris J. Léonard, XXII : 202, fig. 22, 23.
Cynometra Schlechteri Harms, XXI : 387, fig. 104.
Cynometra Schlechteri Harms (foliole de), XXI : 383, fig. 102.
Cynometra Schlechteri Harms (feuille de), XXI : 383, fig. 103.
Cynometra sessiliflora Harms var. sessiliflora, XXI : 397, fig. 107.
Cynometra Vogelii Hook. f. (folioles de), XXI : 383, fig. 102.
Cyttaranthus congolensis J. Léonard, XXV : 287, pl. VII.

Daedalea Milliaui, VIII : 260, pl. VII, fig. 6.
Daedalea sistotremoides, VIII : 260, pl. VII, fig. 7.
Daltonia tortifolia Demaret et P. de la V., XXV : 354, pl. IX.
Daniellia thurifera J. J. Benn. var. Chevalieri J. Léonard : foliole, XIX : 407, fig. 39.
Deschampsia flexuosa, XV : 213, pl. X, 2.
Desmodium salicifolium (Poir. in Lam.) DC. var. densiflorum Schubert : fragment of fructiferous branch, XXII : 295, fig. 33.
Détail de la zonation de la végétation bryophyte pionnière. Zone inférieure (partie inférieure de la photo). Colonisation récente à Marchantia Chevalieri Steph., jeune; zone moyenne (partie supérieure de la photo) : Marchantia Chevalieri bien développé associé à Garckea phascoides (Hook.) C. Müll., XXIV : 112. fig. 4.
De Wildeman (Emile), (1866-1947), XIX : Photo.
Diclea reflexa Hook. f., graines : A, vue de profil; B, vue du point d'attache, XVIII : 79, fig. 2.
Dicranopteris linearis (Burm.) Underw. (limite inférieure du groupement à), XXIV : 113, fig. 2.
Dicranum Bonjeani De Not. : A, base de la feuille; B, cellules de la partie inférieure avec oreillettes; C, coupes transversales de la feuille; D, cellules de la partie supérieure de la lame. — D. Bonjeani var. polycladum Br. et Schpr : E, feuille d'une tige normale; F, un morceau de rejet, XIX : 107, fig. 8.
Dicranum flagellare Hedw. : A, feuilles; B, cellules de la partie supérieure de la feuille; C, cellules de la partie inférieure; D, morceau de rejet; F, cellules des feuilles de rejet, XIX : 163, fig. 14.
Dicranum fuscescens Turn. : A, feuilles; B, base de la feuille ; C, cellules de la partie inférieure de la feuille avec oreillettes; D, cellules de la partie supérieure de la feuille; E, coupes transversales de la feuille, XIX : 165, fig. 15.

Dicranum fuscescens f. falcifolium (Braithw.) Moenkem. : A,feuilles; B, coupes transversales de la feuille; C, cellules de la partie supérieure de la lame, XIX : 169, fig. 17.

Dicranum majus Turn. : A, base de la feuille avec oreillettes et cellules marginales; B, base de la feuille; C, cellules de la partie supérieure de la feuille; D, cellules du milieu de la lame; E, coupes transversales : *a)* vers le milieu de la feuille; *b)* vers la base de la feuille; F, base de la feuille avec oreillettes supra-auriculaires et cellules marginales, XIX : 139, fig. 11.

Dicranum montanum var. pulvinatum Pfeff. : A, feuilles de la tige normale; B, base de la feuille normale avec protonema; C, protonema; D, base de la feuille normale avec oreillettes et cellules marginales; E, partie supérieure de la feuille avec cellules marginales supérieures; F, morceau de rejet et ses feuilles; G, partie inférieure d'une feuille de rejet, XIX : 159, fig. 13.

Dicranum Mühlenbeckii Br. et Schpr : A, feuilles; B, base de la feuille; C, cellules de la partie supérieure de la lame; D, cellules de la partie inférieure avec supra-auriculaires; E, coupes transversales de la feuille, XIX : 167, fig. 16.

Dicranum scoparium var. alpestre Hüb. emend. Wilcz. : A, feuilles; B, cellules de la partie supérieure de la lame. — D. scoparium Hedw. : C, feuille; D, cellules de la partie supérieure de la lame; F, coupe transversale de la feuille, XIX : 117, fig. 9.

Dicranum scoparium var. recurvatum (Schultz) Brid. emend. Wilcz. : A, feuille; B, cellules de la partie supérieure de la lame; C, base de la feuille avec oreillettes et cellules marginales; D, cellules du milieu de la lame; F, cellules de la partie supérieure; G, base de la feuille, avec oreillettes et cellules marginales, XIX : 129, fig. 10.

Dicranum strictum Schleich. : A, feuille; B, base de la feuille avec oreillettes; C, cellules de la partie supérieure de la feuille; D, propagule des rhizoïdes; E, morceau de la feuille avec protonéma, XIX : 143, fig. 12.

Dicranum undulatum Br. et Schpr : A, feuilles; B, sommet de la feuille, vue latérale; C, coupes transversales de la feuille; D, cellules du sommet de la feuille; E, cellules de la base de la feuille, XIX : 101, fig. 7.

Didelotia unifoliolata J. Léonard, XXII : 207, fig. 24.

Didelotia unifoliolata J. Léonard : A, fleur épanouie; B, fleur, coupe longitudinale; C, gousse jeune, XXII : 209, fig. 25.

Digitaria Bredoensis Robyns et Van der Veken : A, épillet vu de la face abaxiale, montrant la glumelle stérile; B, épillet vu de la face adaxiale, montrant la glume supérieure; C, glumelle fertile inférieure, vue de dos; D, extrémité d'un poil de l'épillet, XXII : 147, fig. 12.

Digitaria hyalina Robyns et Van der Veken : A, épillet de la face abaxiale, montrant la glume inférieure et la glumelle stérile ; B, épillet vu de la face adaxiale, montrant la glume supérieure; C, glumelle fertile inférieure, vue de dos; D, extrémité d'un poil de l'épillet, XXII : 151, fig. 13.

Digitaria hydrophila Van der Veken, XXV : 329, fig. 56.

Digitaria polybotryoides Robyns et Van der Veken : A, épillet vu de la face abaxiale, montrant la glumelle stérile; B, épillet vu de la face adaxiale, montrant la glume supérieure; C, glumelle fertile inférieure, vue de dos; D, extrémité d'un poil de l'épillet, XXII : 153, fig. 14.

Digitaria Schmitzii Van der Veken, XXV : 327, fig. 55.

Digitaria subsulcata Robyns et Van der Veken : A, épillet vu de la face abaxiale, montrant la glumelle stérile; B, épillet vu de la face adaxiale montrant la glume supérieure; C, glumelle fertile inférieure, vue de dos; D, extrémité d'un poil de l'épillet, XXII : 145, fig. 11.

Dispersion de quelques Senecio en Belgique, XIV : 82, pl. I.

Disposition des feuilles, I : 362-363, schémas 1-15.

Distichophyllidium africanum Demaret et P. de la V., XXV : 365, pl. X.

Distinction between Pentanisia prunelloides and Pentanisia Schweinfurthii, XXII : 253, fig. 30.

Distribution de Cassia Kirkii Oliv. var. guineensis Steyaert et var. glabra Steyaert sur le continent africain, XX : 259, fig. 24.

Distribution de Cassia mimosoides L. sur le continent africain, XX : 249, fig. 23.

Distribution de Chevalierella Dewildemanii (Vanderyst) Van der Veken, XXIV : 403, fig. 34.

Distribution des Alchemilla en Abyssinie, XIV : 7, fig. 1.

Distribution du genre Arctium en Belgique, en Hollande et en Corse : 1, subsp. majus; 2, subsp. eu-minus; 3, subsp. pubens; 4, subsp. nemorosum; 5, A. tomentosum; 6, A. nothum; 7, A. mixtum; 8, × A. Debrayi; 9, × A. ambiguum; 10, subsp. mediterraneum; 11, subsp. corsicum; 12, subsp. Aellenianum; 13, limite occidentale des pointages connus d'A. tomentosum en Belgique

et en Hollande; 14, limite orientale des pointages connus de la sous-espèce pubens en Belgique et en Hollande, XX : 131, fig. 13.

Distribution du genre Arctium dans le bassin méditerranéen et les contrées limitrophes : 1, subsp. majus ; 2, subsp. platylepis ; 3, subsp. eu-minus; 4, subsp. pubens; 5, subsp. mediterraneum var. eumediterraneum ; 6, subsp. mediterraneum var. libanum; 7, subsp. atlanticum (en hachures, les 3 zones disjointes de l'aire); 8, subsp. nemerosum var. eunemorosum; 9, subsp. nemorosum var. orientale; 10, subsp. alpestre; 11, subsp. Tchihatchefii; 12, A. tomentosum; 13, subsp. Chaberti; 14, subsp. balearicum; 15, subsp. corsicum; 16, subsp. Aellenianum, XX : 135, fig. 14.

Distribution en Belgique de Centaurium minus Gars., XXIV : 363, fig. 25.

Distribution en Belgique de Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, XXIV : 377, fig. 29.

Distribution en Belgique de Centaurium pulchellum (Sw.) Druce var. intermedium (Mérat) Gilmour, XXIV : 385, fig. 30.

Distribution en Belgique de Centaurium pulchellum (Sw.) Druce var. intermedium (Mérat) Gilmour f. palustre (Van Hall) A. Robyns, XXIV : 385, fig. 30.

Distribution en Belgique de Centaurium vulgare Rafn, XXIV : 373, fig. 28.

Distribution en Belgique de Euphrasia montana, XXIV : 231, fig. 21.

Distribution en Belgique de Galeopsis bifida, XXIV : 231, fig. 21.

Distribution en Belgique de Juncus Kochii, XXIV : 231, fig. 21.

Distribution géographique des Alchemilla malgaches, XIV : 35, fig. 9.

Distribution of the Pentanisia ssp. of the South African complex, XXII : 241, fig. 28.

Distribution of the species of Otomeria and Batopedina, XXIII : 9, fig. 2.

Distribution of the species of Pentanisia, XXII : 239, fig. 27.

Distribution of the species of Pentas, XXIII : 241, fig. 26; 243, fig. 27; 245, fig. 28; 247, fig. 29.

Distribution of the species of Virectaria, XXIII : 37, fig. 4.

Dolichos subcapitatus Wilczek, XXIV : 433, pl. XIII.

Dombeya Mastersi. — Jeunes limbes pendants et protégés sous les limbes âgés, I : 216, fig. 4.

Dorstenia yangambensis J. Léonard : rameau feuillé et réceptacle, XIX : 228, fig. 23.
Durand, (Théophile), IV : I, portrait.
Elaeis guineensis Jacq. (folioles non épanouies de la flèche de), XIX : 177, pl. IV.
Entandrophragma palustre Staner : Fruits, XVI : 237, pl. XIII.
Épidermes inférieurs : A, plante aquatique; B, plante d'un rameau dressé hors de l'eau, de la plante aquatique; C, plante terrestre; D, plante xérophile; E, première feuille de la plante xérophile cultivée dans l'eau, I : 81, fig. 5.
Épidermes supérieurs : A, accommodat aquatique, B, feuille d'un rameau dressé hors de l'eau, de l'accommodat aquatique; C, accommodat terrestre; D, accommodat xérophile; E, première feuille de l'accommodat xérophile qui a été cultivé dans l'eau, I : 80, fig. 4.
Epiphytes in mountain forest, First Twin Crater, Hawaii National Park. Astelia veratroides is the long slender leaved plant most conspicuous, XV : 265, fig. 23.
Equisetum limosum (coupe schématique dans une prairie flottante avec), XXII : 28, fig. 2.
Eragrostis articulata De Wild., VI : 58, pl. II.
Eragrostis Bequaerti De Wild., VI : 59, pl. VI.
Eragrostis densa De Wild., VI : 61, pl. III.
Eragrostis elongato-compressa De Wild., VI : 62, pl. I.
Eragrostis Flamignii De Wild., VI : 63, pl. I.
Eragrostis Hocki De Wild., VI : 64, pl. IV.
Eragrostis Homblei De Wild., VI : 66, pl. III.
Eragrostis longepaniculata De Wild., VI : 67, pl. II.
Eragrostis manikensis De Wild., VI : 68, pl. V.
Eragrostis purpureopedicellata De Wild., VI : 70, pl. VI.
Eragrostis Vanderysti De Wild., VI : 71, pl. IV.
Ericetum, XXII : 17, fig. 1.
Eriosemopsis subanisophylla Robyns, XI : 39, fig. 9; 40, fig. 10.
Erodium (Filamenten van fertiele meeldraden van enige soorten van), XVIII : 245, fig. 37.
Erythrina abyssinica Lam., XIII : 307, fig. 7.
Erythrina Droogmansiana De Wild., XIII : 304, fig. 6; XV : 218, fig. 8.
Erythrina Droogmansiana De Wild. (fleur de), XV : 218, fig. 8.
Erythrina excelsa Baker, XIII : 318, fig. 8.
Erythrina orophila Ghesq., XV : 218, fig. 8; 219, fig. 9.

Erythrina suberifera Welw., XIII : 313, pl. III.
Erythrina Tholloniana Hua, XIII : 302, fig. 5.
Espèces congolaises d'après les districts phytogéographiques (répartition des), XVI : 110-111.
Etiquette de Roxburgh, XVII : 248, fig. 19.
Eulophia angustilabellata De Wild., VI : 109, pl. XXIII, fig. 7-12.
Eulophia Debeersti De Wild., VI : 111, pl. XVII, fig. 1-10.
Eulophia elamellata De Wild., VI : 112, pl. XVIII, fig. 7-11.
Eulophia euglossa Reichb. f. ex Bat., VI : 113, pl. XX, fig. 1-9.
Eulophia graciliscapa Schlechter, VI : 115, pl. XVIII, fig. 1-6.
Eulophia gumbariensis De Wild., VI : 117, pl. XXII, fig. 7-12.
Eulophia Hocki De Wild., VI : 120, tab. XXII, fig. 1-6.
Eulophia katangensis De Wild., VI : 121, pl. XVI, fig. 8-12.
Eulophia kisanfuensis De Wild., VI : 93, pl. XVII, fig. 11-15.
Eulophia papillosa (Rolfe) Schlechter, VI : 124, pl. XIX, fig. 1-7.
Eulophia paucisquamata De Wild., VI : 125, pl. XXIII, fig. 1-6.
Eulophia sankisiensis De Wild., VI : 126, tab. XXI, fig. 4-7.
Eulophia trilamellata De Wild., VI : 127, pl. XXI, fig. 1-3.
Euphrasia montana (distribution en Belgique de), XXIV : 231, fig. 21.
Exellia scamnopetala (Exell) Boutique : A, rameau florifère ; B, fleur, un pétale externe enlevé; C, fleur, coupe longitudinale; D, étamine, face interne; E, étamine, face externe; F, carpelle, coupe longitudinale; G, fruit avec coupe longitudinale d'un méricarpe; H, graine, XXI : 119, pl. III.
Exomiocarpon madagascariense (Humbert) Lawalrée : A, capitule; B, corolle; C, étamine vue de face; D, style; E, akène, XVII : 62, fig. 14.

Fadogia monticola Robyns, XI : 71, fig. 11; 72, fig. 12.
Fadogiella manikensis (De Wild.) Robyns, XI : 98, fig. 13; 99, fig. 14.
Falaises de Yaselia exceptionnellement exondées jusqu'à la base, en saison des basses eaux. Zonation caractéristique de la végétation pionnière, XXIV : 114, fig. 3.
Favolus Vanderystii, VIII : 260, pl. VII, fig. 3.
Feuilles de Alchemilla Rutenbergii O. Hoffm., XIV : 43, fig. 12.
Feuilles (coupes transversales de), I : 79, fig. 3.
Feuilles de Cynometra megalophylla Harms, XXI : 383, fig. 103.
Feuille de Cynometra Schlechteri Harms, XXI : 383, fig. 105.
Feuilles de Hesperhodos, XIV : 231, fig. 20.

Ficus Jansii Boutique : A, rameau feuillé et réceptacles; B, réceptacle, XIX : 211, fig. 21.

Ficus Louisii Boutique et J. Léonard : A, rameau feuillé et réceptacles; B, réceptacle. — Ficus Michelsonii Boutique et J. Léonard : C, rameau feuillé et réceptacle; D, réceptacle, XIX : 217, fig. 22.

Filamenten van fertiele meeldraden van enige soorten van Erodium : A, E. moschatum; B, E. cicutarium subsp. arvale; C, E. cicutarium subsp. dunense ; D, E. glutinosum ; E, E. « dentatum », XVIII : 245, fig. 37.

Fissidens Gomae P. de la V. et Leroy : A, plante stérile; B, plante fructifiée; C, feuille; D, sommet d'une feuille, XVIII : 157, fig. 10.

Flabellariopsis acuminata (Engl.) R. Wilczek, XXV : 304, pl. VIII.

Fleur de Erythrina Droogmansiana De Wild. Fleur de Erythrina orophila Ghesq., XV : 218, fig. 8.

Floor of Keanakakoi Crater in Hawaii National Park, showing pioneer vegetation on the 1877 flow, consisting largely of Metrosideros collina var. polymorpha, Sadleria cyatheoides, Polypodium pellucidum, Dodonaea viscosa and Silene struthioloides. Elevation 3450 feet, XV : 280, fig. 36.

Foliole de Cynometra congensis De Wild., XXI : 383, fig. 102.

Foliole de Cynometra Mannii Oliv., XXI : 383, fig. 102.

Foliole de Cynometra megalophylla Harms, XXI : 383, fig. 102.

Foliole de Cynometra Schlechteri Harms, XXI : 383, fig. 102.

Folioles de Cynometra Vogelii Hook. f., XXI : 383, fig. 102.

Folioles non épanouies de la flèche de Elaeis guineensis Jacq. portant les macules à zonations concentriques de Pestalotia maculiformans Guba et Zeller, XIX : 177, pl. IV.

Fomes wombaliensis, VIII : 260, pl. VII, fig. 2.

Frullania angulata Mitt. : A, feuille; B, amphigastre; C, bractées involucrales internes; D, bractées involucrales internes; E, bractées involucrales internes, XX : 7, fig. 3.

Frullania Arecae (Spreng.) Gottsche : A, B, C, différentes formes de lobules; F, Ecklonii (Spreng.) Gottsche et Lindenb. : D, lobule, XIX : 81, fig. 5.

Frullania Borgeni Pears. : feuille raméale, XVIII : 123, fig. 7.

Frullania bursicula Steph. : A, lobule; B et C, bractées involucrales internes; D, périanthe; E, coupe transversale dans le périanthe, XVIII : 233, fig. 34.

Frullania capensis Gottsche : A, plante ♀ ; B, plante ♂ ; C, amphigastres et lobules; D, plante stérile, XVIII : 119, fig. 5.
Frullania capensis Gottsche : A, lobe d'une feuille raméale; B, cellules centrales du lobe d'une feuille raméale; C, amphigastre ; D, paire de bractées involucrales et bractéoles internes; E, feuilles involucrales du second rang; F, coupe dans le périanthe, XVIII : 121, fig. 6.
Frullania Cardoti Steph. : A, amphigastres; B, lobule, XVIII : 234, fig. 35.
Frullania longistipula Steph. : A, feuilles; B, amphigastre; C, bractées involucrales internes, XX : 5, fig. 2.
Frullania sphaeroflora Steph. : A, feuille; B, amphigastre; C, bractées involucrales internes, XX : 3, fig. 1.
Futaie de Hêtre envahie par Molinia, XV : 213, pl. X, 3.

Galeopsis bifida (distribution en Belgique de), XXIV : 231, fig. 21.
Galinsoga parviflora, XIV : 323, fig. 24.
Galinsoga quadriradiata, XIV : 325, fig. 25.
Garcinia polyantha Oliv. Pétiole vu de face et de profil, XIII : 125, fig. 1.
Gasteria carinata, I : 362-363, schéma 3, II.
Gasteria excavata, I : 362-363, schéma 8.
Gasteria Lingua, I : 362-363, schéma 8.
Genyorchis elongata Robyns et Tournay, XXV : 257, fig. 46.
Gilletiodendron glandulosum (Port.) J. Léonard, XXI : 403, fig. 108.
Gilletiodendron kisantuense (Verm. apud De Wild.) J. Léonard, XXI : 407, fig. 109.
Gilbertiodendron ogooense (Pellegr.) J. Léonard, XXII : 189, fig. 21.
Gnidia Buchananii Gilg., XIII : 349, fig. 11.
Gnidia chrysantha (Solms-Laub.) Gilg var. ignea H. H. W. Pears., XIII : 365, fig. 20.
Gnidia Claessensii Staner, XIII : 356, fig. 15.
Gnidia glauca (Fres.) Gilg., XIII : 359, fig. 18.
Gnidia Goetzeana Gilg., XIII : 351, fig. 12.
Gnidia Hockii De Wild., XIII : 345, fig. 9.
Gnidia kasaiensis S. Moore : fleur, face interne, XIII : 353, fig. 13.
Gnidia Kraussiana Meissn., XIII : 361, fig. 19.
Gnidia Meyeri-Johannis Gilg, XIII : 346, fig. 10.
Gnidia mollis Wright, XIII : 354, fig. 14.

Gnidia Oliveriana (Vatke) Engl. et Gilg, XIII : 357, fig. 16.
Gnidia Poggei Gilg, XIII : 366, fig. 21.
Gnidia urundiensis Gilg, XIII : 358, fig. 17.
Gossypium obtusifolium Roxb., XVII : 249, pl. III.
Gouania longipetala Hemsl. : rameau feuillu, XV : 419, fig. 58.
Gouania longipetala Hemsl. : fleur, fruit, XV : 420, fig. 59.
Gouania longispicata Engl. : rameau feuillu; fleur, XV : 422, fig. 60.
Gousse et graine de Erythrina orophila Ghesq., XV : 219, fig. 9.
Graines de Canavalia congolais vues de profil : A, C. ensiformis (L.) DC.; C. gladiata (Jacq.) DC.; C, C. maritima (Aubl.) Thou., XVIII : 73, fig. 1.
Grimmia perichetialis P. de la V. var. pilifera Demaret, XXIV : 455, fig. 36.
Guarea cedrata Pellegrin : rameau feuillu fructifère, XVI : 189, pl. IX.
Guarea cedrata Pellegrin : A, base du pétiole; Guarea Laurentii De Wild.: B, base du pétiole; Guarea Thompsonii Spr. et Hutch.; C, base du périole, XVI : 193, pl. X.
Guarea cedrata Pellegrin : A, tube staminal et gynécée; Guarea Laurentii De Wild.; B, tube staminal et gynécée; Guarea Thompsonii Spr. et Hutch.; C, tube staminal et gynécée; Guarea glomerulata Harms; D, tube staminal et gynécée, XVI : 197, pl. XI.
Guarea Laurentii De Wild. : fruit, XVI : 194, fig. 11.
Guibourtia Arnoldiana (De Wild. et Th. Dur.) J. Léonard : A, section transversale du bois; B, section longitudinale tangentielle, XX : 23, pl. I.
Guibourtia Demeusei (Harms) J. Léonard : A, très jeune inflorescence strobiliforme; B, C, D, très jeunes inflorescences comprimées de Copaifera salikounda Heckel; Copaifera Mildbraedii Harms et Copaifera Le-Testui Pellegr., XIX : 393, fig. 36.
Guibourtia liberiensis J. Léonard, XX : 277, fig. 28.
Guibourtia Pellegriniana J. Léonard : A, foliole; B, ramille avec rhytidome se desquamant; C, portion du rachis de l'inflorescence; D, fruit, XIX : 405, fig. 38.
Guibourtia Sousae J. Léonard : A, foliole. — Guibourtia Carrissoana (M. A. Exell) J. Léonard var. Gossweileri (M. A. Exell) J. Léonard : B, foliole. — Guibourtia leonensis J. Léonard : foliole; D, fruit. — Guibourtia liberiensis J. Léonard : E. foliole. XX : 271, fig. 27.

Gyrodon kivuensis Heinem. et Goos., XXV : 170, fig. 40.
Gyrodon lignicola (Kallenbach) Heinemann : A_1 et A_2, spores de deux carpophores différents; B, basides; C_1 et C_2, poils d'arête de deux carpophores différents, XXI : 239, fig. 53.
Gyroporus castaneus (Fries) Quélet var. congolensis Heinemann : A, cellules du revêtement piléique; B, basides; C, spores, XXI : 231, fig. 49.
Gyroporus castaneus (Fries) Quélet var. microsporus Heinemann : A, spores; B, basides; C, cellules du revêtement du chapeau; D, cellules du revêtement du stipe, XXI : 233, fig. 50.
Gyroporus heterosporus Heinemann : A, cellules du revêtement piléique; B, spores; C, basides; D, cellules du revêtement du stipe, XXI : 229, fig. 48.
Gyroporus luteopurpureus (Beeli) Heinemann : spores, XXI : 237. fig. 52.
Gyroporus reticulatus Heinemann : A, spores, XXI : 235, fig. 51.

Halimione pedunculata (L.) Aellen, XXIII : 109, fig. 22.
Halimione portulacoides (L.) Aellen, XXIII : 98, fig. 16.
Haworthia margaritifera, I : 362-363, schéma 3, III.
Haworthia Reinwardti, I : 362-363, schéma 3, V.
Haworthia rigida, I : 362-363, schéma 9.
Haydonia triphylla Wilczek, XXIV : 408, pl. XII.
Heckeldora Staudtii (Harms) Staner : fruit, XVI : 208, fig. 13.
Helichrysum fulgens Humbert et Staner. — Senecio kanzibiensis Humbert et Staner, XIV : 109, pl. V.
Helinus mystacinus E. Mey. : fleur; fruit, XV : 417, fig. 57.
Helinus scandens (Eckl. et Zeyh.) Radlk. : fleur ; fruit, XV : 416, fig. 56.
Hendrickxia alcicornis Duvign. : 1, aspect du thalle; 2, coupe transversale du thalle, avec un pycnide; 3, fulcres et pycnoconidies; 4, spectre microchimique acétone I GE; A, acide usninique; B, atranorine; C, D et E, substances indéterminées, XVI : 363, fig. 24.
Hendrickxia pseudoreticulata Duvign. : 1, aspect du thalle; 2, coupe du thalle : A, transversale; B, longitudinale; 3, anatomie comparée de Cetraria et Hendrickxia. Coupes transversale du thalle : A, de Cetraria nivalis (L.) Ach.; B, de Cetraria cucullata (Bell.) Ach.; C, de Hendrickxia pseudoreticulata Duvign. En A et B, zone gonidiale mal délimitée, pas d'axe cartilagineux, XVI, 360, fig. 23.

Hesperhodos (feuilles de), XIV : 231, fig. 20.
Hesperhodos Vernoni (Greene) Bouleng., XIV : 239, fig. 21.
Hêtre (lisière dégradée d'une futaie de), XV : 213, pl. X, fig. 5 et 6. ...
Hirtella bangweolensis (R. E. Fries) Greenw. : A, coupe transversale du stigmate, XXI : 171, fig. 43.
Hoffmanniella silvatica Schlecht. : A, capitule; B, corolle; C, étamine vue de face; D, style; E, akène, XVII : 60, fig. 13.
Hunteria densiflora M. Pichon, XXIII : 393, fig. 38.
Hutchinsonia barbata Robyns, XI : 26, fig. 5; 27, fig. 6.
Hymenostegia laxiflora (Benth.) Harms, XXI : 439, fig. 116.
Hypholoma murinacea, XV : 50, pl. III, fig. 28.

Inflorescence de l'Acalypha Bequaerti Staner, XV : 142, fig. 2.
Inflorescences légèrement schématisées de diverses Rubiacées-Vanguériées (types d'), XI : 8, fig. 1.
Island of Hawaii. Temperature and rainfall map, based on Weather Bureau maps, XV : 247, fig. 10.
Island of Hawaii. Selected districts. Comparative monthly distribution of precipitation, XV : 248, fig. 11.
Island of Hawaii. Selected stations. Mean temperatures, XV : 249, fig. 12.
Island of Hawaii. The plant formations; relative boundaries, XV : 255, fig. 13.
Isoberlinia angolensis (Welw. ex Benth.) Hoyle et Brenan, XX : 297, fig. 29.

Jeunes tiges (coupes transversales à travers de), I : 83, fig. 7.
Julbernardia microphylla Troupin : A, bouton floral avec bractée et bractéoles; B, sépale antérieur, face externe; B', sépales postérieurs soudés, face externe; C, pétale, face interne; D, filets des étamines; E, anthère; ovaire, coupe longitudinale; G, foliole, face inférieure; H, gousse, XX : 317, fig. 30.
Julbernardia paniculata (Benth.) Troupin, XX : 297, fig. 29.
Juncus Kochii (distribution en Belgique de), XXIV : 231, fig. 21.
Juniperus procera Hochst. au Congo belge (répartition géographique), XVIII : 127, fig. 8.

Kalanchoë Figuereidoi Croiz., XIV : 364, fig. 26; 365, pl. IX.
Kalanchoë rhombopilosa Mannoni et Boiteau, XXIV : 330, fig. 23.
Kalanchoë rhombopilosa Mannoni et Boiteau, XXIV : 331, fig. 24.

Kalanchoë Robynsiana Raymond-Hamet : A, calice; B, corolle étalée montrant l'insertion des étamines; C, carpelles et glandes ; graine, XIX : 439, fig. 40.
Kaoue Germainii Wilczek, XXI : 354, pl. VII.
Krombholzia excedens Heinemann et Goossens, XXI : 329, fig. 93.
Krombholzia porphyreus Heinemann, XXI : 331, fig. 94.

Lactarius acutus Heim, XXV : 73, fig. 27; 74, fig. 28.
Lactarius angustus Heim et Goossens, XXV : 48, pl. III.
Lactarius angustus Heim et Goossens, XXV : 68, fig. 25.
Lactarius caperatus Heim et Goossens, XXV : 37, fig. 10-11; 48, pl. III.
Lactarius chamaeleontinus Heim, XXV : 88, pl. VI.
Lactarius cinnamomeus Goossens et Heim, XXV : 32, pl. II; 33, fig. 8; 34, fig. 9.
Lactarius Corbula Heim et Goossens, XXV : 65, fig. 23; 66, fig. 24; 88, pl. VI.
Lactarius craterelloides Heim et Goossens, XXV : 53, fig. 18; 80, pl. V.
Lactarius fulgens Heim var. africanus Heim, XXV : 71, fig. 26.
Lactarius gymnocarpus Heim, XXV : 25, fig. 5; 26, fig. 6, 28, fig. 7; 32, pl. II.
Lactarius hispidulus Heim, XXV : 76, fig. 29; 88, pl. VI.
Lactarius inversus Goossens et Heim, XXV : 48, pl. III; 79, fig. 31; 81, fig. 33.
Lactarius latifolius Goossens et Heim, XXV : 64, pl. IV; 83, 84, fig. 34, 35.
Lactarius melanodermus Heim et Goossens, XXV : 50, fig. 16; 51, fig. 17; 80, pl. V.
Lactarius melanogalus Heim, XXV : 47, fig. 15; 80, pl. V.
Lactarius nudus Heim, XXV : 55, fig. 19; 80, pl. V.
Lactarius Pandani Heim, XXV : 16, pl. I; 21, fig. 3; 22, fig. 4.
Lactarius Pandani Heim f. aurantiacus, XXV : 16, pl. I; 19, fig. 2; 21, fig. 3.
Lactarius Pandani Heim f. intermedius, XXV : 16, pl. I.
Lactarius Pandani Heim f. pallidus, XXV : 16, pl. I; 21, fig. 3.
Lactarius pellicularis Heim, XXV : 86, fig. 36; 88, pl. VI.
Lactarius pellucidus Goossens et Heim, XXV : 62, fig. 22; 88, pl. VI.
Lactarius phlebonemus Heim et Goossens, XXV : 39, fig. 12.

Lactarius phlebonemus Heim et Goossens f. brunneus, XXV : 39, fig. 12; 41, fig. 13; 48, pl. III; 64, pl. IV.
Lactarius phlebonemus Heim et Goossens f. ocraceus, XXV : 39, fig. 12; 41, fig. 13; 43, fig. 14; 64, pl. IV.
Lactarius pseudolignyotus Heim, XXV : 57, fig. 20; 58, fig. 21; 80, pl. V.
Lactarius unicolor Goos. et Heim, XXV : 48, pl. III : 77, fig. 30.
Lactuca leptocephala Stebbins, L. kenyaensis Stebbins, XIV : 224, fig. 19.
Lactuca stipulata Stebbins. — Lactuca attenuata Stebbins. — Lactuta semibarbata Stebbins, XIV : 347, pl. VIII.
Lagynias discolor E. Mey., XI : 314 et 315, fig. 29 et 30.
Lasiodiscus fasciculiflorus Engl. : fleur, XV : 411, fig. 53.
Lasiodiscus Gillardini Staner : rameau feuillu, XV : 409, fig. 51.
Lasiodiscus Gillardini Staner : fleur, XV : 410, fig. 52.
Lasiodiscus Mannii Hook. f. : fleur, XV : 414, fig. 55.
Lasiodiscus Mildbraedii Engl. : fleur, XV : 412, fig. 54.
Lebrunia bushaie Staner, XIII : 107, pl. I.
Lebruniodendron leptanthum (Harms) J. Léonard, XXI : 423, pl. VIII.
Leea lucida. — Stipules soudées au pétiole, I : 216, fig. 1.
Lepidobotrys Staudtii Engl. : A, jeune ramille avec 2 stipules, pétiole articulé, 1 stipelle, pétiolule articulé et base du limbe; B, stipelle, face dorsale; C, fleur, coupe longitudinale; D, fleur femelle, coupe longitudinale; E, capsule déhiscente; F, graine, avec coupe longitudinale de la gibbosité placentaire de la cloison et du péricarpe, XX : 35, fig. 6.
Lepiota Brebissonii, XV : 47, pl. I, fig. 4.
Lepiota cepaestipes, XV : 47, pl. I, fig. 3.
Lepiota flavescens, XV : 47, pl. I, fig. 2.
Lepiota minutissima, XV : 47, pl. I, fig. 5.
Lepiota rhacodes, XV : 47, pl. I, fig. 1.
Leplaea mayombensis var. coalescens (Verm.) Pellegrin. Rameau feuillu et rameau fructifère, XVI : 204, pl. XII.
Leplaea mayombensis var. coalescens (Verm.) Pellegrin : tube staminal et gynécée, XVI : 205, fig. 12.
Leptolejeunea astroidea (Mitten) Steph., XXIII : 67, fig. 7.
Leptolejeunea papuliflora Steph., XXIII : 71, fig. 8.
Leptolejeunea Quintasii Steph., XXIII : 71, fig. 8.
Leptolejeunea truncatiloba Steph., XXIII : 66, fig. 6.
Leptoterantha mayumbensis (Exell) Troupin : A, port de la

plante; B, fleur; C, fleur, coupe longitudinale; D, pétale extérieur; E, pétale intérieur; F, fleur, gynécée et staminodes; G, carpelle, coupe longitudinale; H, endocarpe du fruit, face dorsale; I, endocarpe du fruit, face ventrale avec condyle; J, endocarpe du fruit, vu de profil, XIX : 421, pl. XIX.

Levierella perserrata P. DE LA V. et LEROY : A, feuille; B, cellules supérieures; C, cellules basilaires; D, opercule; E, péristome, XVIII : 192, fig. 19.

Limite inférieure du groupement à Dicranopteris linearis (BURM.) UNDERW. sur les falaises de Yaselia, XXIV : 113, fig. 2.

Limonium, XXIII : 103, fig. 17, 18; 109, fig. 21.

Lisière dégradée d'une futaie de Hêtre, XV : 213, pl. X, fig. 5 et 6.

Lissochilus Corbisieri DE WILD., VI : pl. XV, fig. 5-9.

Lissochilus Descampsii DE WILD., VI : pl. XVI, fig. 1-7.

Lissochilus faradjensis DE WILD., VI : pl. XII, fig. 1-7.

Lissochilus giganteus WELW., VI : pl. VII, VIII et IX.

Lissochilus Homblei DE WILD., VI : pl. XIII, fig. 6-13.

Lissochilus kapandensis DE WILD., VI : pl. XIII, fig. 1-5.

Lissochilus katentaniensis DE WILD., VI : pl. XIV, fig. 6-12.

Lissochilus Laurenti DE WILD., VI : pl. XIV, fig. 1-5.

Lissochilus roseus LINDL., VI : pl. X et XI.

Lissochilus Sapini DE WILD., VI : pl. XV, fig. 1-4.

Lissochilus Schweinfurthii REICHB. f., VI : pl. IX.

Lissochilus seleensis DE WILD., VI : pl. IX, fig. 10-14.

Lissochilus subintegrus DE WILD., VI : pl. IX, fig. 6-7.

Lissochilus vermiculatus DE WILD., VI : pl. XII, fig. 8-11.

Localisation des bourgeons, I : 119, fig. 3, 4; 120, fig. 5; 123, fig. 9.

Loesenera Walkeri (A. CHEV.) J. LÉONARD. Photo, XXI : 435, fig. 115.

Lopholejeunea angustiflora STEPH. : A, feuilles et amphigastres; B et C, bractéole et bractée involucrales; L. utriculata STEPH.; D, inflorescence femelle; L. abortiva (MITT.) STEPH. : E, rameau avec inflorescence femelle; F, rameau avec inflorescence femelle; G et H, bractéole et bractée involucrales; I, périanthe, XX : 165, fig. 16.

Lopholejeunea fragilis STEPH. : A, rameau avec inflorescence femelle; B et C, bractées involucrales; D, bractéole involucrale : L. Jonesii VANDEN BERGHEN : E, rameau avec inflorescence femelle et épi mâle; F et G, bractéole et bractée involucrales, XX : 177, fig. 20.

Lopholejeunea grandicrista Steph. : A, rameau avec inflorescence femelle; B et C, bractées involucrales; D, bractéole involucrale; E, périanthe; L. subfusca (Nees) Steph. : F, rameau avec inflorescence femelle; G et H, bractéole et bractée involucrales, XX : 171,, fig. 18.
Lopholejeunea obtusilacera Herz. : A, rameau avec inflorescence femelle; B, feuille caulinaire; C, cellule médiane; D et D', lobules foliaires; E, amphigastre caulinaire; F, bractées involucrales ; G, bractéole involucrale; H, périanthe, XX : 173, fig. 19.
Lopholejeunea utriculata Steph. : A, rameau avec amphigastre et deux feuilles dont l'une est dilatée en un utricule; B, bractée et bractéole involucrales, XX : 167, fig. 17.
Loudetia coarctata (A. Camus) C. E. Hubbard, XXV : 227, fig. 45.
Loudetia Tisserantii C. E. Hubbard, XXV : 227, fig. 45.

Macrolobium Lebrunii J. Léonard, XXII : 187, fig. 20.
Maesobotrya cordulata J. Léonard : A, feuilles (face sup. et inf.); B, stipule; C, inflorescence ♀ ; D, fleur ♀ articulée sur le rachis, XVII : 261, fig. 22.
Maesopsis Eminii : feuille; glande de la feuille, XV : 401, fig. 47.
Malouetia Heudelotii A. DC. : A, corolle en section longitudinale. — M. Bequaertiana Woodson : B, corolle en section longitudinale. — M. brachyloba M. Pichon : C, rameau fleuri; D, corolle en section longitudinale; E, gynécée; F, anthère de face; G, la même, de dos; H, la même, de profil. — Maloutiella parviflora M. Pichon : I, rameau fleuri; J, calice en section longitudinale; K, corolle en section longitudinale; L, anthère de face; M, la même chose, de dos; N, gynécée et anthère de profil, en place; O, ovaire en coupe longitudinale, montrant un placenta, XXII : 123, pl. I.
Malouetiinae d'Afrique (répartition des), XXII : 127, fig. 9.
Marasmius equicrinis, XV : 48, pl. II, fig. 20.
Marasmius njalaensis, XV : 48, pl. II, fig. 17.
Marasmius rotula, XV, 48, pl. II, fig. 21.
Marasmius sierraleonis, XV : 48, pl. II, fig. 18.
Marasmius subrotula, XV, 48, pl. II, fig. 19.
Marchal (Élie), IX : 1, portrait.
Marchantia Chevalieri Steph., XXIV : 39, fig. 3; 41, fig. 4.
Marchantia parviloba Steph., XXIV : 47, fig. 6; 49, fig. 7.
Marchantia Wilmsii Steph., XXII : 45, fig. 5.

Mareya micrantha (Benth.) Müll.-Arg. subsp. micrantha (répartition géographique au Congo belge de), XXV : 293, fig. 52.
Mareya micrantha subsp. congolensis J. Léonard (répartition géographique au Congo belge de), XXV : 293, fig. 52.
Mastigolejeunea carinata (Mitt.) Steph. : A, rameau fertile avec inflorescence femelle et innovation; B, épi mâle; C et D, feuilles; E et F, bractées involucrales femelles; G, bractéole femelle, XIX : 379, fig. 33.
Mastigolejeunea florea (Mitt.) Steph. : A, rameau fertile avec innovation; B, feuille; C, amphigastre; D et E, bractées involucrales femelles; F, bractéole femelle, XIX : 375, fig. 31.
Mastigolojeunea turgida Steph. : A, feuille, B, bractée involucrale femelle; C, bractéole femelle, XIX : 377, fig. 32.
Mercurialis perennis, cultivés à diverses profondeurs, I : 181, fig. 7.
Metrodorea atropurpurea. — Stipules soudées; I : 216, fig. 2.
Metrosideros collina var. polymorpha, XV : 280, fig. 36.
Metzgeria camerunensis Steph. : A, coupe dans le thalle; Metzgeria propagulifera Vanden Berghen : B, C et D, propagules; Metzgeria Elliotii Steph.; F, coupe dans le thalle; E, G, H et I, propagules, XIX : 193, fig. 18.
Metzgeria limbato-setosa Steph. : A, coupe dans le thalle; Metzgeria quadrifaria Steph. B et C, coupes dans le thalle et dans la nervure; Metzgeria Saxbyi Pears. : D, face ventrale du thalle avec rameaux; E, coupe dans la nervure, XIX : 198, fig. 19.
Metzgeria nudifrons Steph. : A, coupe dans la nervure; B, C et D, propagules; Metzgeria muscicola Steph. : E et F, coupes dans le thalle et dans la nervure, XIX : 201, fig. 20.
Meyna velutina Robyns, XI : 238 et 239, fig. 21 et 22.
Micropeltis congoensis, VIII : 10, pl. I, fig. 2.
Micropeltis dubia, VIII : 10, pl. I, fig. 9.
Micropeltis Wildemani, VIII : 10, pl. I, fig. 8.
Mnium hornum Hedw. : capsule double à l'extrémité du pédicelle, XX : 327, fig. 31.
Modes d'alimentation des organismes inférieurs (les), I : 350, tableau 1.
Moitié inférieure droite des feuilles et des glandes rachidiennes de : A, B, Cassia Meelii Steyaert; C, D, Cassia comosa Vog. var. capricornia Steyaert; E, F, Cassia katangensis (Ghesq.) Steyaert var. biensis Steyaert; G, H, Cassia gracilior (Ghesq.) Steyaert; I, J, Cassia kalulensis Steyaert; K, L, Cassia katengensis (Ghesq.) Steyaert, XX : 262, pl. X.

Molinia (futaie de Hêtre envahie par), XV : 213, pl. X, 3.
Molinion coeruleae, XXIV : 393, fig. 31.
Montagne au Buis (relevés sur le plateau rocailleux de la partie Ouest de la), XV : 164, tableau I.
Montagne au Buis (relevés sur les plateaux secs de l'Est de la), XV : 167, tableau II.
Monopetalanthus Trapnellii J. Léonard, XXI : 135, fig. 34.
Monopetalanthus Trapnellii J. Léonard : une paire de folioles à la face supérieure montrant la typique nervation, XXI : 137, fig. 35.
Mosseray (Raoul), (1908-1940), portrait, XVI : 1.
Mountain forest, Crater Rim road, Hawaii National Park. Robyns standing under a clump of Cibotium Chamissoi with Sadleria cyathoides as an understory. Metrosideros collina var. polymorpha forms an overstory over all. Elevation 4000 feet, XV : 262, fig. 21.
Mountain forest, near First Twin Crater, Hawaii National Park. Metrosideros collina var. polymorpha forms the overstory with heavy growth of Sandleria cyatheoides and other ferns beneath. Elevation 4000 feet, XV : 263, fig. 22.
Mountain Parkland on Mauna Loa in Hawaii National Park. Clumps of Acacia Koa in background with Styphelia Tameiameia in center and Pteridium aquilinum and bunch grass as understory. Elevation : 6.300 feet, XV : 269, fig. 26.
Mussaenda tenuiflora Benth., XXIV : 340, pl. VII.
Mycena capillaris, XV : 48, pl. II, fig. 12.
Mycena Deightonii, XV : 48, pl. II, fig. 15.
Mycena paupercula, XV : 48, pl. II, fig. 14.
Mycena sierraleonis, XV : 48, pl. II, fig. 16.
Mycena termitum, XV : 48, pl. II, fig. 13.

Naucoria glaucospora, XV : 50, pl. III, fig. 25.
Naucoria sobria, XV : 50, pl. III, fig. 26.
Nelmesia melanostachya Van der Veken, XXV : 145, fig. 38.
Neochevalierodendron Stephanii (A. Chev.) J. Léonard, XXI : 431, fig. 114.
Neostachyanthus occidentalis Keay et Miège, XXV : 273, fig. 47; 275, fig. 48; 277, fig. 49; 278, fig. 50.
Nismes-Dourbes (carte de la région de), XV : 153, fig. 3.
Nolanea staurospora, XV : 50, pl. III, fig. 24.

Octomeron montanum Robyns : A, port de la planthe; B, fleur, vue de profil; C, corolle ouverte et étalée; D, gynécée (10); E, calice fructifère, vue de profil; F, calice fructifère ouvert et étalé, vue extérieure; G, nucule, XVII : 31 pl. I.
Odontolejeunea lunalata (Web.) Schiffn : tige feuillée avec inflorescence et innovation, XXII : 167, fig. 17.
Oisquercq (carte des environs de), XV : 177, fig. 4.
Oisquercq (répartition schématique des groupements végétaux du bois de), XV : 187, fig. 5.
Okoubaka Aubrèvillei Pell. et Norm. var. glabrescentifolia J. Léonard : vue du fût du seul spécimen connu aux environs de Yangambi, XVIII : 151, fig. 9.
Okoubaka Michelsonii J. Léonard et Troupin : A, bouton; B, fleur, coupe longitudinale; C, bouton; D, fleur, coupe longitudinale; E, staminode, XX : 13, fig. 4.
Oligotrichum africanum P. de la V., XXIV : 236, fig. 22.
Oncinotis glabrata (H. Bn) Stapf ex Hiern, XXIV : 13, pl. I ; 17, fig. 1.
Oncinotis gracilis Stapf, XXIV : 17, fig. 1; 29, pl. II.
Oncinotis hirta, XXIV : 17, fig. 1.
Oncinotis inandensis, XXIV : 21, fig. 2; 29, pl. II.
Oncinotis nigra, XXIV : 21, fig. 2.
Oncinotis nitida Benth., XXIV : 13, pl. I; 17, fig. 1.
Oncinotis Pontyi Dubard var. breviloba M. Pichon, XXIV : 17, fig. 1; 29, pl. II.
Oncinotis Pontyi var. Pontyi, XXIV : 17, fig. 1; 29, pl. II.
Oncinotis tenuiloba, XXIV : 21, fig. 2.
Oncinotis thyrsiflora K. Sch. ex Stapf, XXIV : 17, fig. 1; 29, pl. II.
Oncinotis tomentella, XXIV : 21, fig. 2.
Ophioglossum Louisii Taton sp. nov. : A, aspect de la plante ; B, autre mode de découpure de la fronde; C, sporangiophore mûr, XVII : 119, pl. II.
Organismes inférieurs (les modes d'alimentation des), I : 350, tableau I.
Ormocarpum cochinchinense (Lour.) Merrill, XXIV : 105, fig. 14.
Otomeria and Batopedina (distribution of the species), XXIII : 9, fig. 2.
Otomeria elatior (A. Rich. ex DC.) Verdcourt, XXIII : 13, fig. 3.
Otomeria guineensis Benth., XXIII : 13, fig. 3.
Otomeria volubilis (K. Schum.) Verdcourt, XXIII : 13, fig. 3.

Overgrazing in the Chenopodium association of the Plateau Parkland along road to Humuula. Note lack of Chenopodium sandwicheum to left and presence of it to right. Elevation about 5.500 feet, XV : 291, fig. 42.

Oxyrrhynchium porothamnioides P. DE LA V. et LEROY : A, feuilles caulinaires; B, feuilles raméales; C, cellules basilaires; D, péristome, XVIII : 187, fig. 17.

Pachistigma pygmaeum (SCHLECHT.) ROBYNS, XI : 123 et 124, fig. 17 et 18.

Pachysandra procumbens, cultivés à diverses profondeurs et à l'obscurité, I : 181, fig. 6.

Pachystigma pygmaeum (aire de distribution générale de), XI : 16, fig. 3.

Pachystigma pygmaeum au Transvaal (aire de distribution de), XI : 17, fig. 4.

Parinari pumila MILDBR. : B, coupe transversale d'un ovaire normal; C, coupe transversale d'un ovaire à 2 carpelles développés, XXI : 171, fig. 43.

Parkia biglobosa (JACQ.) BENTH., XXV : 211, fig. 44.

Parkia Clappertoniana KEAY, XXV : 211, fig. 44.

Parkia filicoidea WELW. ex OLIV., XXV : 211, fig. 44.

Parkia Oliveri MACBRIDE, XXV : 211, fig. 44.

Pelargonium zonale L'HÉRIT. : B, coupe transversale du pédicelle avec nectaire (N, cavité du nectaire; P, faisceaux du pédicelle), XXI : 169, fig. 42.

Pentanisia (distribution of the species of), XXII : 239, fig. 27.

Pentanisia ssp. of the South African complex (distribution of the), XXII : 241, fig. 28.

Pentanisia longepedunculata VERDCOURT : A, plant. — P. arenaria (HIERN) VERDCOURT : B, flower. — P. foetida VERDCOURT : C, corolla; D, calyx; E, fruit, and section of single coccus; F, fruit. — P. arenaria (HIERN.) VERDCOURT : G, calyx. — P. Sykesii HUTCH. : H, calyx, XXII : 266, fig. 32.

Pentanisia ouranogyne SP. MOORE : A, corolla; B, small calyx lobe; C, throat hair enlarged; D, hairs from outside of corolla tube, enlarged; E, corolla. — P. confertifolia (BAKER) VERDCOURT f. glabrifolia VERDCOURT : F, flower. — P. parviflora STAPF ex VERDCOURT : H, flower; I, fruit. — P. monticola (KRAUSE) VERDCOURT; J. calyx; K, fruit, XXII : 260, fig. 31.

Pentanisia prunelloides and Pentanisia Schweinfurthii (distinction between), XXII : 253, fig. 30.
Pentanisia prunelloides-angustifolia complex (variations in), XXII : 247, fig. 29.
Pentas (distribution of the species of), XXIII : 241, fig. 26; 243, fig. 27; 245, fig. 28; 247, fig. 29.
Pentas (relationships between the species of), XXIII : 249, fig. 30.
Pentas angustifolia (A. Rich.) Verdcourt, XXIII : 325, fig. 34.
Pentas arvensis Hiern, XXIII : 337, fig. 35.
Pentas Bussei Krause, XXIII : 309, fig. 33.
Pentas decora Sp. Moore, XXIII : 273, fig. 32.
Pentas graniticola Bruce, XXIII : 273, fig. 32.
Pentas hindoioides K. Schum. var. glabrescens Verdcourt, XXIII : 273, fig. 32.
Pentas ionolaena K. Schum., XXIII : 259, fig. 31.
Pentas ionolaena K. Schum. var. Schumanniana (Krause) Verdcourt, XXIII : 259, fig. 31.
Pentas lanceolata (Forsk.) Deflers, XXIII : 337, fig. 35.
Pentas lanceolata Deflers subsp. Quartiniana Verdcourt var. leucaster Verdcourt, XXIII : 325, fig. 34.
Pentas lanceolata Deflers subsp. Quartiniana var. Verdcourt nemorosa Verdcourt, XXIII : 325, fig. 34.
Pentas longiflora Oliv., XXIII : 273, fig. 32.
Pentas longituba K. Schum., XXIII : 273, fig. 32.
Pentas micrantha Baker var. Wyliei (N. E. Br.) Verdcourt, XXIII : 309, fig. 33.
Pentas mussaendoides Baker, XXIII : 259, fig. 31.
Pentas nobilis Sp. Moore, XXIII : 273, fig. 32.
Pentas pseudomagnifica Taylor, XXIII : 273, fig. 32.
Pentas pubiflora Sp. Moore, XXIII : 337, fig. 35.
Pentas purpurea Oliv. var. Mechowiana Verdcourt, XXIII : 337, fig. 35.
Pentas Schimperiana (A. Rich.) Vatke, XXIII : 259, fig. 31.
Pentas zanzibarica (Klotzsch) Vatke, XXIII : 309, fig. 33.
Pentas zanzibarica Vatke var. pembensis Verdcourt, XXIII : 309, fig. 33.
Perakanthus velutinus (Ridl.) Robyns, XI : 332 et 333, fig. 35 et 36.
Pestalotia aeruginea R. L. Steyaert (conidies de), XIX : 185, pl. VI.
Pestalotia annulata Berk. et Curt. (conidies de), XIX : 175, pl. III.

Pestalotia Calabae Westendorp (spores de), XIX : 67, pl. I.
Pestalotia carbonacea R. L. Steyaert (conidies de), XIX : 180, pl. V.
Pestalotia clavispora Atk. (conidies de), XIX : 180, pl. V.
Pestalotia disseminata Thuem. (conidies de), XIX : 175, pl. III.
Pestalotia glandicola (Cast.) Guba (conidies de), XIX : 180.
Pestalotia Lauro-cerasi Westendorp (spores de), XIX : 70, pl. II.
Pestalotia maculiformans Guba et Zeller (conidies de), XIX : 175, pl. III.
Pestalotia Mangiferae P. Henn. (conidies de), XIX : 175, pl. III.
Pestalotia mayumbensis R. L. Steyaert (conidies de), XIX : 175, pl. III.
Pestalotia pezizoides De Not. (conidies de), XIX : 288, pl. VII.
Pestalotia stictica Berk. et Curt. (conidies de), XIX : 180, pl. V.
Pestalotia sonsensis P. Henn. (conidies de), XIX : 180, pl. V.
Pestalotia Theae Saw. var. minor R. L. Steyaert (conidies de), XIX : 185, pl. VI.
Pestalotiopsis aquatica (Ell. et Ev.) Steyaert (conidies de), XIX : 330, pl. XV.
Pestalotiopsis baarnensis Steyaert (conidies de), XIX : 342, pl. XVII.
Pestalotiopsis breviseta (Sacc.) Steyaert (conidies de), XIX : 316, pl. XII.
Pestalotiopsis crassiuscula Steyaert (conidies de), XIX : 338, pl. XVI.
Pestalotiopsis cruenta (Syd.) Steyaert (conidies de), XIX : 316, pl. XII.
Pestalotiopsis disseminata (Thuem.) Steyaert (conidies de), XIX : 320, pl. XIII.
Pestalotiopsis dichaeta (Speg.) Steyaert (conidies de), XIX : pl. XI.
Pestalotiopsis Fici Steyaert (conidies de), XIX : 324, fig. 24.
Pestalotiopsis foedans (Sacc. et Ell.) Steyaert (conidies de), XIX : 320, pl. XIII.
Pestalotiopsis funerea (Desm.) Steyaert (conidies de), XIX : 342. pl. XVII.
Pestalotiopsis funerioides Steyaert sp. nov. (conidies de), XIX : 346, fig. 28.
Pestalotiopsis gallica Steyaert sp. nov. (conidies de), XIX : 306, pl. VIII.

Pestalotiopsis glandicola (Cast.) Steyaert (conidies de), XIX : 334, fig. 26.
Pestalotiopsis glandicola (Cast.) Steyaert (conidies de), XIX : 338, pl. XVI.
Pestalotiopsis gracilis (Kleb.) Steyaert (conidies de), XIX : 314, pl. XI.
Pestalotiopsis Guepini (Desm.) Steyaert (conidies de), XIX : 310, pl. X.
Pestalotiopsis hypodermia (Niessl.) Steyaert (conidies de), XIX : 320, pl. XIII.
Pestalotiopsis japonica (Syd.) Steyaert (conidies de), XIX : 330, pl. XV.
Pestalotiopsis Karstenii (Sacc. et Syd.) Steyaert (conidies de), XIX : 306, pl. IX.
Pestalotiopsis Leucothoes (White) Steyaert (conidies de), XIX : 316, pl. XII.
Pestalotiopsis macrospora (Ces.) Steyaert (conidies de), XIX : 345, fig. 27.
Pestalotiopsis Mangiferae (P. Henn.) Steyaert (conidies de), XIX : 322, pl. XIV.
Pestalotiopsis monochaetioides (Doyer) Steyaert (conidies de), XIX : 314, pl. XI.
Pestalotiopsis natalensis (V. Beyma) Steyaert (conidies de), XIX : 342, pl. XVII.
Pestalotiopsis oxyanthi (Thuem.) Steyaert (conidies de), XIX : 320, pl. XIII.
Pestalotiopsis Paeoniae (Serv.) Steyaert (conidies de), XIX : 314, pl. XI.
Pestalotiopsis Palmarum (Cke) Steyaert (conidies de), XIX : 322, pl. XIV.
Pestalotiopsis papposa Steyaert sp. nov. (conidies de), XIX : 322, pl. XIV.
Pestalotiopsis Planimi (Vize) Steyaert (conidies de), XIX : 326, fig. 25.
Pestalotiopsis Royenae (Guba) Steyaert (conidies de), XIX : 316, pl. XII.
Pestalotiopsis Theae (Saw.) Steyaert (conidies de), XIX : 324, fig. 24.
Pestalotiopsis triseta (M. et M^me^ Moreau) Steyaert (conidies de), XIX : 338, pl. XVI.

Pestalotiopsis versicolor (Speg.) Steyaert (conidies de), XIX : 330, pl. XV.
Pestalotiopsis virgatula (Kleb.) Steyaert (conidies de), XIX : 338, pl. XVI.
Pestalotiopsis Westerdijkii Steyaert sp. nov. (conidies de), XIX : 330, pl. XV.
Philippia longifolia Engl. (tronc de), XVI : 319, fig. 22.
Phlebopus Braunii (Bresadola) Heinemann var. brunneoruber (Beeli) Heinemann : A, coupe d'un carpophore montrant l'excentricité du stipe et la marge débordante, reconstituée d'après la planche et l'exsiccatum; B, spores, XXI : 243, fig. 54.
Phlebopus silvaticus Heinemann, XXI : 245, fig. 55.
Phlebopus sudanicus (Har. et Pat.) Heinem., XXIV : 115, fig. 5.
Pholiota njalaensis, XV : 50, pl. III, fig. 27.
Phylloporus albocarnosus Heinem., XXV : 177, fig. 42.
Phylloporus ater (Beeli) Heinemann, XXI : 260, fig. 61.
Phylloporus carmineus Heinemann, XXI : 263, fig. 63; 264, fig. 64.
Phylloporus depressus Heinemann, XXIII : 75, fig. 9.
Phylloporus purpureus (Beeli) Heinemann, XXI : 251, fig. 56.
Phylloporus purpureus (Beeli) Heinemann et sa var. ambiguus Heinemann, XXI : 251, fig. 57; 253, fig. 58.
Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. subsp. congolensis Heinem., XXV : 175, fig. 41.
Phylloporus testaceus Heinemann et Goossens, XXI : 225, fig. 59.
Phylloporus testaceus Heinemann et Goossens var. bisporus Heinemann, XXI : 257, fig. 60.
Phylloporus tubipes Heinemann, XXI : 262, fig. 62.
Pinacopodium congolense (S. Moore) Exell et Mendonça, XXI : 455, fig. 117.
Pinacopodium gabonense (Cavaco et Normand) Normand et Cavaco, XXI : 459, pl. IX.
Pioneer vegetation on the 1926 lava flow in South Kona, along the belt road. Lichens on the surface blocks are about all that is found. Elevation 1.600 feet, XV : 274, fig. 32.
Piper guineense Schum. et Thonn. Tige principale à racines-crampons et feuilles symétriques, portant un rameau latéral fertile à feuilles asymétriques. A gauche, grappe mûre, XVI : 379, pl. XVI.
Pittosporum ripicolum J. Léonard : A, feuille, face inférieure ; B, calice d'une fleur adulte; C, une valve du fruit, face externe, XX : 49, fig. 7.

Plantes cultivées dans une chambre noire thermostatique, I : 271, fig. 12 et 13.

Plante xérophile cultivée dans l'eau depuis un mois (coupe longitudinale d'un point végétatif de), I : 84, fig. 8.

Plateau Parkland along road to Humuula. Chenopodium sandwicheum association with bunch grass in foreground. Elevation 5.500 feet, XV : 266, fig. 25.

Plateau Parkland near Humuula on the great central plain. Sophora-Myoporum association with Sophora chrysophylla, Myoporum sandwicense and Chenopodium sandwicheum in background and bunch grass and Erigeron albidus in foreground. Elevation 6.600 feet, XV : 266, fig. 24.

Platostoma africanum P. Beauv. Diverses formes du calice fructifère : A, sinus droit et entier; B, sinus bombé; C et D, sinus denticulé; E, sinus denté; F, sinus fortement denté, XVII : 18, fig. 3.

Plastostoma denticulatum Robyns : A, fleur entière; B, calice florifère ouvert et vu d'au-dessus; C, corolle ouverte et étalée, à lèvre supérieure à 4 lobes; D et E, id., à lèvre supérieure à 3 lobes; F, calice fructifère à sinus bidenticulé; G, calice fructifère à sinus 1-denticulé, XVII : 23, fig. 5.

Platostoma leptochilon Robyns : A, fleur entière; B, corolle ouverte et étaée ; C, calice fructifère ; D, nucule avec élaiosome ; E-F, P. leptochilon Robyns var. Louisii Robyns; E, calice fructifère; F, calice fructifère, XVII : 21, fig. 4.

Plectroniella armata (K. Shum.) Robyns, XI : 244, fig. 23; 245, fig. 24.

Pleurotus luminosus, VIII : 260, pl. VII, fig. 9.

Pleurotus mitis, XV : 50, pl. III, fig. 22.

Pleurotus palmicola, XV : 50, pl. III, fig. 23.

Pogonatum semilamellatum Leroy : A, feuille; B, coupe transversale d'une feuille, XVIII : 198, fig. 20.

Poils foliaires : A, poil sétiforme; B, C, D, E, poils flabelliformes; F, poil scutiforme, vu en coupe; G, poil scutiforme, vu de face, I : 82, fig. 6.

Polygonum amphibium, I : 75, fig. 1; 78, fig. 2; 79, fig. 3; 80, fig. 4; 81, fig. 5; 82, fig. 6; 83, fig. 7; 84, fig. 8.

Polygonum convolvuloides Brügger f. intermedium Lawalrée : faux fruit. — B. Polygonum convolvuloides Brügger f. pterocarpum Lawalrée : faux-fruit, XXII : 212, fig. 26 .

Polypodium virginianum : A, organe glandulaire presque adulte ;

spécimen de Little Falls, N. Y., U. S. A.; vue extérieure. — B, organe imparfaitement différencié sur une forme naine des Montagnes Rocheuses, Colorado, U. S. A.; vue axiale, XVII : 9, fig. 1.

Polypodium vulgare : A, paraphyse peu ramifiée; spécimen de l'Ile de Ténériffe. — B, extrémité d'une paraphyse très ramifiée sur un spécimen algérien. — C, extrémité d'une paraphyse en voie de ramification; même spécimen, XVII : 11, fig. 2.

Polyporus durississimus, VIII : 260, pl. VII, fig. 1.

Polyporus loreus, VIII : 260, pl. VII, fig. 8.

Polyporus Quarrei, VIII : 260, pl. VII, fig. 4.

Polystictus kwiluensis, VIII : 260, pl. VII, fig. 5.

Polytrichum hirsutum Leroy : A, plante à l'état humide; B, partie supérieure d'une feuille; C, coupe transversale d'une feuille, XVIII : 199, fig. 21.

Porphyrellus niger Heinemann et Goossens, XXI : 335, fig. 96.

Prenanthes subpeltata Stebbins, XIV : 339, pl. VI.

Prionolejeunea Kindbergii Steph. : A, feuille et amphigastre ; B, périanthe. — Prionolejeunea serrula (Mitt.) Steph.; C, périanthe, XXII : 171, fig. 18.

Profils pédologiques notés, en Campine, sous des individus du Cariceto-Agrostidetum : 1, Rijmenam; 2, Lichtaert, XXII : 53, fig. 4.

Pseudomussaenda flava Verdcourt, XXIV : 340, pl. VII.

Pseudomussaenda stenocarpa (Hiern) Petit, XXIV : 340, pl. VII.

Psilocybe albobrunnea, XV : 50, pl. III, fig. 29.

Pterospermum acerifolium. — Jeunes feuilles velues sur les deux faces; feuilles adultes glabres à la face supérieure. Jeunes limbes pendants, I : 216, fig. 3.

Ptychocoleus confertissimus (Steph.) Steph. : A, feuille caulinaire; B, amphigastre caulinaire; C, rameau; D, bractées et bractéoles involucrales, XIX : 41, fig. 2.

Ptychocoleus ferrugineus (Steph.) Steph. : A, feuille caulinaire; B, amphigastre caulinaire; C, bractée involucrale; D, bractée involucrale, XIX : 39, fig. 1.

Ptychocoleus Molleri (Steph.) Steph. : A, feuilles caulinaires ; B, amphigastre caulinaire; C, rameau; D, bractée involucrale; E, bractéole involucrale; F, rameau, XIX : 45, fig. 3.

Ptychocoleus occultus (Steph.) Steph. : A, feuilles caulinaires ; B, rameau; C, bractée involucrale; D, bractéoles involucrale ; E, rameau, XIX : 48, fig. 4.

Puccinellietum, XXIII : 98, fig. 16; 103, fig. 17; 109, fig. 21.

Puccinellietum maritimae, XXIII : 103, fig. 17-18; 105, fig. 19-20; 109, fig. 21-22.
Pulveroboletus aberrans Heinemann et Goossens, XXI : 311, fig. 86.
Pulveroboletus annulatus Heinemann, XXI : 303, fig. 81.
Pulveroboletus carminiporus Heinemann, XXI : 307, fig. 84.
Pulveroboletus cavipes Heinemann, XXI : 313, fig. 87.
Pulveroboletus croceus Heinemann, XXI : 304, fig. 82.
Pulveroboletus rufobadius (Bresadola) Singer, XXI : 309, fig. 85.
Pulveroboletus trinitensis Heinemann, XXIV : 122, fig. 8.
Pulveroboletus viridis Heinemann et Goossens, XXI : 305, fig. 83.
Pycreus sanguineo-squamatus Van der Veken, XXV : 146, fig. 39.
Pygmaeothamnus Zeyheri (Sond.) Robyns, XI : 32, fig. 7 ; 33, fig. 8.
Pynaertiodendron congolanum De Wild. : A, foliole, face inférieure; B, pétiole, face supérieure, XXI : 139, fig. 36.
Pynaertiodendron Pellegrinianum J. Léonard : C, foliole, face inférieure; D, pétiole, face supérieure, XXI : 139, fig. 36.

Querceto-Betuletum, XV : 213, pl. X, 1.
Querceto-Betuletum. Conversion en futaie de Hêtre, XV : 213, pl. X, 4.

Racines (contraction des), I : 125, fig. 12.
Ranunculus du Congo belge (akènes des), XV : 313, pl. XI.
Relationships between the species of Pentas, XXIII : 249, fig. 30.
Relevés sur les parois rocheuses, XV : 170-171, tableau III.
Relevés sur le plateau rocailleux de la partie ouest de la Montagne au Buis, XV : 164, tableau I.
Relevés sur les plateaux secs de l'est de la Montagne au Buis et de la double colline du Calvaire givétien, XV : 167, tableau II.
Répartition des Alafia d'Afrique, XXIV : 147, fig. 15, 16; 163, fig. 17; 173, fig. 18; 183, fig. 19; 211, fig. 20.
Répartition des espèces de Batrachospermum en Belgique, XV : 321, pl. XII.
Répartition des espèces congolaises d'après les districts phytogéographiques, XVI : 110-111.
Répartition des Malouetiinae d'Afrique, XXII : 127, fig. 9.
Répartition géographique au Congo belge de Mareya micrantha subsp. congolensis J. Léonard, XXV : 293, fig. 52.

Répartition géographique au Congo belge de Mareya micrantha (Benth.) Müll.-Arg. subsp. micrantha, XXV : 293, fig. 52.

Répartition géographique de Juniperus procera Hochst. au Congo belge, XVIII : 127, fig. 8.

Répartition par provinces des espèces de Batrachospermum connues actuellement en Belgique. Les chiffres indiquent le nombre des stations. Les noms précédés d'un * sont des espèces nouvelles pour la Belgique, XV : 320, fig. 44.

Répartition schématique des groupements végétaux du Bois d'Apecheau, XV : 203, fig. 7.

Répartition schématique des groupements végétaux du Bois de Oisquercq, XV : 187, fig. 5.

Représentation graphique des affinités génériques, XI : 14, fig. 2.

Représentation schématique de la localisation topographique de l'Association à Carex lasiocarpa : A, Westmeerbeek (district campinien) : a, groupement aquatique avec Nymphaea alba ; b, Heleocharetum multicaulis; c, Caricetum lasiocarpae; d, peuplements de Cladium Mariscus. B, Vieux-Turnhout (district campinien), au Liereman : a, Cladietum Marisci; b, Caricetum lasiocarpae initial; b', Caricetum lasiocarpae Sphagnetosum ; c, Sphagnetum papilloso-imbricati; d, Ericetum tetralicis. C, Gheel (district campinien) : a, Caricetum lasiocarpae; b, Aulnaie à Sphaignes. D, Chantemelle (district lorrain) : a, Caricetum limosae; b, Caricetum lasiocarpae; b', prairie à Molinia avec Carex lasiocarpa; c, prairie à Arrhenatherum, XXII : 29, fig. 3.

Représentation schématique de la succession des groupements végétaux sur les aires étrépées des landes tourbeuses de la Campine : a, Ericetum tetralicis avant l'étrépage; b, aire étrépée avec Rhynchospora fusca et Drosera intermedia; c, apparition des espèces de l'Ericetum; d, Ericetum tetralicis reconstitué, XXII : 17, fig. 1.

Result of overgrazing in transition forest. Gold Course, Hawaii National Park. Notice heavy reproduction of Metrosideros collina var. polymorpha on right, where grazing was eliminated since 1935. Elevation 4000 feet, XV : 289, fig. 43.

Rhamnus prinoides L'Hérit. : fleur, XV : 403, fig. 48.

Rhegmatodon brevicuspes P. de la V. et Leroy : A, feuilles inférieures; B, feuilles raméales; C, cellules supérieures; D, cellules basilaires; E, péristome, XVIII : 183, fig. 16.

Rhynchocarpidium katalense P. de la V. et Leroy : A, feuilles caulinaires; B, feuilles raméales; C, sommet d'une feuille; D, péristome, XVIII : 189, fig. 18.

Robynsiophyton Vanderystii Wilczek, XXIII : 127, pl. I.
Rosa agrestis, X : 147, fig. 17.
Rosa agrestis. Folioles terminales, X : 151, fig. 18.
Rosa alpina, X : 198, fig. 21; 203, fig. 23; 205, fig. 24.
Rosa alpina, folioles terminales, X : 200, fig. 22.
Rosa alpina, fruits, X : 208, fig. 25.
Rosa alticola, XIII : 221, fig. 4.
Rosa arvensis. Fleur, XII : 221, fig. 15.
Rosa arvensis. Folioles supérieures, XII, 219, fig. 14.
Rosa arvensis. Tiges, XII : 217, fig. 13.
Rosa canina. Aiguillons, XII : 84, fig. 7.
Rosa canina. Aiguillons. Rameaux florifères, XII : 85, fig. 8.
Rosa canina. Disque et pistils, XII : 80, fig. 5.
Rosa canina. Fleur, XII : 89, fig. 9.
Rosa cinnamomea, X : 361, fig. 37.
Rosa Delavayana, XIV : 194, fig. 18.
Rosa dumalis. Aiguillons, XII : 8, fig. 1.
Rosa dumalis. Fruits, XII : 16, fig. 3.
Rosa dumalis typica, XII : 40, fig. 4.
Rosa dumalis var. Afzeliana. Fleur, XII : 15, fig. 2.
Rosa Fargesiana. Rameau florifère du district de Tchen-keou-tin, XIV : 184, fig. 17.
Rosa Forrestiana. Ramuscule florifère, XIV : 127, fig. 16.
Rosa gallica, XII : 204, fig. 12.
Rosa gallica. Aiguillons, XII : 200, fig. 10.
Rosa gallica. Inflorescence, XII : 203, fig. 11.
Rosa gymnocarpa Nutt., XIV : 283, fig. 22.
Rosa inodora, X : 118, fig. 16.
Rosa Korschinskiana, XIII : 214, fig. 3.
Rosa latibracteata. Ramuscule florifère, XIV : 125, fig. 15.
Rosa marginata, X : 285, fig. 31; 291, fig. 33.
Rosa marginata, demi-folioles terminales, X : 288, fig. 32.
Rosa micrantha, X : 167, fig. 19; 174, fig. 20.
Rosa montana, X : 383, fig. 39.
Rosa multibracteata. Ramuscule florifère du spécimen-type, Herb. de Kew N° 3531, grandeur naturelle, et fleur détachée, XIV : 122, fig. 14.
Rosa Nanothamnus, XIII : 208, fig. 2.
Rosa oligocarpa Rydb., XIV : 287, fig. 23.
Rosa pimpinellifolia, X : 26, fig. 1; 27, fig. 2; 29, fig. 3; 32, fig. 4; 35, fig. 5.

Rosa pimpinellifolia var. myriacantha, X : 51, fig. 7; 52, fig. 8.
Rosa pimpinellifolia var. Ripartii, X : 47, fig. 6.
Rosa rubiginosa, X : 72, fig. 10; 83, fig. 13.
Rosa rubiginosa, demi-folioles latérales, face inférieure, X : 77, fig. 11.
Rosa rubiginosa, stipules, X : 80, fig. 12.
Rosa rubiginosa var. Lintoni, X : 105, fig. 15.
Rosa rubrifolia, X : 371, fig. 38.
Rosa sempervirens. Folioles supérieures, XII : 243, fig. 16.
Rosa Sherardi, X : 262, fig. 29; 263, fig. 30.
Rosa sicula, X : 56, fig. 9.
Rosa stylosa Crépin. Disque et pistils, XII : 81, fig. 6.
Rosa stylosa. B, Rosa canina (d'après Fouillade); C, Rosa canina (d'après Boulenger); D, Rosa canina (d'après Mosseray). Coupe verticale du sommet de l'urcéole avec la base des sépales, XIV : 376, fig. 27.
Rosa tomentosa, X : 307, fig. 34; 313, fig. 35.
Rosa tomentosa var. cinerascens, X : 326, fig. 36.
Rosa villosa, X : 222, fig. 26.
Rosa villosa, demi-folioles terminales, X : 224, fig. 27.
Rosa villosa, stipules, X : 230, fig. 28.
Roses à Wavreille, en 1919 (G. A. Boulenger examinant un buisson de), XV : 9, fig. 1.
Rubia tinctorum, cultivés à diverses profondeurs et à l'obscurité, I : 181, fig. 3.
Rubiacées-Vanguériées (types d'inflorescences légèrement schématisées de diverses), XI : 8, fig. 1.
Rubus Ledermannii Engl. var. serrulatus C. E. Gust., XIII : 271, pl. II.
Rumex tenuifolius (Wallr.) Löve, XXII : 85, fig. 7.
1, Russula xylophila. — 2, R. annulatosquamosa. — 3, R. annulatolutea. — 4, R. annulatoangustifolia. — 5, R. annulatobadia. Carpophores, XIV : 85, pl. II.
Rytigynia senegalensis Blume, XI : 164 et 165, fig. 19 et 20.

Salicornia, XXIII : 98, fig. 16.
Salicornieto-Spartinetum, XXIII : 98, fig. 16; 103, fig. 17.
Sanguisorba Canadensis, cultivés à diverses profondeurs et à l'obscurité, I : 181, fig. 4.
Santaloidella Gilletii Schellenb. spécimen florifère. Photo, XXI : 143, fig. 37; 147, fig. 38.

Schizachyrium yangambiense Germain, habitus Yangambi, plaine alluvionnaire argileuse à 4 m au-dessus du fleuve, pâturée par le bétail, XXII : 140, fig. 10.
Schizothyrium congoensis, VIII : 10, pl. I, fig. 1.
Schotia Bequaertii (De Wild.) De Wild. var. Bergeri (De Wild.) J. Léonard, XXI : 417, fig. 112.
Schulzeria sierraleonis, XV : 47, pl. I, fig. 7.
Schulzeria striata, XV : 47, pl. I, fig. 6.
Scleroderma Bovonei Mattirolo, VIII : 38, pl. II, fig. 1 à 4.
Scorodophloeus Zenkeri Harms, XXI : 419, fig. 113.
Scutia myrtina (Burm. f.) Merrill : rameau feuillu; fleur, XV : 405, fig. 49.
Second stage in colonization of lava flows in South Kona, 1868 flow. Note Polypodium pellucidum, Nephrolepis exaltata and Sadleria cyatheoides in cracks, XV : 274, fig. 33.
Secondary Lantana Camara association along belt road above Puniluu, overgrowing coastal-lowland shrub in overgrazed paddocks. Elevation 400 feet, XV : 280, fig. 37.
Secondary leguminous association along beach road, between Napoopoo and Honaunau. Mixed legumes replacing Lantana Camara, XV : 287, fig. 39.
Secondary Psidium Guajava association on cleared land, above Kailua, along belt road. Notice Aleurites moluccana on left, indicator of the climax formation. Elevation about 1.500 feet, XV : 287, fig. 38.
Secondary Tricholaena repens association along belt road, in Waimea section of South Kohala. Dodonaea viscosa, Wikstroemia sp., Sida fallax and scattered Metrosideros collina var. polymorpha indicate a forest climax. Elevation about 2700 feet, XV : 288, fig. 40.
Sedum Churchillianum Robyns et Boutique : A, fragment d'inflorescence; B, fragment de calice; C, pétale avec étamines et nectaire, vue de face; D, nectaire; E, gynécée; F, carpelle en coupe longitudinale; G, graine, XVII : 314, fig. 25.
Senecio en Belgique (dispersion de quelques), XIV : 82, pl. I.
Senecio kanzibiensis Humbert et Staner, XIV : 109, pl. V.
Sexualité et la mortalité des organismes inférieurs (la), I : 350, tableau II.
Sommet des falaises sableuses de Yaselia, XXIV : 113, fig. 1.
Sorosporium Aristidae-amplissimae, VIII : 10, pl. I, fig. 6.
Sorosporium chloridicola, VIII : 10, pl. I, fig. 5.

Sorosporium Panici, VIII : 10, pl. I, fig. 7.
Souche (courbure de la), I : 121, fig. 6; 123, fig. 10.
Sphagnum imbricatum (Hornsch.) Russ. : coupe de feuille raméale, XVI : 284, fig. 21.
Sphagnum magellanicum Brid. : coupe de feuille raméale. Esschen, marais dit « Moerven », XVI : 283, fig. 20.
Sphagnum palustre L., coupe de feuille raméale : A, forme ordinaire; B, Moerven, Esschen, sept. 1906, Naveau; C, Louette-Saint-Pierre, dans les eaux des fossés des tourbières, mai 1876, Gravet; D. Marais des Forges près de Chimay, XVI : 273, fig. 15.
Sphagnum papillosum Lindb., coupe de feuille raméale : A, Theux, talus humide et découvert au bois de Staneux, sept. 1915; Cornet; B, Louette-Saint-Pierre, bord du ruisseau du Pré, XVI : 278, fig. 16.
Sphagnum papillosum Lindb. : coupe d'une feuille raméale, Louette-Saint-Pierre, XVI : 279, fig. 17.
Sphagnum papillosum Lindb. (Sphagnum hakkodense Warnst. et Card. var. Gravetii Warnst.) : coupe de feuille raméale, Calmpthout, bois de pins humide, XVI : 280, fig. 18.
Sphagnum subbicolor Hpe : coupe de feuille raméale, Brasschaet, bruyère marécageuse, XVI : 282, fig. 19.
Spores de Pestalotia Calabae Westendorp; B, spores de Pestalotia Rosae Westendorp; C, spores de Pestalotia Illicis Westendorp; D, spores de Pestalotia Sydowiana Bres., XIX : 67, pl. I.
Spores de Pestalotia Lauro-cerasi Westendorp à divers stades d'évolution, XIX : 70, pl. II.
Sprucella succida (Mitt.) Steph. : A, habitus; B, tige pourvue d'un épi ♂ latéral et d'un épi ♂ ventral; C, face ventrale d'une tige montrant des amphigastres 4-5 lobés; D, face dorsale d'une tige montrant deux feuilles, accompagnant chacune une ramification et dont l'une est entière et l'autre bidife, XVIII : 93, fig. 3.
Stictolejeunea africana Vanden Berghen sp. nov. : A et B, tiges feuillées; C, lobule foliaire; D, épi mâle; E, bractée involucrale; F, bractéole involucrale; G, périanthe, XX : 17, fig. 5.
Stigmas, with magnified details of barbs and « collecting hairs » and pappus setae (weakest and strongest) of : a, b, Prenanthes scandens Hook. f., c, d : P. subpeltata Stebbins; e, f : Lactuca glandulifera Hook. f., XIV : 343, pl. VII.
Stolons horizontaux se redressant ultérieurement, I : 122, fig. 8.

Strephonema Gilleti De Wild., VIII : 119, pl. III, fig. 1 à 5.

Strobilomyces costatispora (Beeli) Gilbert, XXI : 341, fig. 98 ; XXV : 179, fig. 43.

Strobilomyces echinatus Beeli, XXI : 337, fig. 97.

Struthiola Scaettae Staner, XIII : 368, fig. 22.

Suaeda maritima (L.) Dum., XXIII : 98, fig. 16.

Subalpine shrub, 7.500 feet elevation on Mauna Loa in Hawaii National Park. Tall Coprosma montana in center flanked by Styphelia Tameiameia, forming the Coprosma-Styphelia association, XV : 270, fig. 29.

Syrrhopodon brevifolius Broth. et P. de la V. var. Overlaeti (Thér. et Nav.) Dix. et Thér. : A, feuille; B, sommet de la même feuille; C, sommet de la gaine, XVIII : 223, fig. 30.

Syrrhopodon brevivaginans Demar. et Leroy : A, feuilles; B, sommet d'une feuille; C, sommet de la gaine, XVIII : 225, fig. 31.

Syrrhopodon cryptocarpus Doz. et Molk. : A, feuilles; B, sommet de feuille; C, milieu de la lame, XVIII : 227, fig. 32.

Syrrhopodon Gardneri (Hook.) Schwaegr. : coupes transversales vers le milieu des feuilles; B, S. Currani Broth.; C, S. gabonensis Broth. et P. de la V. : 1, 2, coupes transversales vers la base des feuilles; D, S. brevifolius Broth. et P. de la V. : id.; E, S. brevifolius Broth. et P. de la V. var. Overlaeti (Thér. et Nav.) Dix et Thér., XVIII : 212, fig. 26.

Syrrhopodon linealis Dix. et Thér. : A, feuilles; B, sommet de la gaine; C, sommet de feuille, face dorsale (Rivière Lushiji, Overlaet); S. armatus Mitt. : D, feuille; E, sommet de la gaine ; F, base de la gaine, XVIII : 219, fig. 29.

Syrrhopodon Mildbraedii Broth. : coupes transversales vers le milieu des feuilles; B, S. polytrichoides Besch. : id; C, S. mauritanius C. Müll. : id.; D, S. mahensis Besch. : id., E, S. Spruceanus Mitt.; F, S. cryptocarpus Doz. et Molk. : XVIII : 214, fig. 27.

Syrrhopodon revolutus Doz. et Molk. : A, feuille; B, base de la feuille; C, sommet de la feuille, XVIII : 216, fig. 28.

Syrrhopodon Rodriguezii Ren. et Card. : coupes transversales vers le milieu des feuilles; B, S. maveganensis Besch. : id.; C, S, maveganensis Besch. var. crispatus Thér. : id.; D, S. floridanus Sul. : id.; E, S. microblepharis P. de la V. : id.; F, S. brevivaginans Demar. et Leroy : id., XVIII : 210, fig. 25.

Tapiphyllum velutinum (Hiern) Robyns, XI : 112, fig. 15; 113, fig. 16.

Temnocalyx obovatus (N. E. Brown) Robyns, XI : 321, fig. 31; 322, fig. 32.

Termitomyces clypeatus Heim, coupe longitudinale, XXI : 221, pl. 5.

Termitomyces globulus Heim et Goossens. Cystides hyméniennes se référant à deux types: cylindracé-septé (A) et globuleux (C), avec quelques éléments, proches du premier, mais lagéniformes-appendiculés (B), XXI : 217, fig. 47.

Termitomyces globulus Heim et Goossens : A_1 et A_2; A_3, coupe tudinale, XXI : 221, pl. VI.

Termitomyces Le Testui (Pat.) Heim, XXI : 221, pl. VI.

Termitomyces robustus (Beeli) Heim, XXI : 221, pl. V.

Termitomyces robustus. Reproduction d'un dessin anatomique de M^me^ Goossens représentant la structure d'une mycotête, et montrant les éléments constitutifs de celle-ci : filaments m, blastosphores b, sphérocytes, XXI : 215, fig. 46.

Termitomyces robustus (Beeli) Heim : Basidiospores, XXI : 213, fig. 45.

Termitomyces robustus (Beeli) Heim : Evolution des échantillons provenant du Kivu, montrant la formation endogène de l'hyménium, XXI : 211, fig. 44.

Termitomyces robustus var. fuliginosus Heim, XXI : 221, pl. V.

Tessmannia yangambiensis Louis ex J. Léonard : A, feuille ; B, stipule; C, foliole; D, détail de la face externe des sépales; E, fruit, XIX : 387, fig. 34.

Thalictrum Boivinianum Staner et J. Léonard : A, fleur épanouie. — Thalictrum rhynchocarpum Dillon et A. Rich. : B, fleur épanouie, XIX : 451, fig. 41.

The pre 1790 Keamoku aa lava flow on the Southeast slope of Mauna Loa, sparsely covered with Styphelia Tameiameia and Metrosideros collina var. polymorpha. Elevation 3.500 feet, XV : 279, fig. 34.

Thecacoris latistipula J. Léonard : A, rameau florifère ♂; B, stipule; C, fleur ♂; p = pétale, XVII : 257, fig. 21.

Thecacoris lenifolia J. Léonard : A, rameau fleuri ♂; B, inflorescence ♀, XVII : 255, fig. 20.

Theobroma Cacao. Jeunes limbes pendant verticalement, I : 216, fig. 7.

Thyridium Le Testui Thér. et P. de la V. var. scalariforme Demar. et Leroy : A, feuilles; B, base de la gaine; C, sommet de la gaine; D, bord de la lame à l'endroit où le limbidium disparaît; E, sommet de la feuille, XVIII : 229, fig. 33.

Tige (courbure et localisation de la), I : 124, fig. 11.

Tilia argentea, cultivés de diverses façons, I : 216, fig. 8.

Tinnea lanuginosa Robyns et Lebrun, VIII : 199, pl. V.

Tinnea obovata Robyns et Lebrun, VIII : 193, pl. IV.

Tinnea platyphylla Briq., VIII : 201, pl. VI.

Tortuleto-Phleetum, XXIV : 393, fig. 32.

Toussaintia congolensis Boutique : A, rameau florifère; B, fleur; C, fleur, coupe longitudinale; D, étamines, de face et de profil; E, carpelle; F, carpelle, coupe longitudinale, XXI : 99, pl. I.

Transition forest in Kipuka Puaulu, Hawaii National Park. The large specimen is Acacia Koa, surrounded by seedlings of Straussia Hillebrandii. Elevation 4000 feet, XV : 257, fig. 15.

Transition forest in Kipuka Puaulu, Hawaii National Park. Reproduction of Straussia Hillebrandii in foreground with Sapindus Saponaria and Metrosideros collina var. polymorpha in background and on either side, XV : 258, fig. 16.

Transition forest in Kapua-Manuka Forest Reserve, along the belt highway, between the 1907 and 1926 lava flows. Metrosideros collina var. polymorpha dominant in overstory with Psidium Guajava along roadside. Elevation 1700 feet, XV : 258, fig. 17.

Transition forest in Kipuka Nene, Hawaii National Park. Overstory of Metrosideros collina var. polymorpha and understory of Pteridium aquilinum, Dodonaea viscosa, Styphelia Tameiameia and grasses. Elevation 3000 feet, XV : 261, fig. 18.

Transition forest in Kipuka Ki, Hawaii National Park. Note groups of Sapindus Saponaria in overstory with ferns in understory. Elevation 4200 feet, XV : 261, fig. 19.

Transition forest in Puu Waa Waa region, North Kona. Maba sandwicensis to left. Santalum sp. right and Dracaena aurea in center background. Elevation 2000 feet, XV : 262, fig. 20.

Trematodon congolensis Leroy : A, sommet d'une feuille; B, capsule et opercule; C, péristome, XVIII : 160, fig. 11.

Trichilia Gilgiana Harms : A, fleur épanouie; B, tube staminal (face externe); C, tube staminal (face interne); D, gynécée; E, vestige du gynécée dans la fleur mâle; F, fruit, XVI : 163, pl. V.

Trichilia Heudelotii Planch. : A, fleur épanouie; B, tube staminal (face interne); C, gynécée; D, fruit; E, fruit en déhiscence ; F, graine, XVI : 157, pl. III.

Trichilia Prieureana Juss. : A, tube staminal (face interne) et gynécée; B, fruit, XVI : 144, fig. 7.

Trichilia quadrivalvis DC. Rameau florifère, XVI : 179, pl. VIII.

Trichilia rubescens Oliv. : A, tube staminal (face externe); B, tube staminal (face interne) vestige de gynécée (fleur ♂) et disque. — Trichilia retusa Oliv. : D, tube staminal (face externe); E, tube staminal (face interne), vestige de gynécée (fleur ♂); F, fruit, XVI : 151, pl. II.

Trichilia splendida A. Chev. : tube staminal et vestige du gynécée, XVI : 160, fig. 9.

Trichilia splendida A. Chev. : A, rameau feuillu avec inflorescence; B, rameau avec fruits; C, fleur épanouie; D, bouton coupé longitudinalement; E, sommet du filet de l'étamine, XVI : 161, pl. IV.

Trichilia Volkensii Gürke : A, tube staminal (face externe); B, gynécée; C, calice (face externe), XVI : 147, fig. 8.

Trichilia Welwitschii DC. Fruit, XVI : 170, fig. 10.

Trichilia Welwitschii DC. : A, face inférieure de la feuille; B, tube staminal (face interne); Trichilia Montchalii De Wild.; C, face inférieure de la feuille; D, tube staminal (face interne); Trichilia emetica Vahl; E, tube staminal (face interne); F, face inférieure de la feuille, XVI : 172, pl. VII.

Trichilia Zenkeri Harms : A, fleur épanouie; B, tube staminal (face interne); C, fruit; D, fruit en déhiscence; E, graine, XVI : 167, pl. VI.

Triphragmium graminicola, VIII : 10, pl. I, fig. 3.

Tristachya Bequaerti De Wild., VI : 45, pl. XXXIV, fig. 1-10.

Tristachya Hocki De Wild., VI : 47, pl. XXXIV, fig. 11-21.

Tristachya Homblei De Wild., VI : 49, pl. XXXIII, fig. 12-23.

Tristachya Vanderysti De Wild., VI : 56, pl. XXXIII, fig. 1-11.

Trois accommodats de Polygonum amphibium : A, plante terrestre, habitant le bord des eaux ; B, plante aquatique, nageante ; C, plante xérophile, habitant les dunes sablonneuses, I : 75, fig. 1.

Trois plantes (a, Castilloa elastica; b, Cedrela odorata; c, Anona Cherimolia) dans les conditions naturelles : les jeunes feuilles et folioles sont courbées vers le bas, I : 216, fig. 14.

Tronc de Philippia longifolia Engl. couvert d'énormes coussins d'Hépatiques et de Mousses : Anastrophyllum calcaratum mêlé à Campylopus substramineus, Plangiochile colorans, Lepidozia Stuhlmannii, Chandonanthus quadrifidus. L'arbre de droite est couvert d'Usnea. Mont Stanley, bord de la Kéréré, 3800 m (base de l'étage alpin), XVI : 319, fig. 22.

Tropaeolum majus L. : H, ovaire (d'après Le Maout et Decaisne), XXI : 171, fig. 43.

Tropaeolum pentaphyllum Lam. : D, coupe de la fleur montrant la périgynie de la corolle (d'après Buchenau), XXI : 171, fig. 43.

Truncatella conorum-piceae (Tubeuf) Steyaert (conidies de), XIX : 291, pl. VIII.

Truncatella Hartigii (Tubeuf) Steyaert (conidies de), XIX : 296, pl. VIII.

Truncatella ramulosa (V. Beyma) Steyaert (conidies de), XIX : 296, pl. VIII.

Truncatella truncata (Lev.) Steyaert (conidies de), XIX : 296, pl. VIII.

Tsuga canadensis. — Jeunes feuilles se plaçant verticalement, I : 216, fig. 5.

Tulipes cultivées à diverses profondeurs, I : 180, fig. 1.

Turraea Cabrae De Wild. et Th. Dur. : A, tube staminal (face interne) et gynécée; B, anthère vue de face; C, anthère vue de profil, XVI : 125, fig. 1.

Turraea Holstii Gürke : tube staminal (face interne) et gynécée, XVI : 127, fig. 2.

Turraea Laurentii De Wild. : tube staminal (face interne) et gynécée, XVI : 132, fig. 5.

Turraea nilotica Kotsch. et Peyr. : tube staminal (face interne) et gynécée, XVI : 128, fig. 3.

Turraea Vogelii Hook. f. : tube staminal (face interne) et gynécée, XVI : 134, fig. 6.

Turraea Vogelioides Bagsh. et Bak. f.: tube staminal (face interne) et gynécée, XVI : 131, fig. 4.

Tylopilus Beelii Heinemann et Goossens, XXI : 325, fig. 92.

Tylopilus striatulus Heinemann, XXI : 321, fig. 90.

Tylopilus suavissimus Heinemann et Goossens, XXI : 317, fig. 88.

Tylopilus tenuis Heinemann, XXI : 319, fig. 89.

Tylopilus violaceus (Beeli) Heinemann, XXI : 323, fig. 91.

Type du Rosa oligocarpa Rydb., XIV : 287, fig. 23.

Types d'apothécies, en coupe verticale : 1, Cladoniaceae, Cladonia sect. Cocciferae; 2, Stereocaulaceae. Stereocaulon : a) groupe de S. paschale (L.) Hoffm.; b) groupe de S. ramulosum (Sw.) Raeusch ; 3, Clathrinaceae. Cladia aggregata (Sw.) Nyl. ; 4, Thysanotheciaceae. Thysanothecium hyalinum (Tayl.) Nyl., XVII : 153, fig. 17.
Types d'inflorescences légèrement schématisées de diverses Rubiacées-Vanguériées, XI : 8, fig. 1.

Ulmus hollandica Mill. f. major (Smith) Dedher : Lixhe, Loën, Montagne Saint-Pierre. — On voit les saillies subéreuses de la branche épicormique, XXII : 69, fig. 6.
Ustilago Hyparrheniae, VIII : 10, pl. I, fig. 4.

Vangueria rotundata Robyns, XI : 301, fig. 27; 302, fig. 28.
Vanguériées (types d'inflorescences légèrement schématisées de diverses Rubiacées-), XI : 8, fig. 1.
Vangueriopsis coriacea Robyns : A, flower bud; B, open flower; C, open flower, cut lengthwise; D, style and stigma; E, ovary, cross section, XXII : 321, fig. 34.
Vangueriopsis nigerica Robyns, XI : 262, fig. 25; 263, fig. 26.
Variations in Pentarisia prunelloides-angustifolia complex, XXII : 247, fig. 29.
Ventilago africana Exell : fleur et fruit, XV : 397, fig. 45.
Vernonia kivuensis Humbert et Staner. — Vernonia Scaettae Humbert et Staner, XIV : 100, pl. IV.
Very smooth pahoehoe lava of the 1921 flow in Kilauea Crater. Elevation 3.650 feet. Pioneer plants in the cracks and on the thin layer of sand, XV : 279, fig. 35.
Virectaria (distribution of the species of), XXIII : 37, fig. 4.
Virectaria major (K. Schum.) Verdcourt, XXIII : 45, fig. 5.
Virectaria major var. spathulata Verdcourt, XXIII : 45, fig. 5.
Virectaria multiflora (Smith) Brem., XXIII : 45, fig. 5.
Virectaria procumbens (Smith) Brem., XXIII : 45, fig. 5.

Xanthodactylon perforatum Duvign., XVI : 265, pl. XV.
Xerocomus albobrunneus Heinemann et Goossens, XXI : 271, fig. 67.
Xerocomus alliaceus (Beeli) Heinemann, XXI : 267, fig. 65.
Xerocomus boletiformis (Beeli) Heinemann, XXI : 275, fig. 69.
Xerocomus njalaensis (Beeli) Heinemann, XXIV : 119, fig. 7.

Xerocomus pallidiporus Heinemann, XXI : 273, fig. 68.
Xerocomus phlebophoides Heinemann, XXIV : 117, fig. 6.
Xerocomus pseudotristis Heinemann et Goossens, XXI : 279, fig. 71.
Xerocomus spinulosus Heinemann et Goossens, XXI : 269, fig. 66.
Xerocomus sulcatipes Heinemann et Goossens, XXI : 277, fig. 70.
Xylaria obovata Berk., XXI : 221, pl. VI.
Xylia Ghesquierei Robyns : fleur entière avec pédicelle et bractéole, XVI : 254, fig. 14.
Xylia Ghesquierei Robyns : rameau florifère et branche fructifère, XVI : 255, pl. XIV.

Zeukerella citrina Taub., XXI : 411, fig. 110.
Zenkerella Schliebenii (Harms) J. Léonard : isotype, XXI : 415, fig. 111.
Ziziphus mauritiana Lam. : rameau feuillu, XV : 399, fig. 46.

TABLE DES MATIÈRES | INHOUDSTAFEL

Introduction ... 3
Inleiding ... 7

Table chronologique des articles ... 11
Chronologische tafel van de artikels.

Table alphabétique des articles ... 41
Alphabetische tafel van de artikels.

Table alphabétique des articles par matière ... 79
Alphabetische tafel van de artikels per onderwerp.

I — Morphologie — Anatomie ... 79
Cytologie — Cellenleer.

II — Physiologie ... 80

III — Systématique — Floristique ... 80
Systematiek — Floristiek.

IV — Phytogéographie — Phytosociologie — Ecologie ... 99
Plantenaardrijkskunde — Plantensociologie — Ecologie.

V — Tératologie ... 100

VI — Paléobotanique — Paleobotaniek ... 100

VII — Biographies — Biografieën ... 100

VIII — Varia ... 101

Table alphabétique des articles par auteur ... 103
Alphabetische tafel van de artikels per auteur.

Table alphabétique des taxa nouveaux et combinaisons nouvelles ... 125
Alphabetische tafel van de nieuwe taxa en nieuwe combinaties.

Table alphabétique des groupements végétaux ... 211
Alphabetische tafel van de plantengemeenschappen.

Table alphabétique des illustrations ... 219
Alphabetische tafel der illustraties.

BRUXELLES
GOEMAERE, Imprimeur du Roi, Éditeur
21, rue de la Limite

BRUSSEL
GOEMAERE, Drukker des Konings, Uitgever
21, Grensstraat